

## Werk

**Titel:** Ueber die Integration der hydrodynamischen Gleichungen.

**Autor:** Clebsch, A.

**Jahr:** 1859

**PURL:** [https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?243919689\\_0056|log4](https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?243919689_0056|log4)

## Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)  
SUB Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen

✉ [info@digizeitschriften.de](mailto:info@digizeitschriften.de)

# Ueber die Integration der hydrodynamischen Gleichungen.

(Von A. Clebsch zu Karlsruhe.)

## §. 1.

In einem frühern Aufsätze (dieses Journal, Bd. 54, p. 254) habe ich ein Theorem entwickelt, welches die Integration der hydrodynamischen Gleichungen für die stationäre Bewegung zurückführt auf ein System von zwei partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung; oder auf die Aufgabe, ein gewisses Integral zu einem Minimum zu machen, bei welchem die zu integrierende Function die lebendige Kraft darstellt. Dies wurde erreicht, indem die Geschwindigkeiten durch zwei neue Functionen ausgedrückt wurden, welche Constanten gleich gesetzt, Integrale der hinzutretenden gewöhnlichen Differentialgleichungen waren, und die Continuitätsgleichung identisch erfüllten. Die Ausdehnung dieses Verfahrens auf den Fall der nicht stationären Bewegung führte zu sehr verwickelten Gleichungen, welche keine Zurückführung auf ein Problem der Variationsrechnung gestatteten.

Indefs habe ich gefunden, dafs auch dieser allgemeine Fall immer auf ein solches Problem zurückgeführt werden kann, und zwar auf das Integral einer Function, welche sich von der lebendigen Kraft nur um ein hinzutretendes Glied unterscheidet. Die Substitution, welche zu diesem Resultate führt, ist eine wesentlich andere als die in dem erwähnten Aufsatz angewandte. Aber beide haben dies gemein, dafs sie die Bestimmung des Druckes von der übrigen Behandlung der Aufgabe sondern, und auf Gleichungen führen, welche, indem sie von den äufseren Kräften unabhängig sind, Bewegungen allgemeinsten Natur darstellen, deren eine Flüssigkeit fähig ist; endlich, dafs die angewandten neuen abhängigen Variablen, Constanten gleich gesetzt, Integrale des hinzutretenden Systems gewöhnlicher Differentialgleichungen bilden. Während aber jene Substitution für die stationäre Bewegung auf zwei partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung führte, *kommt in dem vorliegenden Falle das Problem zurück auf drei Differentialgleichungen, von denen zwei von der ersten, eine von der zweiten Ordnung.*

Die angewandte Substitution knüpft an die gewöhnliche Methode an, die hydrodynamischen Gleichungen zu behandeln. In der That macht man gewöhnlich die Annahme, daß der Ausdruck

$$u dx + v dy + w dz$$

ein vollständiges Differential sein soll. Aber wie auch die  $u$ ,  $v$ ,  $w$  beschaffen sein mögen, stets läßt dieser Ausdruck sich auf ein zweigliedriges Differential zurückführen, d. h. auf die Form

$$d\varphi + m d\psi;$$

woraus sich die Gleichungen ergeben:

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} + m \frac{\partial \psi}{\partial x},$$

$$v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} + m \frac{\partial \psi}{\partial y},$$

$$w = \frac{\partial \varphi}{\partial z} + m \frac{\partial \psi}{\partial z},$$

welches eben die angewandten Substitutionen sind. Ich bemerke, daß dieselben in einer gewissen Beziehung zu der Betrachtung der von *Helmholtz* (dieses Journal, Bd 55, p. 25) in die Theorie eingeführten Wirbelbewegungen stehen. Die Geschwindigkeiten sondern sich hier in einen Theil, der durch entsprechende Differentialquotienten *einer* Function dargestellt wird, und in einen zweiten, der diese Darstellung schlechterdings nicht zuläßt. Jene Wirbelbewegungen nun hängen allein von diesem zweiten Theil ab, d. h. von den Functionen  $m$ ,  $\psi$ . Denn wenn man nach den dort (Form. 2) gegebenen Gleichungen die Rotationsgeschwindigkeiten eines Flüssigkeitstheilchens bildet, so hat man:

$$2\xi = \frac{\partial m}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{\partial m}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial z},$$

$$2\eta = \frac{\partial m}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial z} - \frac{\partial m}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial x},$$

$$2\zeta = \frac{\partial m}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial m}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y},$$

wo die Function  $\varphi$  ganz verschwunden ist. \*)

\*) Beiläufig ergibt sich hieraus das Verfahren, um, wenn  $u$ ,  $v$ ,  $w$  irgend gegebene Functionen sind, dem Ausdruck  $u dx + v dy + w dz$  die Gestalt  $d\varphi + m d\psi$  zu geben. Es sind  $m$ ,  $\psi$ , wie aus dem *Pfaffschen* Problem sonst bekannt, nach den obigen Gleichungen Integrale der Gleichungen:

$$dx:dy:dz = \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} : \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} : \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Ich wende mich zunächst zu einem allgemeinerem System von Gleichungen, welches analoge Eigenschaften mit dem System der Hydrodynamik aufweist.

§. 2.

Es sei das System von Gleichungen gegeben:

$$(1.) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + u_1 \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + u_{2n} \frac{\partial u}{\partial x_{2n}}, \\ \frac{\partial V}{\partial x_1} = \frac{\partial u_1}{\partial t} + u \frac{\partial u_1}{\partial x} + u_1 \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \dots + u_{2n} \frac{\partial u_1}{\partial x_{2n}}, \\ \dots \\ \frac{\partial V}{\partial x_{2n}} = \frac{\partial u_{2n}}{\partial t} + u \frac{\partial u_{2n}}{\partial x} + u_1 \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_1} + \dots + u_{2n} \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_{2n}}, \end{array} \right.$$

$$(2.) \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_{2n}} = 0,$$

denen sich die gewöhnlichen Differentialgleichungen anschließen sollen:

$$(3.) \quad \frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{dx_1}{dt} = u_1, \quad \dots \quad \frac{dx_{2n}}{dt} = u_{2n}.$$

Die Gleichungen (1.) lassen sich in einer symbolischen Form zusammenfassen; nämlich, wenn unter dem Zeichen  $\delta$  nur die  $x$ , nicht aber  $t$  als

Da der Multiplicator der Gleichungen 1 ist, so kann man aus einem Integral  $\psi$  das zweite  $m$  durch das Princip des letzten Multiplicators finden. Alsdann aber ist wirklich

$$\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial m}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial m}{\partial y} \quad \text{etc.}$$

und  $\varphi$  wird daher wirklich ein vollständiges Differential. Aber  $\varphi$  genügt der Differentialgleichung

$$\begin{aligned} & \left( \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \left( \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \left( \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial z} \\ & = u \left( \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \right) + v \left( \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) + w \left( \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right). \end{aligned}$$

Führt man hier statt  $x, y, z$  als neue Variable  $m, \psi, \vartheta$  ein, so erhält man durch Integration:

$$\varphi = \int \frac{u \left( \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \right) + v \left( \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) + w \left( \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right)}{\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \left( \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \right) + \frac{\partial \vartheta}{\partial y} \left( \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \frac{\partial \vartheta}{\partial z} \left( \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right)} d\vartheta$$

(vgl. Jacobi, Math. W. Bd. I. p. 144).

veränderlich betrachtet werden:

$$(4.) \quad \delta V = \sum_k \delta x_k \left( \frac{\partial u_k}{\partial t} + u \frac{\partial u_k}{\partial x} + \dots u_{2n} \frac{\partial u_k}{\partial x_{2n}} \right);$$

oder auch, wenn man

$$(5.) \quad 2T = u^2 + u_1^2 + \dots u_{2n}^2$$

setzt, in der folgenden:

$$(6.) \quad \delta(V - T) = \sum_k \frac{\partial u_k}{\partial t} \delta x_k + \frac{1}{2} \sum_i \sum_k \left( \frac{\partial u_k}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \right) (u_i \delta x_k - u_k \delta x_i).$$

Bemerken wir nun, dafs man dem Ausdruck:

$$u \delta x + u_1 \delta x_1 + \dots u_{2n} \delta x_{2n}$$

immer die nachstehende Gestalt geben kann:

$$\delta \varphi + m_1 \delta \varphi_1 + m_2 \delta \varphi_2 + \dots m_n \delta \varphi_n,$$

so werden wir darauf geführt, für die  $u$  die Substitutionen zu machen:

$$(7.) \quad u_k = \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} + m_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + m_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_k} + \dots m_n \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_k}.$$

Mit Hilfe dieser Substitutionen stellen sich zunächst die Ausdrücke  $\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_k}$  als Summen von Determinanten dar, nämlich,

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_k} = \sum_r \left( \frac{\partial m_r}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_k} - \frac{\partial m_r}{\partial x_k} \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_i} \right).$$

Wenn man aber diesen Ausdruck mit der Determinante  $u_i \delta x_k - u_k \delta x_i$  multiplicirt, und sodann nach  $k, i$  die Summe bildet, so erhält man nach bekannten Sätzen:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \sum_i \sum_k \left( \frac{\partial u_k}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \right) (u_i \delta x_k - u_k \delta x_i) \\ &= \sum_r \left| \begin{array}{c} u \frac{\partial m_r}{\partial x} + u_1 \frac{\partial m_r}{\partial x_1} + \dots, \quad \frac{\partial m_r}{\partial x} \delta x + \frac{\partial m_r}{\partial x_1} \delta x_1 + \dots \\ u \frac{\partial \varphi_r}{\partial x} + u_1 \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_1} + \dots, \quad \frac{\partial \varphi_r}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_1} \delta x_1 + \dots \end{array} \right|. \end{aligned}$$

Hiefür kann man mit Berücksichtigung der Gleichungen (3.) die kürzere Bezeichnung anwenden:

$$\sum_r \left\{ \left( \frac{dm_r}{dt} - \frac{\partial m_r}{\partial t} \right) \delta \varphi_r - \left( \frac{d\varphi_r}{dt} - \frac{\partial \varphi_r}{\partial t} \right) \delta m_r \right\}.$$

Setzen wir dies nun in die Gleichung (6.) ein, so vereinigt sich die Summe

$$\sum_k \frac{\partial u_k}{\partial t} \delta x_k = \delta \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \sum_r \left( m_r \delta \frac{\partial \varphi_r}{\partial t} + \frac{\partial m_r}{\partial t} \delta \varphi_r \right)$$

mit dem Theile

$$\sum_r \left( \frac{\partial \varphi_r}{\partial t} \delta m_r - \frac{\partial m_r}{\partial t} \delta \varphi_r \right)$$

der obigen Summe, zu der vollständigen Variation des Ausdrucks

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \sum_r m_r \frac{\partial \varphi_r}{\partial t};$$

und die Gleichung (6.) nimmt demnach folgende Gestalt an:

$$(8.) \quad \delta \left\{ V - T - \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \sum_r m_r \frac{\partial \varphi_r}{\partial t} \right\} = \sum_r \left( \frac{dm_r}{dt} \delta \varphi_r - \frac{d\varphi_r}{dt} \delta m_r \right).$$

Diese Gleichung aber enthält auf der rechten Seite nur  $2n$  Variationen  $\delta m$ ,  $\delta \varphi$ , während in der linken Seite  $2n+1$  Variable  $x$  variirt werden. Es muß also der Ausdruck, welcher links variirt ist, eine willkürliche Function der  $2n+1$  Argumente  $\varphi$ ,  $m$ ,  $t$  sein; und indem wir die Bezeichnungen  $\frac{dm}{dt}$ ,  $\frac{d\varphi}{dt}$  wieder auflösen, können wir folgendes Theorem aussprechen:

Satz 1.

Die Gleichungen (1.), (2.) lassen sich durch das System ersetzen:

$$(9.) \quad \begin{cases} \frac{\partial m_r}{\partial t} + u \frac{\partial m_r}{\partial x} + u_1 \frac{\partial m_r}{\partial x_1} + \dots = \Pi' \varphi_r, \\ \frac{\partial \varphi_r}{\partial t} + u \frac{\partial \varphi_r}{\partial x} + u_1 \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_1} + \dots = -\Pi' m_r, \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_{2n}} = 0, \end{cases}$$

wo

$$u_k = \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} + m_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + m_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_k} + \dots + m_n \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_k},$$

und wo  $\Pi$  eine willkürliche Function von  $t$ ,  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ ,  $m_1, \dots, m_n$  bedeutet.

Dieses System enthält  $2n$  Gleichungen der ersten, eine der zweiten Ordnung. Nachdem es integrirt, ergeben sich die  $u$  von selbst aus obiger Gleichung;  $V$  ist bestimmt durch die Gleichung:

$$(10.) \quad V = \left( \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \sum_r m_r \frac{\partial \varphi_r}{\partial t} \right) + \frac{1}{2} \sum_k \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} + \sum_r m_r \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_k} \right)^2 + \Pi.$$

Die Gleichungen (3.) endlich kommen zurück auf das System:

$$(11.) \quad \frac{d\varphi_r}{dt} = -\Pi' m_r, \quad \frac{dm_r}{dt} = \Pi' \varphi_r.$$

Das fehlende Integral des Systems (3.), welches eine Gleichung mehr

als das vorliegende enthält, giebt das Princip des letzten Multipliators.

Diesem Theoreme kann man das folgende hinzufügen, welches sich ohne Weiteres verificiren läßt:

Satz 2.

Die Gleichungen (9.) machen das Integral

$$\int^{2n+2} V dx dx_1 \dots dx_{2n} dt$$

zu einem Maximum oder Minimum,  $V$  durch die Gleichung (10.) ausgedrückt gedacht.

Diese Gleichungen enthalten eine willkürliche Function  $\Pi$ . Inzwischen, da man annehmen darf, dafs die Integrale eines Systems von  $2n$  Gleichungen der ersten und einer Gleichung der zweiten Ordnung, an sich ebenso viel Willkürlichkeiten enthalten müssen, als die Integrale eines Systems von  $2n+2$  Gleichungen erster Ordnung; so scheint es dafs die Gleichungen (9.), in welche auferdem noch  $\Pi$  eingeht, mehr Willkürliches mit sich führen, als der Natur der Aufgabe nach zulässig ist. Dieser Ueberschufs von Willkürlichem darf daher auf die abhängigen Functionen des ursprünglichen Problems keinen Einflufs ausüben; er mufs aus den Ausdrücken von  $V, u, u_1, \dots u_{2n}$  verschwinden. Ich werde nun in der That zeigen,

dafs es, ohne die Allgemeinheit der Werthe von  $V, u, u_1, \dots u_{2n}$  zu beeinträchtigen, erlaubt ist, die Function  $\Pi$  gleich Null zu setzen.

§. 3.

Die Gleichungen (11.) haben die canonische Form, welche bekanntlich es erlaubt, den Integralen dieser Gleichungen eine entsprechende Form zu geben, und dieselben auszudrücken durch die vollständige Lösung einer partiellen Differentialgleichung. In der That, man kann stets eine Function ( $W$ ) von  $t, \varphi_1, \varphi_2, \dots \varphi_n$  und von  $n$  Constanten  $a_1, a_2, \dots a_n$  so bestimmen, dafs

$$(12.) \quad \begin{cases} m_1 = \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_1}\right), & m_2 = \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_2}\right), & \dots & m_n = \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_n}\right), \\ -\alpha_1 = \left(\frac{\partial W}{\partial a_1}\right), & -\alpha_2 = \left(\frac{\partial W}{\partial a_2}\right), & \dots & -\alpha_n = \left(\frac{\partial W}{\partial a_n}\right) \end{cases}$$

die Integrale der Gleichungen (11.) sind, während die  $\alpha$  neue Constanten bedeuten; und man hat ferner

$$(13.) \quad \left(\frac{\partial W}{\partial t}\right) = \Pi,$$

woraus die für  $W$  bestehende partielle Differentialgleichung hervorgeht, wenn man aus  $\Pi$  die  $m$  mit Hilfe der ersten Gleichungen (12.) eliminiert.

Man kann nun offenbar statt der Function  $\Pi$  die eine gleiche Willkürlichkeit enthaltende Function ( $W$ ) in die Rechnung einführen; wo nur, sobald man von den gewöhnlichen Differentialgleichungen zu den partiellen übergeht, die  $a, \alpha$  nicht mehr als Constante, sondern als Functionen von  $t, x, x_1, \dots, x_{2n}$  zu betrachten sind. Und zugleich kann man auch statt der  $m, \varphi$  sich diese Functionen  $a, \alpha$  in die Gleichungen als abhängige Variable eingeführt denken; wo denn auch in ( $W$ ) die  $\varphi$  durch diese Functionen zu ersetzen sind. Sehen wir, wie sich die Functionen  $V, u$  durch diese neuen abhängigen Variablen ausdrücken.

Wenn man die Gleichungen (12.) in die Ausdrücke der  $u$  einführt, so gehen dieselben zunächst über in:

$$u_k = \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} + \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_1}\right) \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_2}\right) \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_k} + \dots + \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_n}\right) \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_k}.$$

Bezeichnen wir aber durch  $W$  die Function ( $W$ ), wenn wir sie als Function der  $t, x, x_1, \dots, x_{2n}$  betrachten, so ist offenbar:

$$\frac{\partial W}{\partial x_k} = \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_1}\right) \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_2}\right) \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_k} + \dots + \left(\frac{\partial W}{\partial a_1}\right) \frac{\partial a_1}{\partial x_k} + \left(\frac{\partial W}{\partial a_2}\right) \frac{\partial a_2}{\partial x_k} + \dots$$

und man kann also, wieder mit Hilfe der Gleichungen (12.), den obigen Ausdruck von  $u$  auch durch den folgenden ersetzen:

$$(14.) \quad u_k = \frac{\partial \cdot \varphi + W}{\partial x_k} + \alpha_1 \frac{\partial a_1}{\partial x_k} + \alpha_2 \frac{\partial a_2}{\partial x_k} + \dots + \alpha_n \frac{\partial a_n}{\partial x_k}.$$

Bemerken wir noch, dafs auch

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \left(\frac{\partial W}{\partial t}\right) + \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_1}\right) \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} + \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_2}\right) \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} + \dots + \left(\frac{\partial W}{\partial a_1}\right) \frac{\partial a_1}{\partial t} + \left(\frac{\partial W}{\partial a_2}\right) \frac{\partial a_2}{\partial t} + \dots,$$

so geht der Ausdruck

$$\Pi + \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \sum_r m_r \frac{\partial \varphi_r}{\partial t} = \left(\frac{\partial W}{\partial t}\right) + \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \sum_r \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi_r}\right) \frac{\partial \varphi_r}{\partial t}$$

in den folgenden über:

$$\frac{\partial \cdot \varphi + W}{\partial t} + \alpha_1 \frac{\partial a_1}{\partial t} + \alpha_2 \frac{\partial a_2}{\partial t} + \dots + \alpha_n \frac{\partial a_n}{\partial t}.$$

Daher nimmt die Gleichung (10.) unmittelbar die Gestalt an:

$$(15.) \quad V = \frac{\partial \cdot \varphi + W}{\partial t} + \alpha_1 \frac{\partial a_1}{\partial t} + \alpha_2 \frac{\partial a_2}{\partial t} + \dots + \frac{1}{2} \sum_k \left( \frac{\partial \cdot \varphi + W}{\partial x_k} + \alpha_1 \frac{\partial a_1}{\partial x_k} + \alpha_2 \frac{\partial a_2}{\partial x_k} + \dots \right)^2.$$



Vergleichen wir jetzt die Gleichungen (14.), (15.) mit den Gleichungen (7.), (10.). Man sieht sogleich, daß nur an die Stelle von  $\varphi$  die Function  $\varphi + W$  getreten ist; an die Stelle der  $m$  aber die  $\alpha$ , an die Stelle der  $\varphi$  die  $a$ ; endlich, daß die Function  $II$  verschwunden ist. Da nun ferner den Gleichungen (11.) offenbar die folgenden entsprechen:

$$(16.) \quad \frac{da_r}{dt} = 0, \quad \frac{d\alpha_r}{dt} = 0,$$

welche, aufgelöst, Gleichungen ergeben, die den Gleichungen (9.) vollständig ähnlich sind; so sieht man ein, daß das jetzt erlangte reducirte Problem sich von dem in dem Satz 1. enthaltenen nur dadurch unterscheidet, daß die Function  $II$  gleich Null gesetzt ist, und daß an die Stelle der Buchstaben  $\varphi$ ,  $m$  andere getreten sind. Aber zugleich werden die gewöhnlichen Differentialgleichungen integrabel; und indem wir also zu den frühern Bezeichnungen zurückkehren, können wir folgendes Theorem aufstellen:

**Satz 3.**

*Die Gleichungen (1.), (2.) können ersetzt werden durch das System*

$$(17.) \quad \begin{cases} \frac{\partial m_r}{\partial t} + u \frac{\partial m_r}{\partial x} + u_1 \frac{\partial m_r}{\partial x_1} + \dots + u_{2n} \frac{\partial m_r}{\partial x_{2n}} = 0, \\ \frac{\partial \varphi_r}{\partial t} + u \frac{\partial \varphi_r}{\partial x} + u_1 \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_1} + \dots + u_{2n} \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_{2n}} = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_{2n}} = 0, \end{cases}$$

wo

$$u_k = \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} + m_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + m_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_k} + \dots + m_n \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_k}.$$

*Von diesen Gleichungen sind zwei von der ersten, eine von der zweiten Ordnung. Nachdem sie integrirt sind, ergeben sich die  $u$  aus der obigen Formel,  $V$  aber aus der Gleichung:*

$$(18.) \quad V = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + m_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} + m_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} + \dots + m_n \frac{\partial \varphi_n}{\partial t} \\ + \frac{1}{2} \sum_k \left\{ \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} + m_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + m_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_k} + \dots + m_n \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_k} \right\}^2;$$

*und die Gleichungen (3.) haben zu Integralen die Gleichungen:*

$$(19.) \quad m_r = \text{Const.}, \quad \varphi_r = \text{Const.},$$

*zu denen ein letztes Integral tritt, welches aus den Gleichungen (3.) und (19.) mit Hülfe des letzten Multiplcators gewonnen wird.*

Hierdurch also ist das vorgelegte System zurückgeführt auf ein anderes, welches nicht mehr Willkürlichkeiten in seiner allgemeinen Lösung enthält als jenes; und welches die Eigenschaft hat, die Integrale der hinzutretenden gewöhnlichen Differentialgleichungen ohne Weiteres zu ergeben. — Man fügt leicht das folgende Theorem hinzu:

Satz 4.

Die Gleichungen (17.) machen das Integral

$$\int^{(2n+2)} V dx dx_1 \dots dx_{2n} dt$$

zu einem Maximum oder Minimum, wo  $V$  durch die Gleichung (18.) ausgedrückt zu denken ist.

§. 4.

Es bleibt nichts übrig, als die erlangten Resultate nunmehr für den Fall der Hydrodynamik auszusprechen, für welchen  $n=1$  ist. Sei  $U$  die Kräftefunction,  $p$  der Druck,  $q$  die Dichtigkeit, so hat man demnach folgenden Satz:

Satz 5.

Die Gleichungen

$$(20.) \quad \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left( U - \frac{p}{q} \right) = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z}, \\ \frac{\partial}{\partial y} \left( U - \frac{p}{q} \right) = \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z}, \\ \frac{\partial}{\partial z} \left( U - \frac{p}{q} \right) = \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z}, \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

lassen sich auf die Aufgabe zurückführen, das Integral

$$\iiiii \left( U - \frac{p}{q} \right) dt dx dy dz$$

zu einem Maximum oder Minimum zu machen, wo

$$(21.) \quad U - \frac{p}{q} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + m \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{u^2 + v^2 + w^2}{2}$$

zu setzen ist, und für die  $u, v, w$  die Ausdrücke gelten:

$$(22.) \quad \begin{cases} u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} + m \frac{\partial \psi}{\partial x}, \\ v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} + m \frac{\partial \psi}{\partial y}, \\ w = \frac{\partial \varphi}{\partial z} + m \frac{\partial \psi}{\partial z}. \end{cases}$$

*Die Integrale der Gleichungen*

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{dy}{dt} = v, \quad \frac{dz}{dt} = w$$

werden dann:

$$(23.) \quad m = \text{Const.}, \quad \psi = \text{Const.}$$

und ein drittes, welches die Theorie des letzten Multiplcators ergibt.

Die Gleichungen, auf welche die Aufgabe zurückkommt, werden hiernach:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial m}{\partial t} + \left( \frac{\partial m}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial m}{\partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial m}{\partial z} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) + m \left( \frac{\partial m}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial m}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial m}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right), \\ 0 &= \frac{\partial \psi}{\partial t} + \left( \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) + m \left( \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right), \\ 0 &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} + m \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} + m \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} + m \frac{\partial \psi}{\partial z} \right). \end{aligned}$$

Es ist sehr leicht von diesen Gleichungen, für den stationären Zustand, zu denjenigen überzugehen, welche ich an dem angeführten Orte entwickelt habe; indem man nur bemerkt, wie aus der im Anfange des §. 3 aufgestellten Betrachtung sich ergibt, daß man nur *eines* der  $m, \psi$  von  $t$  vollkommen frei annehmen darf, während das andere von der Form  $tf + F$  ist.

Ich bemerke nur noch, daß die Gleichung (21.) die der lebendigen Kraft ist; in einer sehr bekannten Gestalt, wenn man, zu der gewöhnlichen Annahme zurückkehrend,  $m$  verschwinden läßt.

Berlin, den 1. März 1858.