Werk

Titel: Über die wesentliche Maximalität gleichmäßig stark elliptischer Operatoren in L_2 ...

Autor: Hess, Peter

Jahr: 1968

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?266833020_0107|log14

Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

Über die wesentliche Maximalität gleichmäßig stark elliptischer Operatoren in $L^2(R^n)$

PETER HESS

1. Einleitung

In der vorliegenden Arbeit untersuchen wir die wesentliche Maximalität gleichmäßig stark elliptischer Differentialoperatoren der Ordnung $2m$ in $L^2(R^n)$. Der Begriff „wesentliche Maximalität eines Differentialoperators“ erweitert den Begriff „wesentliche Selbstadjungiertheit“ für den Fall nicht formal selbstadjungierter Differentialausdrücke.

Es sei
$$l = \sum_{|p|, |q| \leq m} (-1)^{|p|} D^p a_{pq}(x) D^q$$

ein linearer partieller Differentialausdruck der Ordnung $2m$ ¹, definiert auf dem n -dimensionalen reellen euklidischen Raum R^n . Wir treffen die folgenden Voraussetzungen:

1) Die komplexwertigen Koeffizienten a_{pq} sind von der Klasse $C^{|p|+|q|}$ und mitsamt ihren partiellen Ableitungen aller Ordnungen $\leq \max(|p|, |q|)$ gleichmäßig beschränkt auf R^n .

2) Die Funktionen a_{pq} sind für $|p|=|q|=m$ gleichmäßig stetig auf R^n .

3) Der Ausdruck l ist gleichmäßig stark elliptisch auf R^n , d. h. es existiert eine positive Zahl K_0 derart, daß

$$\operatorname{Re} (-1)^m \sum_{|p|=|q|=m} a_{pq}(x) \xi^p \bar{\xi}^q \geq K_0 |\xi|^{2m}$$

für alle reellen Vektoren $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ und alle $x \in R^n$ gilt, wobei definitionsgemäß $|\xi|^2 = \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2$ und $\xi^p = \xi_1^{p_1} \dots \xi_n^{p_n}$ ($p = (p_1, \dots, p_n)$) ist.

Der zu l formal adjungierte Differentialausdruck l' ist gegeben durch

$$l' = \sum_{|p|, |q| \leq m} (-1)^{|p|} D^p \overline{a_{qp}(x)} D^q.$$

Für Funktionen $\varphi, \psi \in C_0^\infty$ gilt dann³

$$(l\varphi, \psi)_0 = (\varphi, l'\psi)_0.$$

Falls speziell $a_{pq} = \bar{a}_{qp}$ ist, heißt der Ausdruck l *formal selbstadjungiert*.

¹ Dabei ist $p = (p_1, \dots, p_n)$ ein Multiindex mit nichtnegativen ganzen Zahlen $p_1, \dots, p_n$, $|p| = p_1 + \dots + p_n$, $D^p = D_1^{p_1} \dots D_n^{p_n}$ ($D_i = \partial/\partial x_i$).

² C^t ist die Menge der t -mal stetig differenzierbaren komplexwertigen, auf R^n definierten Funktionen und $C^\infty = \bigcap_{t=0}^\infty C^t$. Die Menge der Funktionen aus C^∞ , die je einen kompakten Träger haben, bezeichnen wir mit C_0^∞ .

³ $(\cdot, \cdot)_0$ bedeutet das Skalarprodukt im Hilbertraum $L^2(R^n)$.

Die durch die Ausdrücke l und l' auf der Menge C_0^∞ definierten linearen Operatoren des Raumes $L^2(\mathbb{R}^n)$ seien L_0 bzw. L'_0 . Da in $L^2(\mathbb{R}^n)$ die Beziehung

$$L_0 \subset (L'_0)^* \quad (1.1)$$

gilt, ist der Operator L_0 abschließbar. Die durch l erzeugten „minimalen“ und „maximalen“ Operatoren $L_{\min}$ bzw. $L_{\max}$ sind durch

$$L_{\min} = (L_0)^{**} \quad \text{bzw.} \quad L_{\max} = (L_0)^* \quad (1.2)$$

definiert. Entsprechend sind die Operatoren $L'_{\min}$ und $L'_{\max}$ durch

$$L'_{\min} = (L'_0)^{**} \quad \text{bzw.} \quad L'_{\max} = (L'_0)^* \quad (1.3)$$

erklärt. Aus (1.1) folgt

$$L_{\min} \subset L_{\max}. \quad (1.4)$$

Der Operator L_0 heißt *wesentlich maximal* in $L^2(\mathbb{R}^n)$, falls $L_{\min} = L_{\max}$ gilt. Den Definitionen (1.2) und (1.3) entnehmen wir, daß mit L_0 auch der Operator L'_0 wesentlich maximal ist in $L^2(\mathbb{R}^n)$, und umgekehrt.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den folgenden Satz zu beweisen:

Satz. *Es sei l ein auf $\mathbb{R}^n$ definierter linearer partieller Differentialausdruck der Ordnung $2m$, der die Voraussetzungen 1)–3) erfüllt. Dann ist der Operator L_0 wesentlich maximal in $L^2(\mathbb{R}^n)$.*

Wenn der Ausdruck l formal selbstadjungiert ist, ist der Operator L_0 also wesentlich selbstadjungiert in $L^2(\mathbb{R}^n)$.

Dieser Satz läßt sich aus einem Resultat von Browder ([2], Theorem 21) folgern. Wir bringen jedoch einen eigenen Beweis, der nirgends die explizite Kenntnis des Definitionsbereiches des „maximalen“ Differentialoperators $L_{\max}$ verlangt.

2. Gleichmäßig stark elliptische Differentialausdrücke

Der Ausdruck l erfülle die Voraussetzungen 1)–3). Dann existieren zwei reelle Konstanten $c_0 > 0$ und k_0 derart, daß die Gårding-Ungleichung

$$\operatorname{Re}(L_0 \varphi, \varphi)_0 = \operatorname{Re}(L'_0 \varphi, \varphi)_0 \geq c_0 \|\varphi\|_m^2 - k_0 \|\varphi\|_0^2 \quad (2.1)$$

für alle $\varphi \in C_0^\infty$ erfüllt ist (vgl. [1], Kapitel 7). Dabei ist definitionsgemäß

$$\|\varphi\|_t^2 = \sum_{|p| \leq t} \int_{\mathbb{R}^n} |D^p \varphi|^2 dx.$$

Auf Grund der Voraussetzung 1) gibt es außerdem eine Zahl c mit der Eigenschaft, daß

$$|(L_0 \varphi, \psi)_0| \leq c \|\varphi\|_m \|\psi\|_m \quad (2.2)$$

für alle $\varphi, \psi \in C_0^\infty$ gilt (vgl. [1], S. 99). Mit Hilfe des Darstellungssatzes von Lax und Milgram beweist man die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung des verallgemeinerten Dirichletproblems:

Lemma 1. ([1], S. 97–102.) Sei $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ beliebig vorgegeben. Unter den Voraussetzungen 1)–3) existiert eine und nur eine Funktion $u \in H_0^m(\mathbb{R}^n)$ so, daß

$$((L_0 + k_0)\varphi, u)_0 = (\varphi, f)_0 \quad (2.3)$$

für alle $\varphi \in C_0^\infty$ gilt⁴.

Für den Beweis unseres Satzes benötigen wir noch das folgende

Lemma 2. Der Differentialausdruck l erfülle die Voraussetzungen 1)–3), und die Funktion $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ genüge mit einer positiven Konstanten K der Ungleichung

$$|(L_0\varphi, u)_0| \leq K \|\varphi\|_0 \quad (2.4)$$

für alle $\varphi \in C_0^\infty$. Dann ist $u \in H^{2m}(\mathbb{R}^n)$.

Beweis. Da mit l auch der Ausdruck l' den Bedingungen 1)–3) genügt, liefert ein bekannter Regularitätssatz (vgl. z.B. [1], Satz 6.3) die Beziehung $u \in H_{\text{loc}}^{2m}(\mathbb{R}^n)$. Damit sind aber die Voraussetzungen von Satz 3 aus [2] erfüllt⁵, und es folgt $u \in H^{2m}(\mathbb{R}^n)$.

3. Beweis des Satzes

Wir zeigen zunächst, daß⁶

$$K(L_{\max} + k_0) = K(L'_{\max} + k_0) = \{0\} \quad (3.1)$$

ist: Sei $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ eine Funktion aus dem Kern von $L_{\max} + k_0$. Dann gilt

$$(L_0\varphi, u)_0 = -(\varphi, k_0 u)_0$$

für alle $\varphi \in C_0^\infty$, und die Voraussetzungen von Lemma 2 sind erfüllt mit $K = |k_0| \|u\|_0$. Die Funktion u liegt folglich in $H^{2m}(\mathbb{R}^n)$ und ist deshalb in $H^m(\mathbb{R}^n)$ enthalten. Da für $\Omega = \mathbb{R}^n$ die Räume $H^m(\Omega)$ und $H_0^m(\Omega)$ identisch sind, ist u eine Lösung der Gl. (2.3) mit $f=0$. Aus der Eindeutigkeit dieser Lösung folgt $u=0$. Analog ergibt sich $K(L'_{\max} + k_0) = \{0\}$.

Aus (2.1) erhalten wir die Beziehung

$$\|(L_0 + k_0)\varphi\|_0 \geq c_0 \|\varphi\|_0 \quad (3.2)$$

für alle $\varphi \in C_0^\infty$; der Operator $L_0 + k_0$ besitzt also ein beschränktes Inverses $(L_0 + k_0)^{-1}$. Wir schließen daraus, daß die Wertemenge der Abschließung $L_{\min} + k_0$ des Operators $L_0 + k_0$ abgeschlossen ist in $L^2(\mathbb{R}^n)$ (vgl. [3], S. 475, Satz 2). Der orthogonalen Zerlegung

$$L^2(\mathbb{R}^n) = K(L_{\max} + k_0) \oplus W(L_{\min} + k_0)$$

des Raumes $L^2(\mathbb{R}^n)$ entnehmen wir unter Verwendung von (3.1) die Relation

$$W(L_{\min} + k_0) = L^2(\mathbb{R}^n). \quad (3.3)$$

⁴ Wegen der Definition der Räume $H^l(\Omega)$, $H_{\text{loc}}^l(\Omega)$ und $H_0^l(\Omega)$ vergleiche man [1], S. 2, 8 bzw. 97.

⁵ Beachte, daß für ein beliebiges Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ die Gleichheit $W^{2m}(\Omega) = H^{2m}(\Omega)$ gilt ([1], S. 11).

⁶ Mit $K(A)$ bezeichnen wir den Kern, mit $W(A)$ die Wertemenge des Operators A .

Wegen (1.4) gilt folglich auch

$$W(L_{\max} + k_0) = L^2(\mathbb{R}^n). \quad (3.4)$$

Die Operatoren $L_{\min} + k_0$ und $L_{\max} + k_0$ sind dank (1.4) und (3.1) invertierbar. Da

$$(L_{\min} + k_0)^{-1} \subset (L_{\max} + k_0)^{-1}$$

und die Definitionsmengen der Operatoren $(L_{\min} + k_0)^{-1}$ und $(L_{\max} + k_0)^{-1}$ zusammenfallen, gilt

$$(L_{\min} + k_0)^{-1} = (L_{\max} + k_0)^{-1},$$

und es folgt

$$L_{\min} = L_{\max}, \quad \text{w. z. b. w.}$$

Literatur

1. Agmon, S.: Lectures on elliptic boundary value problems. Princeton, N.J.: Van Nostrand mathematical studies 1965.
2. Browder, F. E.: On the spectral theory of elliptic differential operators I. Math. Ann. **142**, 22–130 (1961).
3. Smirnow, W. I.: Lehrgang der höheren Mathematik, Teil V. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften 1962.

Peter Hess
Scheideggstraße 124
CH 8038 Zürich

(Eingegangen am 14. November 1967)