

Werk

Label: Article

Jahr: 1955

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311157X_0080|log19

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

O SVAZOVĚ USPOŘÁDANÝCH GRUPOIDECH

VÁCLAV KUDLÁČEK, Brno.

(Došlo dne 13. května 1954.)

DT: 519.4

Ve své práci pojednávám o svazově uspořádaných grupoidech, t. j. o množinách, které jsou současně grupoid a svaz. Mým cílem bylo především zobecnění některých výsledků, které byly získány pro svazově uspořádané grupy, jak jsou uvedeny jednak v (BL), jednak v (LG), jednak v (KB),*) na které mě upozornil prof. dr O. BORŮVKA. Ve zobecnění daných výsledků jsem postupoval tím způsobem, že jsem vyneschal některé axiomaty grupy a volil pak vztah mezi svazovým násobením a násobením v grupoidu. Věta první, druhá a pátá si všimá vztahu monotonie uspořádání pro násobení a zákonů distributivních pro násobení. Věta třetí ukazuje, že komutativní svazově uspořádaný grupoid s krácením je distributivní svaz. Věta šestá a sedmá určuje podmínky, kdy svazově uspořádaný grupoid je jednoduše uspořádaný. V textu je uvedeno několik příkladů svazově uspořádaných grupoidů.

Definice 1. Částečně uspořádaný grupoid je grupoid, jehož pole je částečně uspořádaná množina v relaci \leq a kde pro libovolné prvky $a, x, y \in G$ platí

$$(U) \quad x \leq y \Rightarrow a \cdot x \leq a \cdot y, \quad x \cdot a \leq y \cdot a.$$

Definice 2. Svazově uspořádaný grupoid je částečně uspořádaný grupoid, jehož pole je svaz.

Poznámka: Ve svazově uspořádaném grupoidu G jsou každé uspořádané dvojici prvků (a, b) z grupoidu G přiřazeny prvky $a \cdot b, a \cup b, a \cap b$ opět z grupoidu G . Je tedy svazově uspořádaný grupoid množina s trojím násobením nebo jinak svaz s třetím násobením, které je vázáno vztahem (U) .

Věta 1. Nechť G je svaz s třetím násobením, které je se svazovými operacemi vázáno vztahy, bud

$$(D1) \quad a \cdot (x \cup y) = a \cdot x \cup a \cdot y,$$

$$(D2) \quad (x \cup y) \cdot a = x \cdot a \cup y \cdot a,$$

nebo

$$(D1') \quad a \cdot (x \cap y) = a \cdot x \cap a \cdot y,$$


$$(D2') \quad (x \cap y) \cdot a = x \cdot a \cap y \cdot a,$$

*) Viz seznam literatury na konci této práce.

kde $a, x, y \in G$. Pak G je svazově uspořádaný grupoid. Je-li G svazově uspořádaný grupoid, nemusí platit žádný ze vztahů $(D1)$, $(D2)$, $(D1')$, $(D2')$.

Důkaz: Nechť G je svaz s třetím násobením. Nechť platí $(D1)$ a $(D2)$. Nechť jsou $a, x, y \in G$ takové, že $x \leq y$; pak $y = x \cup y$ a dále $a \cdot y = a \cdot (x \cup y) = a \cdot x \cup a \cdot y$, tedy $a \cdot x \leq a \cdot y$. Podobně $y \cdot a = (x \cup y) \cdot a = x \cdot a \cup y \cdot a$, tedy $x \cdot a \leq y \cdot a$. Platí tedy (U) a G je svazově uspořádaný grupoid. Podobně dokážeme platnost vztahu (U) z platnosti $(D1')$ a $(D2')$.

Nechť G je svazově uspořádaný grupoid, pak pro porovnatelné prvky $x, y \in G$ zřejmě platí distributivní zákony $(D1)-(D2')$. Neboť ať na př. $x \leq y$, pak také $a \cdot x \leq a \cdot y$, $x \cdot a \leq y \cdot a$, pro $x, y, a \in G$. Dále $x \cup y = y$, $a \cdot x \cup a \cdot y = a \cdot y = a \cdot (x \cup y)$ a také $x \cdot a \cup y \cdot a = y \cdot a = (x \cup y) \cdot a$. Podobně se ukáže platnost $(D1')$ a $(D2')$.



Obr. 1.

Příklad 1. Ukážeme nyní na příkladě, že pro neporovnatelné prvky svazově uspořádaného grupoidu nemusí platit žádný ze vztahů $(D1)-(D2')$. Nechť G je svazově uspořádaný grupoid. Svazové násobení je dáno diagramem (obr. 1), grupoidní násobení je dáno tabulkou:

	j	a	b	c	n
j	j	a	a	a	b
a	a	a	a	c	n
b	a	b	b	n	n
c	b	c	n	n	n
n	n	n	n	n	n

Zřejmě je splněn vztah (U) . Distributivní zákony $(D1)-(D2')$ neplatí, na př.

$$\begin{aligned} a &= a \cdot j = a \cdot (b \cup c) \neq a \cdot b \cup a \cdot c = a \cup c = j, \\ a &= j \cdot a = (b \cup c) \cdot a \neq b \cdot a \cup c \cdot a = b \cup c = j, \\ b &= j \cdot n = j \cdot (b \cap c) \neq j \cdot b \cap j \cdot c = a \cap a = a, \\ n &= n \cdot j = (b \cap c) \cdot j \neq b \cdot j \cap c \cdot j = a \cap b = b. \end{aligned}$$

Tím je věta dokázána.

Věta 2. Nechť G je komutativní svazově uspořádaný grupoid, v němž platí $(D1)$, $(D1')$, pak platí

$$(K) \quad (a \cup b) \cdot (a \cap b) = a \cdot b.$$

Naopak svazově uspořádaný grupoid, v kterém platí (K) , je komutativní, ale nemusí v něm nutně platit $(D1)$ a $(D1')$.

Důkaz: Nechť G je komutativní svazově uspořádaný grupoid, v němž platí $(D1)$ a $(D1')$. Protože G je komutativní grupoid platí, také $(D2)$ a $(D2')$. Nechť $a, b \in G$. Násobme nerovnosti $a \cup b \geqq a \geqq a \cap b$, resp. $a \cup b \geqq b \geqq a \cap b$ prvky

b resp. a . Pak máme $(a \cup b) \cdot b \cap (a \cup b) \cdot a \geq a \cdot b \geq (a \cap b) \cdot b \cup (a \cap b) \cdot a$; dále $(a \cup b) \cdot (a \cap b) \geq a \cdot b \geq (a \cup b) \cdot (a \cap b)$. Musí tedy platit (K) .

Druhou část tvrzení dokažme na příkladě.

Příklad 2. Nechť G je svazově uspořádaný grupoid. Svazové násobení je dáno obrázkem (obr. 1) a grupoidní násobení je dáno tabulkou.

	j	a	b	c	n
j	j	j	j	j	j
a	j	j	j	j	j
b	j	j	j	j	c
c	j	j	j	j	c
n	j	j	c	c	n

Násobení je zřejmě komutativní. Vztah (K) je splněn pro porovnatelné prvky. Pro neporovnatelné prvky obdržíme:

$$(a \cup c) \cdot (a \cap c) = j \cdot n = a \cdot c = j, \quad (b \cup c) \cdot (b \cap c) = j \cdot n = b \cdot c = j.$$

Neplatí $(D1)$, neboť

$$c = c \cup c = n \cdot b \cup n \cdot c \neq n \cdot (b \cup c) = n \cdot j = j.$$

Neplatí $(D1')$, neboť

$$c = c \cap c = n \cdot b \cap n \cdot c \neq n \cdot (b \cap c) = n \cdot n = n.$$

Tím je naše věta dokázána.

Podobnou větu dokazuje poněkud jinak F. KLEIN-BARMEN (KB, Satz 1, s. 88), ale předpokládá platnost asociativního zákona pro grupoidní násobení. V dalším klade otázku, zda naopak z platnosti vztahu (K) vyplývají vztahy $(D1)$ a $(D1')$ u asociativních svazově uspořádaných grupoidů. Odpověď je záporná, jak dokazuje předchozí příklad 2, v němž se jedná o asociativní grupoid.

Věta 3. Nechť G je svaz s třetím násobením. Nechť platí (K) a pravidlo o krácení, t. j.

$$a \cdot x = a \cdot y \Rightarrow x = y;$$

pak G je distributivní svaz.

Poznámka: Podobnou větu pro svazově uspořádané grupy, ale nekomutativní dokazuje BIRKHOFF (BL, Chapt. XIV, Th. 5, p. 219). Pro svazově uspořádané grupoidy podobnou větu dokazuje Klein-Barmen (KB, Satz 6, s. 93). Využívá opět asociativního zákona.

Důkaz: Použijme věty, která je v BL, Chapt. IX, Th. 2, Cor. 1, p. 134. Svaz S je distributivní, platí-li pro libovolné prvky $a, x, y \in S$

$$\left. \begin{array}{l} a \cup x = a \cup y \\ a \cap x = a \cap y \end{array} \right\} \Rightarrow x = y.$$

Nechť tedy a, x, y jsou libovolné prvky z G , pro které platí $a \cup x = a \cup y$, $a \cap x = a \cap y$. Vynásobením těchto rovnic dostaneme $(a \cup x) \cdot (a \cap x) = (a \cup y) \cdot (a \cap y)$, z čehož $a \cdot x = a \cdot y$. Po zkrácení máme $x = y$. Je tedy G distributivní svaz.

Věta 4. Nechť G je svazově uspořádaný grupoid, v kterém platí pravidla o krácení. Pak pole grupoidu G nemůže být konečná množina.

Důkaz: Je-li pole konečná množina, je G quasigrupa. Nechť $j \in G$ je jednička svazu, nechť x je libovolný prvek z G , pak existuje prvek $y \in G$ tak, že $x \cdot y = j$. Platí $j \geqq y$, z čehož $x \cdot j \geqq x \cdot y = j$. Je tedy $x \cdot j = j$ pro všechna $x \in G$, což je spor.

Definice 3. Nechť G je částečně uspořádaný grupoid, který je současně quasigrupa, pak grupoid G nazveme částečně uspořádanou quasigrupou. Když G je svaz, pak G nazveme svazově uspořádanou quasigrupou.

Označme

$$(H) \quad a \cdot x \leqq a \cdot y \Leftrightarrow x \leqq y, \quad x \cdot a \leqq y \cdot a \Leftrightarrow x \leqq y.$$

Věta 5. Nechť G je svazově uspořádaná quasigrupa. Když a jen když platí (H), pak platí (D1), (D2).

Důkaz: 1a) Nechť platí (D1), (D2). Nechť $x, y, a \in G$, $x \leqq y$. Potom $a \cdot (x \cup y) = a \cdot y = a \cdot x \cup a \cdot y$, tedy $a \cdot x \leqq a \cdot y$.

b) Nechť $a \cdot x \leqq a \cdot y$, pak $a \cdot x \cup a \cdot y = a \cdot y = a \cdot (x \cup y)$, z toho $y = x \cup y$, tedy $x \leqq y$. Podobně pro $x \cdot a \leqq y \cdot a$.

2. Nechť platí (H). Nechť $a, x, y \in G$, pak existuje $c \in G$ tak, že platí

$$\begin{aligned} a \cdot x \leqq a \cdot x \cup a \cdot y &= a \cdot c, \text{ pak } a \cdot x \leqq a \cdot c, \text{ tedy } x \leqq c, \\ a \cdot y \leqq a \cdot x \cup a \cdot y &= a \cdot c, \text{ pak } a \cdot y \leqq a \cdot c, \text{ tedy } y \leqq c. \end{aligned}$$

Nechť pro nějaké $d \in G$ platí $x \leqq d$, $y \leqq d$, pak $a \cdot x \leqq a \cdot d$, $a \cdot y \leqq a \cdot d$ a $a \cdot c \leqq a \cdot d$; z toho $c \leqq d$ a $c = x \cup y$. Máme tedy $a \cdot (x \cup y) = a \cdot x \cup a \cdot y$.

Podobně postupujeme pro $(x \cup y) \cdot a = x \cdot a \cup y \cdot a$.

Poznámka 1. Věta 5 platí, zaměníme-li v ní (D1) a (D2) pomocí (D1') a (D2').

Poznámka 2. Podobnou větu dokazuje Birkhoff v (BL) pro svazově uspořádané grupy.

Definice 4. Nechť G je svazově uspořádaná lupa (t. j. svazově uspořádaná quasigrupa s jedničkou). Jednoznačně stanovený prvek $a^{-1} \in G$ s vlastností $a \cdot a^{-1} = e$ nazýváme (pravým) inversním prvkem.

Poznámka: Birkhoff v (BL) v Chapt. XIV, § 4, cv. 7 definuje svazově uspořádanou lupa jinak.

Definice 5. Částečně uspořádaný grupoid G je jednoduše uspořádaný, když pole grupoidu je jednoduše uspořádáno, t. j. když pro každé dva prvky $a, b \in G$ platí jeden ze vztahů $a \leqq b$, $a \geqq b$.

Věta 6. Nechť G je svazově uspořádaná lupa, kde platí (H). Když a jen když pro libovolné prvky $a, b \in G$, $a > e$, $b > e$ platí $a \cap b > e$, pak G je jednoduše uspořádaná.

Důkaz: Když G je jednoduše uspořádaná, tvrzení je zřejmé. Nechť nyní platí podmínky věty. Ukažme nejprve, že platí-li pro nějaké dva prvky $a, b \in G$ některý ze vztahů:

$$\begin{array}{ll} 1. a \cdot b^{-1} \leqq e, & 2. e \leqq b \cdot a^{-1}, \\ 3. a \cdot b^{-1} \geqq e, & 4. e \geqq b \cdot a^{-1}, \end{array}$$

pak musí platit jeden ze vztahů $a \leqq b$, $b \leqq a$. Nechť na př. platí 1. Pak máme $b \cdot b^{-1} = e = a \cdot b^{-1} \cup e = a \cdot b^{-1} \cup b \cdot b^{-1} = (a \cup b) \cdot b^{-1}$, odtud $b = a \cup b$, tedy $a \leqq b$. Podobně pro vztahy 2—4.

Předpokládejme nyní, že pro některé dva prvky $a, b \in G$ neplatí ani jeden ze vztahů 1.—4. Musí tedy platit

$$\begin{array}{ll} a \cdot b^{-1} \cup e > e, & b \cdot a^{-1} \cup e > e, \\ a \cdot b^{-1} \cap e < e, & b \cdot a^{-1} \cap e < e. \end{array}$$

Je tedy

$$(A) \quad (a \cdot b^{-1} \cup e) \cap (b \cdot a^{-1} \cup e) > e.$$

Dále

$$\begin{aligned} e &\geqq (a \cdot b^{-1} \cap e) \cup (b \cdot a^{-1} \cap e) = (a \cdot b^{-1} \cap b \cdot b^{-1}) \cup (b \cdot a^{-1} \cap a \cdot a^{-1}) = \\ &= (a \cap b) \cdot b^{-1} \cup (a \cap b) \cdot a^{-1} = (a \cap b) \cdot (b^{-1} \cup a^{-1}) = a \cdot (b^{-1} \cup a^{-1}) \cap b \cdot \\ &\quad (b^{-1} \cup a^{-1}) = (a \cdot b^{-1} \cup e) \cap (e \cup b \cdot a^{-1}), \end{aligned}$$

což je spor s (A). Musí tedy platit jeden ze vztahů 1.—4. a tím je věta dokázána.

Definice 6. Nechť G je částečně uspořádaný grupoid s jednotkou e , pak prvek k se nazývá minimální kladný prvek, není-li vztah $e < x < k$ splněn pro žádné $x \in G$. Množinu všech minimálních kladných prvků nazýváme krycí množinou jednotky e .

Věta 7. Nechť G je svazově uspořádaná lupa, kde platí (H). Nechť krycí množina obsahuje právě jeden prvek k . Nechť pro každé $x \in G$, pro něž $x > e$, platí $x \geqq k$. Potom G je jednoduše uspořádaná.

Důkaz: Uvažujme $x, y \in G$ takové, že $x > e$, $y > e$. Dále máme $x \geqq k$, $y \geqq k$, $x \cap y \geqq k > e$. Je tedy G podle věty 6 jednoduše uspořádaná.

Poznámka: Věta 6 a 7 je dokázána pro svazově uspořádané grupy v (LG). Všimněme si, že jsme k důkazu vět užili pouze těchto předpokladů: G je svazově uspořádaný grupoid s jednotkou; ke každému prvku existuje inversní prvek; platí vztahy (D1)—(D2') a krácení.

Uvedme příklad svazově uspořádaného grupoidu, který vyhovuje těmto zjednodušeným předpokladům a není grpa.

Příklad 3. Nechť G je množina celých čísel. Grupoidní násobení je dáno následujícími vztahy

1. Je-li $x > 0, y > 0$, pak

$$x \cdot y = \begin{pmatrix} x+y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y \end{pmatrix}.$$

2. Je-li $x > 0, y < 0$, nebo $x < 0, y > 0$, pak

$$x \cdot y = x + y,$$

kde symbolem $x + y$ je myšleno sečítání v obvyklém smyslu.

3. Je-li $x < 0, y < 0$, pak

$$x \cdot y = -\begin{pmatrix} |x| + |y| \\ |x| \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} |x| + |y| \\ |y| \end{pmatrix}.$$

4. Je-li $x = 0$, pak pro všechna $y \in M$ platí

$$0 \cdot y = y.$$

Svazové násobení definujeme takto:

$$x \cup y = \max(x, y), \quad x \cap y = \min(x, y).$$

Tabulka pro grupoidní násobení:

...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...	
.	
.	
.	
-3	...	-20	-10	-4	-3	-2	-1	0	...
-2	...	-10	-6	-3	-2	-1	0	1	...
-1	...	-4	-3	-2	-1	0	1	2	...
0	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
1	...	-2	-1	0	1	2	3	4	...
2	...	-1	0	1	2	3	6	10	...
3	...	0	1	2	3	4	10	20	...
.
.
.

Z tabulky je zřejmé, že násobení je abelovské, není asociativní a ke každému prvku $x \in G$ existuje inversní prvek x^{-1} , který je dán vztahem $x^{-1} = -x$. Dále platí krácení. Je splněn vztah (U) . Z definice svazového násobení je zřejmé, že jsou splněny vztahy $(D1)-(D2')$ a pro $x, y \in G$ platí, když $x > e, y > e$, pak $x \cap y > e$.