

Werk

Label: Article

Jahr: 1958

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311157X_0083|log167

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

O CYKLECH CYKlickÝCH GRAFŮ

KAREL ČULÍK, Brno

(Došlo dne 28. září 1957)

DT: 519.51

Vyšetřují se otázky existence, počtu a délky cyklů a oboustranně nekonečných drah grafu $F(\varrho)$, jehož binární relace ϱ splňuje podmínku cykličnosti $(\mathbf{Z}_k)$, která je do značné míry analogická (pro $k = 3$) podmínce transitivní. Při tom se využívá pojmů a výsledků z [1] (zejména pojmu homomorfismu aj.) a dokazuje se na příklad, že graf, který obsahuje alespoň jeden cyklus a který je souvislý, je $\mathbf{Z}_k$ -grafem právě tehdy, když je homomorfním vzorem cyklu délky k ($k \geq 3$).

Základní pojmy a označení

Grafem $F(\varrho)$ se rozumí množina $F \neq \emptyset$, na níž je definována binární relace ϱ (tj. $\varrho \subset F \times F$). Prvky z F se nazývají *uzly* a prvky z ϱ (tj. uspořádané dvojice uzlů) *hranami* grafu $F(\varrho)$.

Graf $G(\sigma)$ se nazývá *subgrafem* příp. *nasyceným subgrafem* grafu $F(\varrho)$, jestliže $G \subset F$ a $\sigma \subset \varrho$ příp. $G \subset F$ a $\sigma = \varrho \cap (G \times G)$.

Posloupnost $\{u_i\}_{i=1}^d$, kde d je přirozené číslo, uzlů grafu $F(\varrho)$ se nazývá *vázaná* příp. *monotonně vázaná*, jestliže pro každé i , $1 \leq i < d$ platí buď $(u_i, u_{i+1}) \in \varrho$ nebo $(u_{i+1}, u_i) \in \varrho$ příp. $(u_i, u_{i+1}) \in \varrho$. Číslo d nazýváme její *délkou* a navíc o ní říkáme, že je *uzavřená*, jestliže buď $(u_d, u_1) \in \varrho$ nebo $(u_1, u_d) \in \varrho$ příp. $(u_d, u_1) \in \varrho$. U uzavřených monotonně vázaných posloupností délky d klademe vždy $u_i = u_j$ pro $i \equiv j \pmod{d}$. Místo o posloupnosti hovoříme o *sledu*, jestliže platí $u_i \neq u_j$ pro $i \not\equiv j \pmod{d}$. Pak monotonně vázaný sled je drahou a monotonně vázaný uzavřený sled je cyklem příslušné délky (srv. [2]). Obdobně se nazývá graf $G(\sigma)$ *cyklem*, jestliže

$$G = \{u_1, u_2, \dots, u_d\}, \quad \sigma = \{(u_1, u_2), (u_2, u_3), \dots, (u_{d-1}, u_d), (u_d, u_1)\},$$

a graf $G(\sigma)$ *oboustranně nekonečnou drahou*, jestliže

$$G = \{\dots, u_{-2}, u_{-1}, u_0, u_1, u_2, \dots\}, \quad \sigma = \{\dots, (u_{-2}, u_{-1}), (u_{-1}, u_0), (u_0, u_1), (u_1, u_2), \dots\}.$$

Konečně zobrazení φ grafu $F(\varrho)$ na graf $G(\sigma)$, tj. zobrazení množiny F na G , se nazývá *homomorfismem*, jestliže platí

$$(x, y) \in \varrho \Leftrightarrow (\varphi[x], \varphi[y]) \in \sigma.$$

Rozklad $\bar{F}$ na F vytvořený homomorfismem φ se nazývá *vytvorujícím rozkladem*. Tyto pojmy a ostatní pojmy, jichž se bude v dalším užívat, jsou zavedeny v [1].

Binární relaci ϱ definovanou na množině $F \neq \emptyset$ a splňující podmínku

$$\{u_i\}_{i=1}^k \text{ je monotonně vázaná posloupnost v } F(\varrho) \Rightarrow (u_k, u_1) \in \varrho, \quad (\mathbf{Z}_k)$$

kde k je dané přirozené číslo, nazýváme *cyklickou relací stupně k* , stručně *$\mathbf{Z}_k$ -relací*.

Pak podmínka $(\mathbf{Z}_1)$ je ekvivalentní podmínce o reflexivnosti a podmínka $(\mathbf{Z}_2)$ podmínce o symetričnosti binární relace ϱ . Přepíšeme-li podmínku $(\mathbf{Z}_3)$ do tvaru

$$(x, y), (y, z) \in \varrho \Rightarrow (z, x) \in \varrho,$$

je zřejmá analogie této podmínky s podmínkou transitivnosti relace ϱ .

Ihned se vidí, že binární relace ϱ je cyklickou relací stupňů $k = 1, 2, 3$ právě tehdy, když je ekvivalencí, tj. když je reflexivní, symetrická a transitivní. Dále je zřejmé, že ekvivalence je cyklickou relací všech stupňů.

Graf $F(\varrho)$ nazýváme *cyklickým grafem stupně k* , jestliže jeho relace ϱ je $\mathbf{Z}_k$ -relací. Platí-li tedy $\varrho = F \times F$, je $F(\varrho)$ cyklickým grafem všech stupňů $k = 1, 2, 3, \dots$. Jiným triviálním příkladem cyklického grafu stupně k je graf, který neobsahuje žádnou monotonně vázanou posloupnost délky $d \geq k$. Takovýto graf neobsahuje ovšem žádnou monotonně vázanou a uzavřenou posloupnost a tedy ani žádný cyklus.

Stupeň k cyklického grafu $F(\varrho)$ nazvěme jeho *periodou*, jestliže existuje cyklus délky k v grafu $F(\varrho)$ a jestliže pro délku d každého cyklu v $F(\varrho)$ platí $d \geq k$. Tedy cyklus délky k je příkladem cyklického grafu o periodě k .

Cyklus $\{u_i\}_{i=1}^d$ grafu $F(\varrho)$ nazvěme *ryzí cyklem grafu $F(\varrho)$* , jestliže splňuje podmínku

$$(u_i, u_j) \in \varrho \Leftrightarrow i + 1 \equiv j \pmod{d}, \quad (1)$$

tj. jestliže tento cyklus je nasyceným subgrafem grafu $F(\varrho)$.

Cyklické relace a grafy

Lemma 1. *Nechť $\{u_i\}_{i=1}^d$ je uzavřená monotonně vázaná posloupnost v $\mathbf{Z}_k$ -grafu $F(\varrho)$ a nechť k celým číslem a, b lze najít celé číslo $r \geq 0$ takové, že platí*

$$a - b \equiv -(1 - k)^r \pmod{d}. \quad (2)$$

Pak platí $(u_a, u_b) \in \varrho$.

Důkaz. Pro $r = 0$ z (2) plyne $b \equiv a + 1 \pmod{d}$, tj. $u_b = u_{a+1}$. Avšak $(u_a, u_{a+1}) \in \varrho$, takže pro $r = 0$ je lemma správné. Budiž nyní $r > 0$ a předpokládejme, že lemma je správné pro $r - 1$. Z (2) pak plyne $u_b = u_{a+(1-k)^r}$, ale $a + (1-k)^r = a - (k-1)(1-k)^{r-1}$, takže položíme-li $c_i = a - (k-i)(1-k)^{r-1}$ pro $i = 1, 2, \dots, k$, platí $c_i - c_{i+1} = -(1-k)^{r-1}$ pro $1 \leq i < k$ a podle indukčního předpokladu musí být $(u_{c_i}, u_{c_{i+1}}) \in \varrho$. Tedy $\{u_{c_i}\}_{i=1}^k$ je monotonně vázaná posloupnost v $F(\varrho)$ délky k , takže z podmínky (Z_k) plyne $(u_{c_k}, u_{c_1}) \in \varrho$, avšak $c_k = a$, $c_1 = b$.

Věta 1. *Délka ryzího cyklu cyklického grafu je dělitelem jeho stupně.*

Důkaz. Necht $\{u_i\}_{i=1}^d$ je ryzí cyklus v Z_k -grafu $F(\varrho)$. Položíme-li $a = k$, $b = 1$ a $r = 1$, je splněna podmínka (2), takže podle lemmatu 1 platí $(u_a, u_b) \in \varrho$. Z (1) pak plyne $k \equiv 0 \pmod{d}$.

Lemma 2. *Jestliže cyklický graf stupně k obsahuje uzavřenou monotonně vázanou posloupnost délky $d < k$ a jestliže $d \nmid k$, pak také obsahuje uzavřenou monotonně vázanou posloupnost délky d_1 , při čemž $0 < d_1 < d$ a $d_1 \equiv k \pmod{d}$.*

Důkaz. Necht $\{u_i\}_{i=1}^d$ je předpokládaná uzavřená monotonně vázaná posloupnost v daném Z_k -grafu $F(\varrho)$. Pak $u_k \neq u_d$, neboť $k \not\equiv d \pmod{d}$, a tedy existuje d_1 , pro něž platí $d_1 \equiv k \pmod{d}$ a $1 \leq d_1 < d$. Potom ovšem $u_k = u_{d_1}$ a podle (Z_k) musí být $(u_{d_1}, u_1) \in \varrho$, takže $\{u_i\}_{i=1}^{d_1}$ je uzavřená monotonně vázaná posloupnost v $F(\varrho)$ délky d_1 .

Věta 2. *Homomorfní vzor i obraz cyklického grafu stupně k je zase cyklický graf stupně k .*

Důkaz plyne přímo z definice homomorfismu a z definice podmínky (Z_k) .

Důsledek 1. *Homomorfní vzor cyklu délky k je cyklickým grafem o periodě k .*

Důkaz. Jelikož cyklus délky k je cyklickým grafem stupně k , je podle věty 2 každý jeho homomorfní vzor rovněž cyklickým grafem stupně k . Podle [1], 2.10 však homomorfní vzor obsahuje subgraf, který je isomorfní s příslušným homomorfním obrazem, takže v našem případě homomorfní vzor cyklu obsahuje zase cyklus téže délky. Z definice homomorfismu konečně ihned plyne, že homomorfní vzor cyklu délky k neobsahuje žádný cyklus délky $d < k$ a tedy podle předešlého, že je cyklickým grafem o periodě k .

Lemma 3. *Nasycený subgraf cyklického grafu stupně k je zase cyklickým grafem stupně k .*

Důkaz. Necht $\{u_i\}_{i=1}^k$ je monotonně vázaná posloupnost v nasyceném subgrafu $G(\sigma)$ daného Z_k -grafu $F(\varrho)$, tj. $u_i \in G$ pro $1 \leq i \leq k$. Podle (Z_k) je $(u_k, u_1) \in \varrho$, ale také $(u_k, u_1) \in G \times G$ čili $(u_k, u_1) \in \sigma$ a proto σ je Z_k -relací.

Věta 3. *Souvislý cyklický graf stupně $k \geq 2$, který obsahuje alespoň jeden cyklus, je monotonně souvislý.*

Důkaz. Nechť $\{u_i\}_{i=1}^d$ je předpokládaný cyklus souvislého $\mathbf{Z}_k$ -grafu $F(\varrho)$ a nechť $x, y \in F$, $x \neq y$ jsou dva jeho uzly. Je-li $k = 2$, pak $F(\varrho)$ je **S**-graf (tj. ϱ je symetrická relace) a pro **S**-graf je podmínka souvislosti ekvivalentní podmínce monotonní souvislosti (viz [1], kap. 3). Nechť nyní $k \geq 3$ a uvažujme uzel $z \in F$, pro nějž platí $z \neq u_i$ pro každé $i = 1, 2, \dots, d$ (jestliže takový uzel neexistuje, je $F(\varrho)$ cyklem a ten zřejmě je monotonně souvislý). Dokážeme, že existuje monotonně vázaná posloupnost od z do u_i pro vhodné i . Předpokládejme opak, tj. že neexistuje monotonně vázaná posloupnost od z do u_l pro žádné l , $1 \leq l \leq d$. Ze souvislosti grafu $F(\varrho)$ plyne, že existuje vázaná posloupnost $\{v_i\}_{i=1}^h$ od z do u_l pro každé $1 \leq l \leq d$. Ke každé takovéto posloupnosti přiřadíme minimální index j_v , pro který platí, že $\{v_i\}_{i=j_v}^h$ je monotonně vázaná posloupnost (při tom ovšem $z = v_1$ a $u_l = v_h$) a nechť j značí minimum všech indexů j_v . Lze předpokládat, že právě pro posloupnost $\{v_i\}_{i=1}^h$ platí $j_v = j$, takže (v_{j-1}, v_j) non $\in \varrho$ a proto $(v_j, v_{j-1}) \in \varrho$. Vázanou posloupnost $\{v_i\}_{i=1}^h$ od z do u_l lze prodloužit o nd prvků (pro každé přirozené číslo n) tím, že po prvku $v_h = u_l$ bude následovat n po sobě jdoucích cyklů $\{u_i\}_{i=l+1}^{l+d}$, tj. konec prodloužené posloupnosti bude tvaru $\{\dots v_h = u_l, u_{l+1}, \dots, u_d, u_1, \dots, \dots, u_d, \dots, u_1, \dots, u_l = v_h\}$. Při tom index j_v přiřazený prodloužené posloupnosti je stejný jako u původní. Proto lze předpokládat, že platí $k \leq h - j + 1$. Pak $\{v_j, v_{j+1}, \dots, v_{j+k-1}\}$ je monotonně vázaná délky k , takže podle $(\mathbf{Z}_k)$ je $(v_{j+k-1}, v_j) \in \varrho$. Potom také $\{v_{j+2}, v_{j+3}, \dots, v_{j+k-1}, v_j, v_{j-1}\}$ je monotonně vázaná délky k a proto zase podle $(\mathbf{Z}_k)$ platí $(v_{j-1}, v_{j+2}) \in \varrho$. Odtud však plyne, že $\{v_1, v_2, \dots, v_{j-1}, v_{j+2}, v_{j+3}, \dots, v_h\}$ je vázaná posloupnost od z do u_l a jí přiřazený index $j_v \leq j - 1$, neboť $\{v_{j-1}, v_{j+2}, \dots, v_h\}$ je monotonně vázaná posloupnost. To je však spor s minimalitou indexu j . Tím je ukázáno, že existuje monotonně vázaná posloupnost od z do u_l pro jistý index $1 \leq l \leq d$, a odtud ihned plyne, že to platí pro každý u_l , $1 \leq l \leq d$. Obdobným způsobem se dokáže existence monotonně vázané posloupnosti od u_l do z pro každý u_l , $1 \leq l \leq d$.

Je-li konečně $x = u_i$, $y = u_j$, pak zřejmě x, y monotonně souvisí v $F(\varrho)$. Je-li na příklad $x \neq u_i$ pro každé i a $y = u_j$, pak pro $x = z$ předešlá konstrukce ukazuje, že zase x, y monotonně souvisí v $F(\varrho)$. Je-li nakonec $x \neq u_i \neq y$ pro každé i , stačí zvolit pevně uzel u_l a uvažovat monotonně vázané posloupnosti od x do u_l a od u_l do y , jejichž existence byla dokázána shora. Z nich se snadno vytvoří monotonně vázaná posloupnost od x do y . Tím je ukázáno, že každé dva uzly x, y v $F(\varrho)$ monotonně souvisí čili že $F(\varrho)$ je monotonně souvislý.

Důsledek 2. *Souvislý cyklický graf o periodě $k \geq 2$ je monotonně souvislý.*

Důkaz. Tvrzení plyne z věty 3 a z definice periody cyklického grafu.

Lemma 4. *Cyklus nejkratší délky libovolného grafu je vždy ryzím cyklem tohoto grafu.*

Důkaz plyne ihned z podmínky (1).

Cyklem délky k pro $k = 1$ příp. $k = 2$ se rozumí uzel se smyčkou příp. dva různé uzly $x \neq y$ spolu s hranami (x, y) , (y, x) . Snadno se udají příklady $\mathbf{Z}_k$ -grafů (dokonce souvislých) o periodě $k = 1, 2$, které nejsou homomorfními vzory cyklu délky k , tj. pro $k = 1, 2$ se důsledek 1 nedá obrátit. Platí však

Věta 4. *Graf $F(\varrho)$ je souvislým cyklickým grafem o periodě $k \geq 3$ právě tehdy, když je homomorfním vzorem cyklu délky k .*

Důkaz. Je-li $F(\varrho)$ homomorfním vzorem cyklu délky $k \geq 3$, pak podle věty 2 je cyklickým grafem stupně k a podle [1], 3.1 je souvislý. Avšak $F(\varrho)$ zřejmě obsahuje cyklus délky k a sporem se ihned odvodí, že každý jeho cyklus má délku $d \geq k$ čili $F(\varrho)$ má periodu k .

Nechť nyní naopak $F(\varrho)$ je souvislý cyklický graf o periodě $k \geq 3$. Pak existuje cyklus $\{u_i\}_{i=1}^k \cap F(\varrho)$ a označme $V_{i+1} = R(u_i)$ (tj. V_{i+1} značí množinu všech $x \in F$, pro něž platí $(u_i, x) \in \varrho$, viz [1], str. 136). Předpokládejme, že $\emptyset \neq A = F - \bigcup_{i=1}^k V_i$. Podle věty 3 je $F(\varrho)$ monotonně souvislý, takže k uzlům u_1 a $a \in A$ existuje monotonně vázaná posloupnost $\{u_1 = w_1, \dots, w_n = a\}$. Pak existuje index h , $1 \leq h < n$ takový, že $w_h \in \bigcup_{i=1}^k V_i$, ale $w_{h+1} \in A$. To předešlým znamená, že existuje index j , $1 \leq j \leq k$, pro nějž platí $w_h \in V_j$, a jelikož $k \geq 3$, existuje dále monotonně vázaná posloupnost $\{u_{j+2}, \dots, u_k, u_1, \dots, u_{j-1}, w_h, w_{h+1}\}$ délky k , která kromě uzlů w_h, w_{h+1} obsahuje alespoň jeden uzel u_i , takže podle $(\mathbf{Z}_k)$ je $(w_{h+1}, u_{j+2}) \in \varrho$. Nyní však rovněž $\{w_{h+1}, u_{j+2}, \dots, u_k, u_1, \dots, u_j\}$ je monotonně vázaná posloupnost délky k a proto $(u_j, w_{h+1}) \in \varrho$, což však znamená, že $w_{h+1} \in V_{j+1}$, a to je spor. Platí tedy $\bigcup_{i=1}^k V_i = F$.

Nechť nyní $v_j \in V_j$ a $v_{j+1} \in V_{j+1}$. Pak $\{u_{j+1}, \dots, u_k, u_1, \dots, u_{j-1}, v_j\}$ je monotonně vázaná posloupnost délky k , takže $(v_j, u_{j+1}) \in \varrho$ pro každý j , $1 \leq j \leq k$. Proto také $\{v_{j+1}, u_{j+2}, \dots, u_k, u_1, \dots, u_{j-1}, v_j\}$ je monotonně vázaná posloupnost délky k a tedy $(v_j, v_{j+1}) \in \varrho$ pro každý $v_j \in V_j$, každý $1 \leq j \leq k$.

Kdyby existovala hrana $(x, y) \in \varrho$ taková, že $x \in V_i$, $y \in V_j$, kde $j \neq i + 1$, pak by v případě $i < j$ $\{y, u_{j+1}, \dots, u_k, u_1, \dots, u_{i-1}, x\}$ byl cyklus délky $d < k$ a to je spor. Podobně se odvodí spor v případě $j < i$. Odtud a z předešlého plyne

$$(x, y) \in \varrho \Leftrightarrow x \in V_i, y \in V_{i+1} \text{ pro vhodné } i, 1 \leq i \leq k. \quad (3)$$

Kdyby konečně $V_i \cap V_j \neq \emptyset$ pro $i \neq j$, byl by pro $x \in V_i \cap V_j$ a $i < j$ $\{x, u_{j+1}, \dots, u_k, u_1, \dots, u_{i-1}\}$ cyklus délky $d < k$, což je spor, a podobně se odvodí spor v případě $j < i$. Platí tedy $V_i \cap V_j = \emptyset$ pro $i \neq j$.

Tím je ukázáno, že množiny V_i , $i = 1, 2, \dots, k$, tvoří rozklad na F . Tento rozklad $\bar{F}$ je podle (3) vytvářející a tedy faktorový graf $\bar{F}(\bar{\varrho})$ je cyklus délky k . To však podle [1], 2.2 znamená, že $F(\varrho)$ je homomorfním vzorem cyklu délky k .

Důsledek 3. *Souvislý cyklický graf o periodě $k \geq 3$ je jednoduchým grafem právě tehdy, když je cyklem délky k .*

Důkaz. Nechť nejdříve $F(\varrho)$ je jednoduchým, souvislým cyklickým grafem o periodě $k \geq 3$. Podle věty 4 musí být $F(\varrho)$ homomorfním vzorem cyklu délky k , čili tento cyklus délky k je homomorfním obrazem grafu $F(\varrho)$. Avšak podle [1], 2, 11 je každý homomorfní obraz jednoduchého grafu isomorfní s daným grafem, takže v našem případě $F(\varrho)$ je isomorfní s cyklem délky k , čili je sám cyklem délky k .

Nechť nyní naopak $F(\varrho) = \{u_i\}_{i=1}^k$ je cyklus délky $k \geq 3$. Pak především $F(\varrho)$ je souvislý cyklický graf o periodě k a nechť $u_i \neq u_j$, $1 \leq i < j \leq k$ jsou dva jeho uzly. Jestliže $u_{i+1} \neq u_j$, pak $(u_i, u_{i+1}) \in \varrho$, ale $(u_j, u_{i+1}) \notin \varrho$, a jestliže $u_{i+1} = u_j$, pak $u_{j+1} \neq u_i$ (neboť $k \geq 3$) a tedy $(u_j, u_{j+1}) \in \varrho$, ale $(u_i, u_{j+1}) \notin \varrho$, takže v každém případě existuje u_h , $1 \leq h \leq k$ takový, že platí právě jedno z následujících dvou tvrzení $(u_i, u_h) \in \varrho$, $(u_j, u_h) \in \varrho$. To však podle [1], 2.3 znamená, že $F(\varrho)$ je jednoduchým grafem.

Z věty 4 a z důsledku 3 plyne, že každý souvislý cyklický graf o periodě $k \geq 3$ je jednoznačně (až na isomorfismus) charakterisován systémem mohutností $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, tj. svojí *homomorfní charakteristikou* (viz [1], kap. 2).

Cykly a oboustranně nekonečné dráhy cyklických grafů

Věta 5. *Nechť $\{\alpha_i\}$ je homomorfní charakteristika souvislého cyklického grafu $F(\varrho)$ o periodě $k \geq 3$. Pak $F(\varrho)$ obsahuje cyklus délky d právě tehdy, když $d = nk$, kde n je přirozené číslo, a když $\alpha_i \geq n$ pro každý $i = 1, 2, \dots, k$.*

Důkaz. Nechť nejdříve $F(\varrho)$ obsahuje cyklus délky d . Z věty 4 ihned plyne, že cyklus délky k v $F(\varrho)$ musí být ryzím cyklem v $F(\varrho)$, takže podle věty 1 musí platit $d = nk$. Podle věty 4 existuje homomorfismus φ , který zobrazuje $F(\varrho)$ na jeho cyklus $\{v_i\}_{i=1}^k$. Příslušný vytvořující rozklad na $F(\varrho)$ označme $\bar{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_k\}$ a předpokládejme, že $v_i \in F_i$ pro $1 \leq i \leq k$. Je-li konečně $\{u_i\}_{i=1}^d$ předpokládaný cyklus, pak lze předpokládat, že $u_1 \in F_1$. Pak ihned plyne $\varphi(u_h) = \varphi(u_i) = v_j$ pro $h \equiv i \equiv j \pmod{k}$ a odtud $\text{kard } F_j \geq n$ pro $1 \leq j \leq k$.

Jestliže naopak homomorfní charakteristika $\{\alpha_i\}$ splňuje uvedené podmínky, pak pro příslušný vytvořující rozklad $\bar{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_k\}$ platí $\text{kard } F_i \geq n$ a proto z F_i lze vybrat uzly $u_{i,j}$ pro $j = 1, 2, \dots, n$ a $1 \leq i \leq k$. Z definice homomorfismu však ihned plyne, že $\{u_{1,1}, u_{2,1}, \dots, u_{k,1}, u_{1,2}, \dots, u_{k,n}\}$ je cyklus délky d .

Důsledek 4. *Nechť $\{\alpha_i\}$ je homomorfní charakteristika souvislého cyklického grafu o periodě $k \geq 3$ a nechť $d = nk$, kde n je přirozené číslo. Pak v daném*

grafu existuje právě $\prod_{i=1}^k \left[\binom{\alpha_i}{n} n! \right]$ různých cyklů délky d , když $\binom{\alpha_i}{n}$ značí mohutnost systému všech podmnožin mohutnosti n v množině o mohutnosti α_i .

Důkaz. Tvzení plyne z vět 5 a 4, když se využije rozložení uzlů uvažovaných cyklů v prvcích vytvářejícího rozkladu daného grafu určeného homomorfismem, který daný graf zobrazuje na cyklus délky k .

Důsledek 5. Necht $\{\alpha_i\}$ je homomorfní charakteristika souvislého cyklického grafu o periodě $k \geq 3$ a necht $d = nk$, kde n je přirozené číslo. Necht dále α je nejmenší z mohutností $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ a necht $\left[\frac{\alpha}{n} \right]$ značí Gaussovu funkci pro konečné α a pro nekonečné α necht značí α . Pak v daném grafu existuje $\left[\frac{\alpha}{n} \right]$ disjunktních cyklů délky d , ale neexistuje více disjunktních cyklů délky d .

Důkaz se vede stejným způsobem, jak je naznačeno v důkaze předešlého důsledku 4.

Snadno se nahlédne, že tvrzení důsledků 4 a 5 lze obrátit, tj. že uvedené podmínky jsou také nutné pro existenci příslušného počtu uvažovaných cyklů.

V konečných cyklických grafech se ukazuje těsná souvislost mezi pojmy cyklu a oboustranně nekonečné dráhy.

Věta 6. Necht $\{\alpha_i\}$ je homomorfní charakteristika souvislého cyklického grafu o periodě $k \geq 3$. Pak v daném grafu existuje oboustranně nekonečná dráha právě tehdy, když α_i je nekonečná mohutnost pro každé i .

Důkaz. Necht $F(\varrho)$ je daný souvislý cyklický graf o periodě $k \geq 3$, takže podle věty 4 existuje homomorfismus φ zobrazující $F(\varrho)$ na cyklus $\{v_i\}_{i=1}^k$. Podle důsledku 3 je cyklus délky k jednoduchým grafem a tedy pro vytvářející rozklad $\bar{F}$ grafu $F(\varrho)$ určený homomorfismem φ platí $\alpha_i = \text{kard } F_i$, když $\bar{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_k\}$.

Jsou-li nejdříve α_i nekonečné mohutnosti, označme $G_i \subset F_i$ spočetné podmnožiny a jejich prvky označme u_m , kde $m = i + nk$ pro každé celé číslo n . Potom zřejmě $\{\dots, u_{-2}, u_{-1}, u_0, u_1, u_2, \dots\}$ je oboustranně nekonečná dráha v $F(\varrho)$, neboť $u_i \neq u_j$ pro $i \neq j$, a z vlastností homomorfismu plyne $(u_i, u_{i+1}) \in \varrho$.

Necht konečně $\{\dots, u_{-2}, u_{-1}, u_0, u_1, u_2, \dots\}$ je oboustranně nekonečná dráha v $F(\varrho)$. Pak lze o uvažovaném homomorfismu předpokládat, že $\varphi(u_1) = v_1$. Z vlastností homomorfismu však ihned plyne, že $\varphi(u_m) = v_i$ platí právě tehdy, když $m \equiv i \pmod{k}$. Dále lze předpokládat, že $u_1 \in F_1$, a odtud ihned plyne $G_i \subset F_i$, kde $G_i = E\{\varphi(u_m) = v_i\}$. Avšak kard G_i jsou nekonečné mohutnosti a proto také kard F_i jsou nekonečné mohutnosti pro každé i .