

## Werk

**Titel:** Über Teilsysteme von ...({g}).

**Autor:** Buchholz, Wilfried

**Jahr:** 1977

**PURL:** [https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?379931524\\_0018|log14](https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?379931524_0018|log14)

## Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)  
SUB Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen

✉ [info@digizeitschriften.de](mailto:info@digizeitschriften.de)

ÜBER TEILSYSTEME VON  $\bar{\Theta}(\{g\})^*$

Von Wilfried Buchholz, München

In der vorliegenden Arbeit wollen wir zeigen, daß die Ordinalzahlbezeichnungssysteme  $W(X)$ ,  $Wd(\{1\})$  von Pfeiffer [4], [6] und  $O(I)$ ,  $Od(I)$  von Kino [3] in dem System  $\bar{\Theta}(\{g\})$  aus [1] enthalten sind. Wir werden dazu Teilsysteme von  $\bar{\Theta}(\{g\})$  konstruieren, die sich unmittelbar als isomorphe Bilder jener Systeme erkennen lassen. Im einzelnen werden die folgenden Beziehungen bewiesen:

Für  $\|X\| = \|I\| = 1 + \tau \leq A_0$  gilt:

- (1)  $\bar{\Theta}(\tau)$  ist Teilsystem von  $\bar{\Theta}(\{g\})$ ,
- (2)  $W(X) \cong \bar{\Theta}(\tau)$ ,
- (3)  $(O(I), <_0) \leq \bar{\Theta}_0(\tau)$  und  $(O(I), <_\infty) \leq \bar{\Theta}(\tau)$ ,
- (4)  $(Od(I), <_0) \leq \bar{\Theta}_0(v)$  und  $(Od(I), <_\infty) \leq \bar{\Theta}(v)$  mit  $v := \Theta \Omega_{\Omega_1} \tau$ ,
- (5)  $Wd(\{1\}) \cong \bar{\Theta}(\{g\})$ .

Dabei bezeichnen wir mit  $\| \cdot \|$  die Ordnungstypen von wohlgeordneten Mengen.  $\mathfrak{A} \leq \mathfrak{B}$  bedeute, daß es eine ordnungstreue Abbildung von  $\mathfrak{A}$  in  $\mathfrak{B}$  gibt. Ferner sei  $\bar{\Theta}_0(\tau) := \{x \in \bar{\Theta}(\tau) : Sx=0\}$ ,  $\bar{\Theta}_0(\{g\}) := \{x \in \bar{\Theta}(\{g\}) : Sx=0\}$  und  $A_0 := \|\bar{\Theta}_0(\{g\})\|$ . Die Bezeichnungssysteme  $\bar{\Theta}(\tau)$  wurden in [1], § 5 parallel mit  $\bar{\Theta}(\{g\})$  definiert; nach [1] (Lemmata 8b, 9a, 10c und Satz 11a) gilt für sie:

$$\|\bar{\Theta}(\tau)\| \leq \bar{\Theta}(\Omega_{1+\tau} + \Omega_{1+\tau})0 \text{ und } \|\bar{\Theta}_0(v)\| = \begin{cases} v, & \text{wenn } v = \Theta \Omega_{\Omega_1} \tau \\ \bar{\Theta}_{\Omega_{1+v}}0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

**Bemerkungen**

1. Aus (5) folgt, daß  $Wd(\{1\})$  wohlgeordnet ist, was bisher noch nicht gesichert war. (Die in [6] angegebene Skizze eines Wohlordnungsbeweises von  $Wd(\{1\})$  ist nicht schlüssig.)
2. Die Beziehungen (2), (3), (4) gelten für beliebige  $\tau < \Omega_1$ . Wir haben die Behauptungen auf  $\tau \leq A_0$  beschränkt, da wir hier nur in  $\bar{\Theta}(\{g\})$  arbeiten und somit die Beweise explizit nur für  $\tau \leq A_0$  durchführen werden.
3. Nach Pfeiffer [5] gilt  $(O(X), <_0) \cong W_0(X)$  und  $(O(X), <_\infty) \cong W(X)$ .

\* Eingegangen am 15.3.1976.

### § 1. Die Teilsysteme $\bar{\Theta}(\tau)$

Wir gehen von der in [1], § 5 gegebenen Definition des Bezeichnungssystems  $\bar{\Theta}(\{g\}) = (\mathfrak{I}, <)$  aus und verwenden die dort eingeführten Abkürzungen und Mitteilungszeichen. Nach [1] gelten die folgenden Lemmata 1—3.

#### Lemma 1

- a)  $Sa \leq a$ ,
- b)  $Sa < Sb \Rightarrow a < b$ .

#### Lemma 2

- a)  $K_{Sb}a \cup \{b\} < \bar{\Theta}ab$  (für  $\bar{\Theta}ab \in \mathfrak{I}$ ),
- b)  $\{a, b\} < gab$ .

#### Lemma 3

- a)  $v < Sc \Rightarrow K_v Sc \subset K_v c$ ,
- b)  $Sc \leq v \wedge a \in \mathfrak{H} \Rightarrow (K_v c < a \Leftrightarrow c < a)$ .

In üblicher Weise definieren wir die *Summe*  $a + b$  und die *natürliche Summe*  $a \# b$  von Ordinaltermen  $a, b$ . Für  $a \leq b$  sei  $-a + b$  der eindeutig bestimmte Term mit  $a + (-a + b) = b$ . Ist  $n \neq 0$  eine natürliche Zahl, so bezeichne  $n$  zugleich den Term  $\bar{\Theta}00 + \dots + \bar{\Theta}00$  ( $n$  mal).

#### Lemma 4

- a)  $K_u b \subset K_u(a + b) \subset K_u a \cup K_u b$ ,
- b)  $K_u(a \# b) = K_u a \cup K_u b$ .

#### Definition von $\Omega_a$ und $\Theta \Omega_{\Omega_1} b$ für $Sb = 0$

$$\Omega_a := \begin{cases} a & , \text{ wenn } a = 0 \text{ oder } a = g a_1 a_2 \text{ mit } a_1 \neq 0 \\ g0(a_0 + n), & \text{ wenn } a = a_0 + n + 1, \text{ wobei } a_0 = 0 \text{ oder } a_0 = g a_1 a_2 \text{ mit } a_1 \neq 0 \\ g0a & , \text{ sonst} \end{cases}$$

$$\Theta \Omega_{\Omega_1} b := \begin{cases} b & , \text{ wenn } b = \bar{\Theta} b_1 b_2 \text{ mit } \Omega_{\Omega_1} < b_1 \\ \bar{\Theta} \Omega_{\Omega_1}(b_0 + n), & \text{ wenn } b = b_0 + n + 1, \text{ wobei } b_0 = \bar{\Theta} b_1 b_2 \text{ mit } \Omega_{\Omega_1} < b_1 \\ \bar{\Theta} \Omega_{\Omega_1} b & , \text{ sonst} \end{cases}$$

$$\Theta \Omega_{\Omega_1} A_0 := A_0.$$

Diese formale Definition von  $\Omega_a$  und  $\Theta \Omega_{\Omega_1} b$  steht offenbar im Einklang mit der inhaltlichen Bedeutung der Funktionszeichen  $\Omega$  und  $\Theta$ .

#### Lemma 5

- a)  $a \mapsto \Omega_a$  ist ordnungstreue Abbildung von  $\mathfrak{I}$  auf  $\mathfrak{R}_0$ .
- b) Es gilt  $K_u^* \Omega_a = K_u^* a$  und  $K_u \Omega_a \subset K_u a \subset K_u \Omega_a \cup \{1\}$  für  $u < \Omega_a$ .

Im folgenden sei stets  $\tau \in \bar{\Theta}_0(\{g\}) \cup \{A_0\}$ , d.h.  $\tau$  bezeichnet eine Ordinalzahl  $\leq A_0$ .

**Induktive Definition der Termmenge  $\mathfrak{T}(\tau)$** 

1.  $0 \in \mathfrak{T}(\tau)$ ,
2.  $a, b \in \mathfrak{T}(\tau) \Rightarrow a \# b \in \mathfrak{T}(\tau)$ ,
3.  $a, b \in \mathfrak{T}(\tau) \wedge K_{Sb}^* a < a \Rightarrow \bar{\Theta} ab \in \mathfrak{T}(\tau)$ ,
4.  $a < \tau \Rightarrow \Omega_{1+a} \in \mathfrak{T}(\tau)$ .

**Induktive Definition der Koeffizientenmengen  $\tilde{K}_u a$** 

1.  $\tilde{K}_u a := \emptyset$ , wenn  $a=0$  oder  $u < a \in \mathfrak{R}$ ,
2.  $\tilde{K}_u a := \{a\}$ , wenn  $a \in \mathfrak{H}$  mit  $Sa \leq u$ ,
3.  $\tilde{K}_u \bar{\Theta} ab := \tilde{K}_u a \cup \tilde{K}_u b$ , wenn  $u < Sb$ ,
4.  $\tilde{K}_u (a \# b) := \tilde{K}_u a \cup \tilde{K}_u b$ .

**Folgerungen**

Für  $a \in \mathfrak{T}(\tau)$  gilt:

$$a < \Omega_{1+\tau}, \tilde{K}_u a \subset \mathfrak{T}(\tau), \tilde{K}_u a \subset K_u a, K_u a \setminus \tilde{K}_u a < \Omega_1, \quad a \neq \bar{\Theta} \Omega_{\Omega_1} b.$$

**Lemma 6**

$$\{c\} \cup K_0^* c < \Omega_{\bar{\Theta} ab} \wedge \tilde{K}_0 c < \bar{\Theta} ab \Rightarrow K_0 c < \bar{\Theta} ab$$

Beweis durch Induktion nach  $Gc$ .

Ist  $S_c = 0$ , so gilt  $K_0 c = \tilde{K}_0 c$ . Ist  $c \in \mathfrak{R}$ , so gilt nach L. 5 (Lemma 5)  $c = \Omega_d$  mit  $d < \bar{\Theta} ab$  und  $K_0 c \subset K_0 d$ , also  $K_0 c < \bar{\Theta} ab$ . Ist  $c \notin \mathfrak{R}$  und  $S_c > 0$ , so folgt die Behauptung mit I.V. (Induktionsvoraussetzung).

**Lemma 7**

Für  $e = \bar{\Theta} \Omega_{\Omega_1} y < \Omega_1$  gilt:

- a)  $c = \bar{\Theta} c_1 c_2 \wedge c_1 < \Omega_e \wedge \tilde{K}_0 c_1 \cup \{c_2\} < e \Rightarrow c < e$ ,
- b)  $c \in \mathfrak{T}(\tau) \wedge c < \bar{\Theta} \Omega_e 0 \Rightarrow c < e$ .

Beweis.

- a) Wegen  $\bar{\Theta} c_1 c_2 \in \mathfrak{T}$  und  $S_{c_2} = 0$  gilt  $K_0^* c_1 < c_1$ ; außerdem ist  $e = \bar{\Theta} ab$  mit  $\Omega_{\Omega_1} \leq a$ . Mit L. 6 folgt nun  $c_1 < a \wedge K_0 c_1 \cup \{c_2\} < \bar{\Theta} ab$ , d. h.  $c = \bar{\Theta} c_1 c_2 < \bar{\Theta} ab = e$ .
- b) Beweis durch Induktion nach  $Gc$ . Sei  $c = \bar{\Theta} c_1 c_2 < \bar{\Theta} \Omega_e 0$ . Dann ist nach L. 2a  $\tilde{K}_0 c_1 \cup \{c_2\} < \bar{\Theta} \Omega_e 0$  und nach I.V.  $\tilde{K}_0 c_1 \cup \{c_2\} < e$ . Für  $c_1 < \Omega_e$  folgt nun die Behauptung mit L. 7a. Andernfalls muß  $c \leq K_0 \Omega_e = \{e\}$  und wegen  $c \in \mathfrak{T}(\tau)$ ,  $e \notin \mathfrak{T}(\tau)$  sogar  $c < e$  sein.

**Satz 1**

Sind  $\bar{\Theta} a_1 b_1, \bar{\Theta} a_2 b_2 \in \mathfrak{T}(\tau)$  und ist  $a_1 < a_2$ , so gilt:

$$\tilde{K}_{Sb_1} a_1 \cup \{b_1\} < \bar{\Theta} a_2 b_2 \Leftrightarrow \bar{\Theta} a_1 b_1 < \bar{\Theta} a_2 b_2.$$

Beweis.

Sei  $\tilde{K}_{Sb_1} a_1 \cup \{b_1\} < \bar{\Theta} a_2 b_2$ . Dann ist  $Sb_1 \leq Sb_2$ . Für  $Sb_2 \neq 0$  gilt  $K_{Sb_1} a_1 < \bar{\Theta} a_2 b_2$  wegen  $K_{Sb_1} a_1 \setminus \tilde{K}_{Sb_1} a_1 < \Omega_1$ . Für  $Sb_1 = Sb_2 = 0$  gilt  $K_0^* a_1 < a_1 < a_2$  und  $\tilde{K}_0 a_1 < \bar{\Theta} a_2 b_2$ . Wegen  $\bar{\Theta} a_2 b_2 \in \mathfrak{T}(\tau)$  ist  $a_2 < \Omega_{\Omega_1}$ , woraus mit den Lemmata 1, 2, 3, 5

$a_2 < \Omega_{\bar{\Theta}a_2b_2}$  folgt. Mit L. 6 folgt nun  $K_0a_1 < \bar{\Theta}a_2b_2$ . — Da außerdem  $\tilde{K}_{Sb_1}a_1 \subset K_{Sb_1}a_1$  ist, erhalten wir:

$$\tilde{K}_{Sb_1}a_1 \cup \{b_1\} < \bar{\Theta}a_2b_2 \Leftrightarrow K_{Sb_1}a_1 \cup \{b_1\} < \bar{\Theta}a_2b_2 \Leftrightarrow \bar{\Theta}a_1b_1 < \bar{\Theta}a_2b_2.$$

### Bemerkung

Nach Satz 1 ist das System  $(\mathfrak{I}(\tau), <)$  identisch mit dem Bezeichnungssystem  $\bar{\Theta}(\tau)$  aus [1], § 5, wenn man die dort in der Definition vorkommende Menge  $X$  gleich  $\{\Omega_{1+x} : x < \tau\}$  wählt. (Die Mengen  $\tilde{K}_u a$  entsprechen den Koeffizientenmengen  $K_u a$  des Systems  $\bar{\Theta}(\tau)$  in [1], § 5.) Wir schreiben deshalb im folgenden  $\bar{\Theta}(\tau)$  statt  $\mathfrak{I}(\tau)$ .

### Satz 2

Für  $v = \Theta \Omega_{\alpha_1} \tau$  gilt  $\bar{\Theta}_0(v) \subset \{x \in \mathfrak{I} : x < v\}$ .

Beweis.

Für  $\tau = \Lambda_0$  ist die Behauptung trivial. Ansonsten erfolgt der Beweis durch Induktion nach  $Ga$ : Ist  $a = \bar{\Theta}a_1a_2 \in \bar{\Theta}_0(v)$ , so gilt  $a_1 < \Omega_{1+v} = \Omega_v$  und nach I.V.  $\tilde{K}_0a_1 \cup \{a_2\} < v$ ; daraus folgt mit L. 7a  $a < v$ .

## § 2. Die Terme $(a, b)$

In Verallgemeinerung von [2], § 2 werden im folgenden Funktionen  $h_u : \mathfrak{I} \rightarrow \mathfrak{I}$  eingeführt, für die gilt:

$$K_u^*(h_u a) < h_u a$$

$$K_w(h_u a) = K_w a, \text{ falls } w \leq u$$

$$v = u_{a_1, a_2}^+ \wedge \bar{\Theta}(h_v a_1)v < \bar{\Theta}(h_v a_2)v \Rightarrow h_u a_1 < h_u a_2.$$

Daraus folgt für  $(a, b) := \bar{\Theta}(h_{Sb} a)b$ :

$$K_{Sb} a \cup \{b\} < (a, b) \in \mathfrak{I}$$

$$K_u(a, b) = K_u a \cup K_u b, \text{ falls } u < Sb$$

$$u = Sb_1 = Sb_2 \wedge v = u_{a_1, a_2}^+ \wedge$$

$$(a_1, v) < (a_2, v) \wedge K_u a_1 \cup \{b_1\} < (a_2, b_2) \left. \vphantom{u = Sb_1 = Sb_2 \wedge v = u_{a_1, a_2}^+ \wedge} \right\} \Rightarrow (a_1, b_1) < (a_2, b_2).$$

### Definition der Termmengen $Ya$

1.  $Y0 := \{0\}$ ,
2.  $Y(a \# b) := Ya \cup Yb$ ,
3.  $Y\bar{\Theta}ab := \{y \in Ya : y < Sb\} \cup Yb$ ,
4.  $Ygab := \{gab\} \cup Ya \cup Yb$ .

### Lemma 1

$$a) 0 \in Ya \subset \mathfrak{R}_0 \wedge Sa = \max Ya,$$

$$b) v \in Ya \wedge w < v \Rightarrow Yv \subset Ya \wedge K_w v \subset K_w a,$$

$$c) YK_u a = \{y \in Ya : y \leq u\} \wedge Y\bar{\Theta}ab = Y(K_{Sb} a \cup \{b\}).$$

Beweise durch Induktion nach  $Ga$ .

[ $YK_u a$  ist Abkürzung für  $\cup\{Yx : x \in K_u a\}$ , analog  $Y(K_{Sb} a \cup \{b\})$ .]

**Definition von  $u_{a_1, a_2}^+$  und  $u_a^+$**

$$u_{a_1, a_2}^+ := \begin{cases} u & , \text{ wenn } \{y \in Ya_1 \cup Ya_2 : u < y\} = \emptyset \\ \min\{y \in Ya_1 \cup Ya_2 : u < y\}, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$u_a^+ := u_{a, a}^+.$$

**Folgerungen**

$$Sa \leq u \Leftrightarrow u = u_a^+,$$

$$u < Sa \Rightarrow u < u_a^+ \leq Sa \wedge u_a^+ \in Ya.$$

**Definition von  $v^+$** : Ist  $v = \Omega_a$ , so sei  $v^+ := \Omega_{a+1}$ .

**Lemma 2**

- $K_u^*(v^+) = K_u^*v$ ,
- $\bar{\Theta}v^+v \in \mathfrak{I}$ ,
- $\bar{\Theta}av \in \mathfrak{I} \wedge v^+ \leq a \Rightarrow \bar{\Theta}v^+v \leq \bar{\Theta}av$ .

Beweis.

- folgt aus § 1, L. 5b wegen  $K_u^*(a+1) = K_u^*a$ . b) folgt aus a) wegen  $K_v^*v = \emptyset$ .
- gilt wegen  $K_vv^+ \leq \{v, 1\} < \bar{\Theta}av$ .

Die folgenden Lemmata 3—7 werden vollkommen analog wie die Lemmata 1—4 und der Satz 1 aus [2] bewiesen. Man beachte jedoch, daß dort  $(a, b)$  für  $\bar{\Theta}ab$  geschrieben wird, während der Ausdruck  $(a, b)$  hier eine andere Bedeutung hat (siehe Seite 88 und Seite 91).

**Lemma 3**

Für  $u \leq v$  gilt  $K_u^*a = K_v^*a \cup K_u^*K_va$ ,  $K_uK_v^*a \subset K_u^*a$ ,  $K_u^*K_v^*a \subset K_u^*a$ .

**Lemma 4**

Sei  $Sa \leq u < v$  oder  $u < v = u_a^+ = Sa$ ; dann gilt:

- $K_u^*a < c \Rightarrow a < \bar{\Theta}cv$ , falls  $\bar{\Theta}cv \in \mathfrak{I}$ ,
- $K_u^*c < c \wedge a < \bar{\Theta}cv \Rightarrow K_u^*a < c$ ,
- $K_u^*a < c + v^+ \Rightarrow K_u^*a < c + a$ .

**Definition von  $q_v a$**

- $q_v 0 := 0$ .
- Ist  $a = a_1 + \dots + a_n$  mit  $n \geq 1$ ,  $a_1 \geq \dots \geq a_n$ ,  $\{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathfrak{S}$ , so sei
 
$$q_v a := \begin{cases} 0 & , \text{ wenn } a_1 < v^+ \\ a_1 + \dots + a_k, & \text{wenn } k \text{ größter Index mit } v^+ \leq a_k. \end{cases}$$

**Definition von  $k_u^* a$**

$$k_u^* a := \begin{cases} \max K_u^* a, & \text{wenn } K_u^* a \neq \emptyset \\ 0 & , \text{sonst.} \end{cases}$$

**Lemma 5**

- $K_u^*k_u^*a < k_u^*a$ ,
- $K_u^*a < a \Rightarrow K_u^*q_v a < q_v a$ .

**Lemma 6**

Sei  $u < v = u_a^+ = u_{a_1}^+ = u_{a_2}^+$ ; dann gilt:

- $\bar{\Theta} v^+ v \leq a < v^+ \Rightarrow v^+ \leq q_v k_u^* a \wedge \bar{\Theta}(q_v k_u^* a) v \leq a$ ,
- $\bar{\Theta} v^+ v \leq a_1 < a_2 < v^+ \Rightarrow q_v k_u^* a_1 \leq q_v k_u^* a_2$ .

**Definition von  $h_u^*$  für  $a$  mit  $u < u_a^+ = Sa$** 

Ist  $u < v = u_a^+ = Sa$ , so sei

$$h_u^* a := \begin{cases} a & , \text{ wenn } a < \bar{\Theta} v^+ v \\ q_v k_u^* a + (-\bar{\Theta}(q_v k_u^* a) v + a), & \text{ wenn } \bar{\Theta} v^+ v \leq a. \end{cases}$$

**Definition von  $\Delta_{u,v}$** 

$$\Delta_{u,v} := \{a \in \mathfrak{I} : u < v = u_a^+ = Sa\}.$$

**Lemma 7**

Für  $a, a_1, a_2 \in \Delta_{u,v}$  gilt:

- $K_u^* h_u^* a < h_u^* a$ ,
- $K_w h_u^* a = K_w a$  für  $w \leq u$ ,
- $a_1 < a_2 \Rightarrow h_u^* a_1 < h_u^* a_2$ .

**Definition von  $h(a)$** 

- $h(a) := a$ , wenn  $a \in \mathfrak{R}_0$  ist.
- Ist  $a \notin \mathfrak{R}_0$  und  $-Sa + a = a_1 \# \dots \# a_n$  mit  $\{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathfrak{S}$ , so sei  $h(a) := \varphi_{Sa}(a_1) \# \dots \# \varphi_{Sa}(a_n)$ , wobei

$$\varphi_v(a_k) := \begin{cases} \bar{\Theta} 0(v + a_k), & \text{ wenn } a_k < \bar{\Theta} 1 v \\ a_k & , \text{ wenn } \bar{\Theta} 1 v \leq a_k. \end{cases}$$

**Lemma 8**

- $Yh(a) = Ya$  und  $K_w h(a) = K_w a$ ,  $q_w h(a) = h(a)$  für  $w < Sa$ .
  - $v \leq a_1 < a_2 < \bar{\Theta} v^+ v \Rightarrow v \leq h(a_1) < h(a_2) < \bar{\Theta} v^+ v$ .
- Beweis klar.

**Definition von  $h_u a$** 

$$h_u a := \begin{cases} h_u^*(\bar{\Theta}(h_v a) v), & \text{ wenn } u < u_a^+ = v, \bar{\Theta} v^+ v \leq a \text{ und } \bar{\Theta}(h_v a) v \in \Delta_{u,v} \\ h(a) & , \text{ wenn } u < u_a^+ = v \leq a < \bar{\Theta} v^+ v \\ a & , \text{ sonst.} \end{cases}$$

Die Definition von  $h_u a$  erfolgt durch Induktion nach der Anzahl der  $y \in Ya$  mit  $y > u$ , kurz  $Y$ -Induktion genannt.

**Satz 1**

- $K_u^* h_u a < h_u a$ ,
- $K_w h_u a = K_w a$ , für  $w \leq u$ .

Beweis durch  $Y$ -Induktion.

- $Sa \leq u$ . Dann ist  $h_u a = a$ , und die Behauptungen sind trivial.

2.  $u < u_a^+ = v \leq a < \bar{\Theta}v^+v$ . Dann ist  $h_u a = h(a) < \bar{\Theta}v^+v$ . Wegen  $Yh(a) = Ya$  ist  $u_{h(a)}^+ = u_a^+ = v$ , somit  $h_u^* h(a) = h(a)$  und nach L. 7a  $K_u^* h(a) < h(a)$ . Behauptung b) folgt mit L. 8a.

3.  $u < u_a^+ = v$  und  $\bar{\Theta}v^+v \leq a$ . Nach I.V. a) ist  $a_1 := \bar{\Theta}(h_v a)v \in \mathfrak{I}$ . Nach L. 1 b,c und I.V. b) ist  $Ya_1 = Y(K_v h_v a \cup \{v\}) = Y(K_v a \cup \{v\}) \subset Ya$ , also  $a_1 \in \Delta_{u,v}$  und somit  $h_u a = h_u^* a_1$ . Mit L. 7a, b, L. 1 b und I.V. b) folgt  $K_u^* h_u a < h_u a$  und  $K_w h_u a = K_w a_1 = K_w h_v a \cup K_w v = K_w a$  für  $w \leq u$ .

**Definition**  $(a, b) := \bar{\Theta}(h_{Sb} a)b$ .

**Satz 2**

- a)  $(a, b) \in \mathfrak{I}$  und  $S(a, b) = Sb$ ,
- b)  $K_u(a, b) = K_u a \cup K_u b$  für  $u < Sb$ ,
- c)  $K_{Sb} a \cup \{b\} < (a, b)$ ,
- d)  $b_1 < b_2 \Rightarrow (a, b_1) < (a, b_2)$ ,
- e)  $Y(a, b) = \{y \in Ya : y < Sb\} \cup Yb$ ,
- f)  $a_1 < a_2 < v^+ \Rightarrow (a_1, v) < (a_2, v)$ .

Beweis mit Satz 1, L. 1 a,c und § 1 L. 2a, L. 3b.

**Lemma 9**

- a)  $K_u^*(u_a^+) = \emptyset$ ,
- b)  $u < v < u_a^+ \Rightarrow K_u^* a = K_v^* a$ .

Beweis.

a) Nach Definition ist  $K_u^* u = \emptyset$ . Sei also  $u < u_a^+ = g c_1 c_2$ . Dann gilt  $Yc_1 \cup Yc_2 \subset Yu_a^+ \subset Ya$ , also  $Sc_1, Sc_2 \leq u$  und somit  $K_u^*(u_a^+) = \emptyset$ .

b) Sei  $u < v < u_a^+$ . Für  $c \in K_v a$  gilt nach L. 1 a,c  $Sc \in Ya$  und  $Sc \leq v$ , also  $Sc \leq u$  und deshalb  $K_u^* c = \emptyset$ . Mit L. 3 folgt die Behauptung.

**Lemma 10**

- a)  $\min\{a, u^+\} \leq h_u a$ ,
- b)  $u < v = u_b^+ \leq u_a^+ \wedge \bar{\Theta}v^+v \leq a \Rightarrow \bar{\Theta}v^+v \leq (a, v) \in \Delta_{u,v}$  und  $v^+ \leq h_u a = h_u^*(a, v)$ .

Beweis.

a) folgt aus den Definitionen von  $h, h_u^*, h_u$ .

b) Ist  $Sa = v$ , so gilt  $\bar{\Theta}v^+v \leq K_v a < (a, v)$ . Für  $v < Sa$  gilt nach a) und L. 2c  $\bar{\Theta}v^+v \leq \bar{\Theta}(h_v a)v = (a, v)$ . — Wegen  $v = u_b^+ > u$  gilt  $v \in Yb$  und somit  $Yv \subset Yb$ . Mit Satz 2e folgt  $Y(a, v) \subset Ya \cup Yb$ , also  $(a, v) \in \Delta_{u,v}$ . — Aus  $\bar{\Theta}v^+v \leq (a, v) \in \Delta_{u,v}$  folgt mit L. 6a  $v^+ \leq h_u^*(a, v)$ . — Ist  $v = u_a^+$ , so gilt  $h_u a = h_u^*(a, v)$  wegen  $(a, v) \in \Delta_{u,v}$ . — Es sei nun  $v < u_a^+ = : z$  und  $a_1 := (a, z)$ . Dann ist auch  $v_a^+ = z$ . Ist  $a < \bar{\Theta}z^+z$ , so gilt  $h_u a = h(a) = h_v a$  und nach L. 8a  $q_v h_v a = h_v a$ . Für  $\bar{\Theta}z^+z \leq a$  folgt — wie soeben gezeigt —  $z = u_{a_1}^+ = v_{a_1}^+$  und  $h_u a = h_u^* a_1, h_v a = h_v^* a_1$ ; aus  $u < v < u_{a_1}^+$  folgt mit L. 9b  $k_u^* a_1 = k_v^* a_1$ , somit  $h_u^* a_1 = h_v^* a_1$ . Es gilt also in jedem Fall  $h_u a = h_v a = q_v h_v a$ ; nach Satz 1a ist daher  $K_u^* h_v a < h_v a$ . Da nach L. 9a außerdem  $K_u^* v = \emptyset$  ist, ergibt sich  $q_v k_u^*(a, v) = q_v h_v a = h_v a$ . Nach Definition von  $h_u^*$  gilt nun  $h_u^*(a, v) = h_v a + (-\bar{\Theta}(h_v a)v + (a, v)) = h_v a = h_u a$ .

**Satz 3**

$$v = u_{a_1, a_2}^+ \wedge (a_1, v) < (a_2, v) \Rightarrow h_u a_1 < h_u a_2.$$

Beweis.

Wir haben die folgenden Fälle zu unterscheiden:

1.  $Sa_1 \leq u \wedge Sa_2 \leq u$ . Es folgt  $v = u$  und mit Satz 2f  $h_u a_1 = a_1 < a_2 = h_u a_2$ .
2.  $Sa_i \leq u < Sa_k$ . In diesem Fall gilt  $h_u a_i = a_i$  und nach L. 10a  $u^+ \leq h_u a_k$ , also  $h_u a_i < h_u a_k$ . Außerdem ist  $u < v \leq Sa_k$  und nach L. 10a  $v \leq h_v a_k$ . Es folgt  $(a_i, v) = \bar{\Theta} a_i v < \bar{\Theta} v v \leq \bar{\Theta} (h_v a_k) v = (a_k, v)$ .
3.  $u < v \leq a_i < \bar{\Theta} v^+ v$  für  $i = 1, 2$ . Nach Satz 2f gilt dann  $u < v \leq a_1 < a_2 < \bar{\Theta} v^+ v$  und somit nach L. 8b  $h_u a_1 = h(a_1) < h(a_2) = h_u a_2$ .
4.  $u < v \leq a_i < \bar{\Theta} v^+ v$  und  $\bar{\Theta} v^+ v \leq a_k$ . Dann ist nach L. 8b  $h_u a_i = h(a_i) < \bar{\Theta} v^+ v$  und nach L. 10b  $v^+ \leq h_u a_k$ , also  $h_u a_i < h_u a_k$ . Außerdem folgt mit L. 10b  $(a_i, v) = \bar{\Theta} a_i v < \bar{\Theta} v^+ v \leq (a_k, v)$ .
5.  $u < v$  und  $\bar{\Theta} v^+ v \leq a_i$  für  $i = 1, 2$ . Nach L. 10b gilt in diesem Fall  $h_u a_i = h_u^*(a_i, v)$  für  $i = 1, 2$ , woraus mit L. 7c  $h_u a_1 < h_u a_2$  folgt.

**Satz 4**

$$\left. \begin{array}{l} u = Sb_1 = Sb_2 \wedge v = u_{a_1, a_2}^+ \wedge \\ (a_1, v) < (a_2, v) \wedge K_u a_1 \cup \{b_1\} < (a_2, b_2) \end{array} \right\} \Rightarrow (a_1, b_1) < (a_2, b_2)$$

Beweis.

Aus den Voraussetzungen folgt mit den Sätzen 1 und 3  $h_u a_1 < h_u a_2$  und  $K_u h_u a_1 \cup \{b_1\} < \bar{\Theta} (h_u a_2) b_2$ , also  $\bar{\Theta} (h_u a_1) b_1 < \bar{\Theta} (h_u a_2) b_2$ .

**Satz 5**

$$(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Rightarrow a_1 = a_2 \wedge b_1 = b_2.$$

Beweis.

Aus der Voraussetzung folgt  $b_1 = b_2$  und  $h_{Sb_1} a_1 = h_{Sb_2} a_2$ . Aus  $h_u a_1 = h_u a_2$  folgt mit Satz 3  $a_1 = a_2$  durch  $Y$ -Induktion.

Mit Hilfe der Klammerterme  $(a, b)$  lassen sich Relationen  $\ll_u$  definieren, die für gewisse beweistheoretische Untersuchungen benötigt werden (siehe Pohlers [7]). Wir wollen hier die wichtigsten Eigenschaften dieser Relationen zusammenstellen.

**Definition von  $a \ll_u b$** 

$$a \ll_u b := a < b \wedge \forall v \geq u (K_v a < (b, v)).$$

**Lemma 11**

$$a \ll_u b \Leftrightarrow a < b \wedge \forall v \in Ya (u \leq v \rightarrow K_v a < (b, v)).$$

Beweis.

Nach L. 1a,c gilt  $Sc \in \{y \in Ya : y \leq v\}$  für jedes  $c \in K_v a$ . Für  $v \notin Ya$  ist also stets  $K_v a < (b, v)$ .

**Lemma 12**

- a)  $u \leq v \wedge a_1 \ll_u a_2 \Rightarrow a_1 \ll_v a_2$ ,
- b)  $a_1 \ll_u a_2 \wedge u \leq Sb \Rightarrow (a_1, b) < (a_2, b)$ ,
- c)  $a_1 \ll_u a_2 \wedge a_2 \ll_u a_3 \Rightarrow a_1 \ll_u a_3$ .

Beweis.

a) ist trivial. b) folgt aus Satz 2c, d, f und Satz 4 durch  $Y$ -Induktion. c) folgt aus b).

**Lemma 13**

- a)  $b \ll_u a \# b$ , für  $a \neq 0$ ,
- b)  $b \ll_u (a, b)$ ,
- c)  $(a, u) < ((a, b), u)$ , für  $u \leq Sb$ .

Beweis.

a) und b) folgen mit § 1, L. 4b und Satz 2b, c. Beweis von c) durch  $Y$ -Induktion: Ist  $u = Sb$ , so gilt  $(a, u) \leq (a, b) < ((a, b), u)$ . — Sei nun  $u < Sb$  und  $v := u_{a, (a, b)}^+$ , also  $u < v \leq Sb$ . Nach I.V. gilt  $(a, v) < ((a, b), v)$ . Mit  $K_u a \cup \{u\} \subset K_u(a, b) \cup \{u\} < ((a, b), u)$  folgt daraus nach Satz 4  $(a, u) < ((a, b), u)$ .

**Lemma 14**

- a)  $b_1 \ll_u b_2 \Rightarrow a \# b_1 \ll_u a \# b_2 \wedge (a, b_1) \ll_u (a, b_2)$ ,
- b)  $a_1 \ll_u a_2 \wedge u \leq Sb \Rightarrow (a_1, b) \ll_u (a_2, b)$ .

Beweis.

a) Sei  $b_1 \ll_u b_2$ . Nach L. 12c, L. 13, Satz 2 gilt:  $a \ll_u a \# b_2$ ,  $b_1 \ll_u a \# b_2$ ,  $b_1 \ll_u (a, b_2)$  und  $K_v a < (a, v) < ((a, b_2), v)$  für  $v \leq Sb_2$ . Daraus folgt  $a \# b_1 \ll_u a \# b_2$  und  $K_v(a, b_1) < ((a, b_2), v)$  für  $u \leq v < Sb_1$ . Bleibt zu zeigen  $(a, b_1) < ((a, b_2), v)$  mit  $v := Sb_1$ : Ist  $Sb_2 = v$ , so gilt  $(a, b_1) < (a, b_2) < ((a, b_2), v)$ . Ist  $v < Sb_2$ , so gilt  $w := v_{a, (a, b_2)}^+ \leq Sb_2$ , also  $(a, w) < ((a, b_2), w)$ ; mit  $K_v a \cup \{b_1\} < ((a, b_2), v)$  folgt daraus nach Satz 4  $(a, b_1) < ((a, b_2), v)$ .

b) Sei  $a_1 \ll_u a_2$  und  $u \leq Sb$ . Nach L. 12b und Satz 2c gilt dann  $(a_1, b) < (a_2, b) < ((a_2, b), Sb)$ . Ist  $u \leq v < Sb$ , so gilt nach L. 13b, c  $K_v b < ((a_2, b), v)$  und  $K_v a_1 < (a_2, v) < ((a_2, b), v)$ , also  $K_v(a_1, b) < ((a_2, b), v)$ .

**Bemerkung**

Wie man leicht nachprüft, gilt:

$$(*) \quad a, b \in \bar{\Theta}(\tau) \wedge w \leq u \Rightarrow (a, b) \in \bar{\Theta}(\tau) \wedge \tilde{K}_w h_u a = \tilde{K}_w a.$$

Daraus folgt, daß in den Sätzen 2 und 4 und in der Definition von  $\ll_u$  jeweils  $K_u a$  durch  $\tilde{K}_u a$  ersetzt werden kann, falls man die Aussagen auf Elemente von  $\bar{\Theta}(\tau)$  einschränkt.

### § 3. Die Teilsysteme $W(\{g\})$ und $W(\tau)$

**Induktive Definition von  $W(\{g\})$**

- 1.  $0 \in W(\{g\})$ ,
- 2.  $a, b \in W(\{g\}) \Rightarrow a \# b, (a, b), gab \in W(\{g\})$ .

**Induktive Definition von  $\tilde{K}_u^* a$  für  $a \in W(\{g\})$**

- 1.  $\tilde{K}_u^* a := \emptyset$ , wenn  $a \in \mathfrak{S} \cup \{0\}$  mit  $Sa \leq u$ ,
- 2.  $\tilde{K}_u^*(a \# b) := \tilde{K}_u^* a \cup \tilde{K}_u^* b$ ,

3.  $\bar{K}_u^* gab := \bar{K}_u^* a \cup \bar{K}_u^* b$ , wenn  $u < gab$ ,
  4.  $\bar{K}_u^*(a, b) := \{a\} \cup \bar{K}_u^* a \cup \bar{K}_u^* b$ , wenn  $u < Sb$ .
- Nach § 2, Satz 5 ist diese Definition eindeutig.

**Lemma 1**

$c \in W(\{g\}) \wedge \bar{K}_u^* c < a \wedge u < v \Rightarrow K_v c < (a, v)$ .

Beweis durch Induktion nach der Definition von  $c \in W(\{g\})$ .

Sei  $c = (c_1, c_2)$  mit  $Sc = v$  (in den anderen Fällen ist der Beweisgang trivial).

Dann gilt  $\{c_1\} \cup \bar{K}_u^* c_1 \cup \bar{K}_u^* c_2 = \bar{K}_u^* c < a$ , somit nach I.V.  $c_1 \ll_v a$  und  $c_2 < (a, v)$ .

Daraus folgt mit L. 12b und Satz 4  $K_v c = \{(c_1, c_2)\} < (a, v)$ .

Aus Lemma 1 und § 2, Satz 2f, Satz 4, Lemma 12b folgt nun

**Lemma 2**

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \in W(\{g\}) \wedge \bar{K}_{Sb_1}^* a_1 < a_1 < a_2 \wedge \\ K_{Sb_1} a_1 \cup \{b_1\} < (a_2, b_2) \end{array} \right\} \Rightarrow (a_1, b_1) < (a_2, b_2).$$

**Satz 1**

Die Systeme  $\bar{\Theta}(\{g\})$  und  $W(\{g\})$  sind isomorph.

Beweis.

Da  $W(\{g\})$  ein Teilsystem von  $\bar{\Theta}(\{g\})$  ist, muß nur noch gezeigt werden, daß

$\bar{\Theta}(\{g\})$  zu einem Teilsystem von  $W(\{g\})$  isomorph ist. Dazu definieren wir induktiv eine Menge  $\mathfrak{I}' \subset W(\{g\})$  wie folgt: 1.  $0 \in \mathfrak{I}'$ , 2.  $a, b \in \mathfrak{I}' \Rightarrow a \# b, gab \in \mathfrak{I}'$ ,

3.  $a, b \in \mathfrak{I}' \wedge \bar{K}_{Sb_1}^* a < a \Rightarrow (a, b) \in \mathfrak{I}'$ . Für  $(a_1, b_1) \in \mathfrak{I}'$  gilt dann nach Lemma 2:

$$a_1 < a_2 \wedge K_{Sb_1} a_1 \cup \{b_1\} < (a_2, b_2) \Rightarrow (a_1, b_1) < (a_2, b_2).$$

Daraus und aus § 2, Satz 2a—d folgt, daß  $\bar{\Theta}(\{g\})$  isomorph zu  $\mathfrak{I}'$  ist.

**Induktive Definition von  $W(\tau)$** 

1.  $0 \in W(\tau)$ ,
2.  $a, b \in W(\tau) \Rightarrow a \# b, (a, b) \in W(\tau)$ ,
3.  $a < \tau \Rightarrow \Omega_{1+a} \in W(\tau)$ .

Offenbar ist  $W(\tau) \subset \bar{\Theta}(\tau)$  [vgl. (\*) auf Seite ..], und analog wie Satz 1 beweist man

**Satz 2**

Die Systeme  $\bar{\Theta}(\tau)$  und  $W(\tau)$  sind isomorph.

Nach § 2, Satz 2c, f und L. 12b gilt:

$$(a_1, v) < (a_2, v) \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 < a_2, & \text{wenn } Sa_1 \leq v \wedge Sa_2 \leq v \\ a_1 < (a_2, v), & \text{wenn } Sa_1 \leq v < Sa_2 \\ (a_1, v) \leq a_2, & \text{wenn } Sa_2 \leq v < Sa_1, \end{cases}$$

d. h.  $(a_1, v) < (a_2, v) \Leftrightarrow a_1^v < a_2^v \vee a_1^v = (a_1, v) = a_2$ , wobei  $a^v := a$ , wenn  $Sa \leq v$ , und  $a^v := (a, v)$ , wenn  $v < Sa$ . Zusammen mit den Sätzen 2, 4, 5 aus § 2 und der Bemerkung auf Seite 93 folgt daraus, daß  $W(\tau)$  isomorph zu dem System  $W(X)$

(mit  $\|X\| = 1 + \tau$ ) von Pfeiffer [4] ist. Ebenso ist  $W(\{g\})$  isomorph zu dem in Pfeiffer [6] skizzierten System  $Wd(\{1\})$ . Wir haben also die folgenden Ergebnisse:

$$W(\tau) \subset \bar{\Theta}(\tau) \text{ und } \bar{\Theta}(\tau) \cong W(\tau) \cong W(X) \text{ f\"ur } \|X\| = 1 + \tau,$$

$$W(\{g\}) \subset \bar{\Theta}(\{g\}) \text{ und } \bar{\Theta}(\{g\}) \cong W(\{g\}) \cong Wd(\{1\}).$$

#### § 4. Die Teilsysteme $Od(\tau)$ und $O(\tau)$

Es sei  $v := \Theta \Omega_{\Omega_1} \tau$  und  $I := \{0\} \cup \{\Omega_{\Theta \Omega_{\Omega_1} y} : y < \tau\}$ .

**Definition von  $\bar{a}$  und  $[a, b]$**

$$\bar{a} := \begin{cases} a & , \text{ wenn } a \in I \\ \Omega_{[0, a]} & , \text{ sonst} \end{cases}$$

$$[a, b] := \begin{cases} (0, (0, \bar{a})) & , \text{ wenn } b = 0 \\ (0, (b_1, \bar{a}) \# \dots \# (b_n, \bar{a})) & , \text{ wenn } b = b_1 \# \dots \# b_n \text{ mit } \{b_1, \dots, b_n\} \subset \mathfrak{S} \end{cases}$$

**Folgerungen**

$$\bar{a} \in \mathfrak{R}, [a, b] \in \mathfrak{S}, S[a, b] = \bar{a}$$

$$\bar{a}_1 = \bar{a}_2 \Rightarrow a_1 = a_2$$

$$[a_1, b_1] = [a_2, b_2] \Rightarrow a_1 = a_2 \wedge b_1 = b_2.$$

**Induktive Definition von  $Od(\tau)$**

1.  $a \in I \Rightarrow a \in Od(\tau)$ ,
2.  $a, b \in Od(\tau) \Rightarrow a \# b, [a, b] \in Od(\tau)$ .

**Lemma 1**

$$Od(\tau) \subset W(v) \subset \bar{\Theta}(v).$$

Beweis.

$W(v) \subset \bar{\Theta}(v)$  gilt nach (\*) (Seite 93). Nach Definition ist  $I \subset W(v)$  und  $W(v)$  abgeschlossen gegenüber  $\#$ . Aus  $a \in W(v)$  folgt  $[0, a] \in W_0(v) \subset \bar{\Theta}_0(v)$  und mit § 1, Satz 2  $[0, a] < v$ , d. h.  $\Omega_{[0, a]} \in W(v)$ . Aus  $a, b \in W(v)$  folgt also  $\bar{a}, b \in W(v)$  und somit  $[a, b] \in W(v)$ .

*Im folgenden sollen die Buchstaben  $a, b, c, d, x, y, z$  stets Elemente von  $Od(\tau)$  bezeichnen.*

**Definition**

$$a <_{\infty} b := a < b, a <_x b := [x, a] < [x, b].$$

**Lemma 2**

$$a <_0 b \Leftrightarrow \bar{a} < \bar{b}.$$

Beweis.

Die Behauptung ist trivial für  $a, b \notin I$ . Sind  $a, b \in I$ , so gilt  $a <_0 b \Leftrightarrow (0, (a, 0)) < (0, (b, 0)) \Leftrightarrow a < b \Leftrightarrow \bar{a} < \bar{b}$ . — Sei nun  $a \notin I$  und  $b = \Omega_e \in I$ ; dann gilt:  $[0, a] = (0, c)$

mit  $0 \neq c \in \bar{\Theta}(v)$ ,  $[0, b] = (0, (b, 0)) = (0, \bar{\Theta}\Omega_e 0)$ ,  $\bar{a} = \Omega_{[0, a]}$ ,  $\bar{b} = b$ , also  $a <_0 b \Leftrightarrow c < \bar{\Theta}\Omega_e 0$  und  $\bar{a} < \bar{b} \Leftrightarrow (0, c) < e \Leftrightarrow c < e$ . Daraus folgt mit § 1, L. 7b  $a <_0 b \Leftrightarrow \bar{a} < \bar{b}$ .— Der Fall  $a \in I$ ,  $b \notin I$  kann auf den Fall  $a \notin I$ ,  $b \in I$  zurückgeführt werden.

**Definition von  $P_x a$**

1.  $P_x a := \emptyset$ , wenn  $a \in I$ ,
2.  $P_x(a \# b) := P_x a \cup P_x b$ ,
3.  $P_x[a, b] := \begin{cases} P_x b, & \text{wenn } x <_0 a \\ \{b\}, & \text{wenn } x = a \\ \emptyset, & \text{wenn } a <_0 x. \end{cases}$

**Definition von  $I(a)$  und  $x_{c,d}^\oplus$**

$$I(a) := \{x \in Od(\tau) : P_x a \neq \emptyset\},$$

$$x_{c,d}^\oplus := \begin{cases} \infty & , \text{ wenn } \{y \in I(c) \cup I(d) : x <_0 y\} = \emptyset \\ <_0 - \min\{y \in I(c) \cup I(d) : x <_0 y\}, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Wir setzen  $x <_0 \infty$  für jedes  $x \in Od(\tau)$ .

**Lemma 3**

$$d \in \mathfrak{H} \Rightarrow (P_x c <_x d \Leftrightarrow \tilde{K}_{\bar{x}} c < (d, \bar{x})).$$

Beweis durch Induktion nach der Gestalt von  $c$ .

1. Ist  $c \in I$ , so gilt  $P_x c = \emptyset$  und  $\tilde{K}_{\bar{x}} c < (d, \bar{x})$ .
2. Ist  $c = a \# b$ , so folgt die Behauptung mit I.V.
3. Sei  $c = [a, b]$ :
  - 3.1. Für  $x <_0 a$  ist nach L. 2  $\bar{x} < \bar{a}$  und damit  $\tilde{K}_{\bar{x}} c = \tilde{K}_{\bar{x}} b$  (vgl. die Bemerkung auf Seite 93). Außerdem ist  $P_x c = P_x b$ . Beh. folgt mit I.V.
  - 3.2. Für  $x = a$  ist  $P_x c = \{b\}$  und  $\tilde{K}_{\bar{x}} c = \{[x, b]\}$ . Wegen  $d \in \mathfrak{H}$  gilt aber:  $b <_x d \Leftrightarrow [x, b] < (d, \bar{x})$ .
  - 3.3. Für  $a <_0 x$  ist  $P_x c = \emptyset$  und nach L. 2  $\tilde{K}_{\bar{x}} c = \{c\} < \bar{x} < (d, \bar{x})$ .

**Folgerung**

Wegen  $\tilde{K}_{\bar{x}} d < (d, \bar{x})$  folgt aus Lemma 3  $P_x d <_x d$ .

**Lemma 4**

- a)  $P_x c \neq \emptyset \Rightarrow \bar{x} \in Yc$ ,
- b)  $Yc \subset \{\bar{y} : y \in Od(\tau)\}$ ,
- c)  $c, d \in \mathfrak{H} \wedge c <_{x_{c,d}^\oplus} d \wedge P_x c <_x d \Rightarrow c <_x d$ .

Beweis von a) und b) durch Induktion nach der Gestalt von  $c$ :

1. Für  $c \in I$  ist  $P_x c = \emptyset$  und  $Yc = \{0, c\} \subset \{\bar{y} : y \in Od(\tau)\}$ .
2. Für  $c = [a, b]$  ist  $Yc = \{v \in Yb : v < \bar{a}\} \cup \{\bar{a}\}$ , nach I.V. folglich  $Yc \subset \{\bar{y} : y \in Od(\tau)\}$ . Ist  $P_x c \neq \emptyset$ , so gilt  $\bar{x} = \bar{a}$  oder  $\bar{x} < \bar{a}$  oder  $\bar{x} < \bar{a} \wedge P_x b \neq \emptyset$ ; mit I.V. folgt  $\bar{x} \in Yc$ .
3. Für  $c = a \# b$  folgen die Behauptungen unmittelbar aus der I.V..

Beweis von c) durch Induktion nach der Anzahl  $n$  der  $y$  mit  $\bar{x} < \bar{y} \in Yc \cup Yd$ .

1.  $n=0$ . Nach a), b) und L. 2 ist dann  $\max\{Sc, Sd\} \leq \bar{x}$  und  $x_{c,d}^\oplus = \infty$ . Aus  $c < d < \bar{x}^+$  folgt mit § 2, Satz 2f  $(c, \bar{x}) < (d, \bar{x})$ , d.h.  $c <_x d$ .

2.  $n \neq 0$ . Nach a), b) und L. 2 gibt es ein  $z$  mit  $\bar{z} = \bar{x}_{c,d}^+$  und  $x <_0 z \leq_0 x_{c,d}^\oplus$ . Ist  $z <_0 x_{c,d}^\oplus$ , so gilt  $P_z c = \emptyset$  und  $z_{c,d}^\oplus = x_{c,d}^\oplus$ , woraus mit I.V.  $c <_z d$  folgt. In jedem Fall gilt also  $(c, \bar{z}) < (d, \bar{z})$ . Aus  $P_x c <_x d$  folgt mit L. 3 außerdem  $\bar{K}_x c < (d, \bar{x})$ . Mit § 2, Satz 4 und der Bemerkung auf S. 93 folgt daraus  $(c, \bar{x}) < (d, \bar{x})$ , d. h.  $c <_x d$ . Wir erhalten nun den folgenden

**Satz**

1.  $d \neq 0 \Rightarrow 0 <_x d$ .
2. Für  $c, d \in I$  gilt:  $c <_x d \Leftrightarrow c <_\infty d \Leftrightarrow c < d$ .
3. Für  $c, d \in \mathfrak{S}$  gilt  $c <_x d$  in genau folgenden zwei Fällen:
  - 3.1.  $c \leq_x P_x d$ ,
  - 3.2.  $c <_{x_{c,d}^\oplus} d \wedge P_x c <_x d$ .
4. Für  $c = [a_1, b_1]$ ,  $d = [a_2, b_2]$  gilt  $c <_\infty d$  in genau folgenden zwei Fällen:
  - 4.1.  $a_1 <_0 a_2$ ,
  - 4.2.  $a_1 = a_2 \wedge b_1 <_{a_1} b_2$ .
5. Für  $c = [a, b]$ ,  $d \in I$  gilt:  $c <_\infty d \Leftrightarrow a <_0 d$ .
6. Für  $c = c_1 \# \dots \# c_m$  ( $m \geq 1$ ) und  $d = d_1 \# \dots \# d_n$  ( $n \geq 1$ ) mit  $\{c_1, \dots, c_m\} \subset \mathfrak{S}$ ,  $\{d_1, \dots, d_n\} \subset \mathfrak{S}$ ,  $m+n > 2$  gilt  $c <_x d$  in genau folgenden zwei Fällen:
  - 6.1. Es gibt  $j \in \{1, \dots, n\}$  mit  $c_i <_x d_j$  für alle  $i = 1, \dots, m$ .
  - 6.2. Es ist  $n > 1$  und es gibt  $i \in \{1, \dots, m\}$ ,  $j \in \{1, \dots, n\}$  mit  $c_i = d_j$  und  $c' <_x d'$ , wobei  $c'$ ,  $d'$  durch Streichung von  $c_i$ ,  $d_j$  aus  $c$ ,  $d$  hervorgehen. (Im Fall  $m=1$  sei  $c' = 0$ .)

Aus diesem Satz folgt, daß  $Od(\tau)$  (mit den Relationen  $<_x$ ,  $<_\infty$ ) isomorph zu dem System  $Od(I)$  von Kino [3] ist. Andererseits ist  $Od(\tau) \subset W(v) \subset \bar{\Theta}(v)$  und  $a \mapsto [0, a]$  eine ordnungstreue Abbildung von  $(Od(\tau), <_0)$  in  $\bar{\Theta}_0(v)$ . Folglich gilt:

$$(Od(I), <_0) \leq \bar{\Theta}_0(v) \quad \text{und} \quad (Od(I), <_\infty) \leq \bar{\Theta}(v).$$

**Induktive Definition von  $O(\tau)$** 

Sei  $I := \{0\} \cup \{\Omega_{1+y} : y < \tau\}$ .

1.  $a \in I \Rightarrow a \in O(\tau)$ ,
2.  $a, b \in O(\tau) \Rightarrow a \# b \in O(\tau)$ ,
3.  $a \in I \wedge b \in O(\tau) \Rightarrow [a, b] \in O(\tau)$ .

Analog wie für  $Od(\tau)$  beweist man:  $O(\tau)$  [mit den Relationen  $<_x$  ( $x \in I$ ),  $<_\infty$ ] ist isomorph zu dem System  $O(I)$  von Kino [3], und es gilt:

$$(O(I), <_0) \leq \bar{\Theta}_0(\tau) \quad \text{und} \quad (O(I), <_\infty) \leq \bar{\Theta}(\tau).$$

**LITERATUR**

- [1] Buchholz, W.: Normalfunktionen und konstruktive Systeme von Ordinalzahlen. Proof theory symposium Kiel 1974. Springer Lecture Notes in Math. 500 (1975).

- [2] Buchholz, W., Schütte, K.: Die Beziehungen zwischen den Ordinalzahlssystemen  $\Sigma$  und  $\bar{\Theta}(\omega)$ . *Archiv f. Math. Logik u. Grundl.* **17**, 179—190 (1976).
- [3] Kino, A.: On ordinal diagrams. *J. Math. Soc. Jap.* **13**, 346—356 (1961).
- [4] Pfeiffer, H.: Ein Bezeichnungssystem für Ordinalzahlen. *Archiv f. Math. Logik u. Grundl.* **13**, 74—90 (1970).
- [5] Pfeiffer, H.: Vergleich zweier Bezeichnungssysteme für Ordinalzahlen. *Archiv f. Math. Logik u. Grundl.* **15**, 41—56 (1972).
- [6] Pfeiffer, H.: Bezeichnungssysteme für Ordinalzahlen. *Communications of the Math. Inst. Rijksuniversiteit Utrecht* 1973—1.
- [7] Pohlers, W.: Ordinals connected with formal theories for transfinitely iterated inductive definitions. Erscheint in . . . . .
- [8] Schütte, K.: *Proof theory*. Erscheint im Springer Verlag.