

## Werk

**Label:** Figure

**Jahr:** 1929

**PURL:** [https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?251726223\\_0014|log25](https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?251726223_0014|log25)

## Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)  
SUB Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen

✉ [info@digizeitschriften.de](mailto:info@digizeitschriften.de)

**Tafel XIV. Zur Morphologie des Tertiärbeckens von Calatayud-Teruel.**

**Abb. 69. Erosionsformen bei Teruel.**

Im Vereinigungsbereich zweier Täler löst sich die zwischenliegende Scheidewand in einzelne steile Pfeiler auf. Dieselben bestehen nicht etwa aus festem Gestein, sondern aus ziemlich lockerem Schutt. Im Hintergrund links die Stadt Teruel.

**Abb. 70. Typische Landschaftsentwicklung im Tertiär am Westrand des Beckens von Calatayud.**

In der Nähe des Randes des Tertiärbeckens gehen die Ablagerungen in eine sandig-mergelige Fazies über. Das Bild zeigt die typische Landschaftsform dieser Randgebiete. Ein weit verzweigtes Talsystem ist entwickelt. Während das Haupttal breit und flach ist, werden die Seitentäler um so enger und steiler, je näher man ihrem Anfang kommt. Schließlich gehen sie über in ein System enger Runsen und Wasserrisse.