Werk

Titel: Über einen algebraischen Satz, welcher in der Theorie der geometrischen Objekte a...

Autor: GOLAB, S.

Jahr: 1974

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?301416052_0002|log6

Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

Über einen algebraischen Satz, welcher in der Theorie der geometrischen Objekte auftritt

STANISŁAW GOŁĄB

Herrn Prof. Dr. O.-H. Keller zum 65. Geburtstag gewidmet

In der Theorie der geometrischen Objekte begegnete ich einer Untergruppe der allgemeinen linearen Gruppe $GL(n, R)$, deren nähere Bestimmung zu einem unerwarteten Resultat geführt hat. Dieses Resultat bildet eben den Gegenstand der vorliegenden Note.

Bezeichnungen. Mit L_s^n bezeichnen wir die Gruppe, deren Elemente Folgen von Zahlen

$$\alpha = \{A_k^i, A_{kl}^i, \dots, A_{k_1 k_2 \dots k_s}^i\} \quad (1)$$

sind, wo die Indizes

$$i, k, l, k_1, \dots, k_s = 1, \dots, n$$

durchlaufen,

$$J = \text{Det}(A_k^i) \neq 0 \quad (2)$$

und

$$A_{k_1 k_2 \dots k_s}^i$$

in allen unteren Indizes $k_1, \dots, k_s$ vollkommen symmetrisch sind. Es kann also im folgenden

$$k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_r, \quad r = 2, \dots, s, \quad (3)$$

vorausgesetzt werden.

Alle Zahlen $A_{k_1 k_2 \dots k_r}^i$ ($r = 1, \dots, s$) gehören zu $\mathbf{R}$, d. h. zu dem Körper aller reellen Zahlen, und können ganz beliebig sein.

Eine binäre interne Operation in L_s^n wird folgendermaßen erklärt.

Es sei

$$\beta = \{B_k^i, B_{kl}^i, \dots\} \quad (4)$$

ein zweites Element aus L_s^n . Mit

$$\gamma = \{C_k^i, C_{kl}^i, \dots\} \quad (5)$$

definieren wir die Zusammensetzung

$$\gamma = \beta \circ \alpha \quad (6)$$

der Elemente α, β mit Hilfe der folgenden Formeln:

$$\begin{cases} C_k^i = A_j^i \cdot B_k^j, & 1) \\ C_{kl}^i = A_{pq}^i \cdot B_k^p \cdot B_l^q + A_p^i \cdot B_{kl}^p, \text{ usw.} \end{cases} \quad (7)$$

Die so definierte Operation $\circ$ macht aus L_s^n eine Gruppe, wo

$$\varepsilon = \{\delta_k^i, 0, \dots, 0\} \quad (8)$$

das neutrale Element ist und entsprechend die Parameter des zu α inversen Elementes α^{-1} wie folgt erklärt werden:

$$\alpha^{-1} = \{\bar{A}_k^i, \dots\}, \quad (9)$$

wo $\bar{A}_k^i$ die zu A_k^i inverse Matrix bedeutet (sie existiert immer auf Grund der Voraussetzung (2)). Die weiteren Parameter wollen wir nicht explizit aufschreiben.

Eine Untergruppe von L_2^n

Betrachten wir das folgende System von Relationen:

$$A_{kl}^i = A_k^i \cdot \bar{A}_m^j \cdot A_{ij}^m, \quad i, k, l = 1, \dots, n. \quad (10)$$

Die Relationen (10) scheiden von der Menge L_2^n eine Untermenge $\tilde{L}_2^n$ aus.

Wir beweisen den folgenden

Hilfssatz. Die Untermenge $\tilde{L}_2^n$ bildet eine Untergruppe der Gruppe $\tilde{L}_2^n$.

Beweis. Nehmen wir zwei Elemente $\alpha = \{A_k^i, A_{kl}^i\}$, $\beta = \{B_k^i, B_{kl}^i\}$ aus L_2^n . Wir setzen also neben (10) auch

$$B_{kl}^i = B_k^i \cdot \bar{B}_m^j \cdot B_{ij}^m \quad (11)$$

voraus und bilden

$$C_k^i = A_j^i \cdot B_k^j, \quad C_{kl}^i = A_{pq}^i \cdot B_k^p \cdot B_l^q + A_p^i \cdot B_{kl}^p. \quad (12)$$

1) Wir verwenden die Einsteinsche Konvention über das Weglassen des Summationszeichens.

Es handelt sich darum, aus (10), (11), (12) die Relationen

$$C_{kl}^i = C_k^i \cdot \bar{C}_m^j \cdot C_{ij}^m \quad (13)$$

abzuleiten. Zu diesem Zwecke beachten wir, daß bekanntlich

$$\bar{C}_m^j = \bar{B}_i^j \cdot \bar{A}_m^i \quad (14)$$

gilt. Wir gehen nun von der rechten Seite (13) aus und berücksichtigen (12) und (14):

$$\begin{aligned} \Phi &= C_k^i \cdot \bar{C}_m^j \cdot C_{ij}^m = A_w^i \cdot B_k^w \cdot \bar{B}_i^j \cdot \bar{A}_m^i \cdot (B_i^p \cdot B_j^q \cdot A_{pq}^m + A_p^m \cdot B_{ij}^p) \\ &= A_w^i \cdot B_k^w \cdot \bar{A}_m^i \cdot B_i^p \cdot (\bar{B}_i^j \cdot B_j^q) \cdot A_{pq}^m + A_w^i \cdot B_k^w \cdot \bar{B}_i^j \cdot (\bar{A}_m^i \cdot A_p^m) \cdot B_{ij}^p. \end{aligned}$$

Aber

$$\bar{B}_i^j \cdot B_j^q = \delta_i^q, \quad \bar{A}_m^i \cdot A_p^m = \delta_p^i,$$

also

$$\Phi = A_w^i \cdot B_k^w \cdot \bar{A}_m^i \cdot B_i^p \cdot A_{pt}^m + A_w^i \cdot B_k^w \cdot \bar{B}_i^j \cdot B_{ij}^p.$$

Jetzt transformieren wir die linke Seite Ψ von (13) auf Grund von (12), (10) und (11):

$$\begin{aligned} \Psi &= C_{kl}^i = A_{pq}^i \cdot B_k^p \cdot B_l^q + A_p^i \cdot B_{kl}^p \\ &= B_k^p \cdot B_l^q \cdot (A_p^i \cdot \bar{A}_m^j \cdot A_{qj}^m) + A_p^i \cdot (B_k^p \cdot \bar{B}_m^j \cdot B_{ij}^m) \\ &= A_p^i \cdot B_k^p \cdot \bar{A}_m^j \cdot B_l^q \cdot A_{qj}^m + A_p^i \cdot B_k^p \cdot \bar{B}_m^j \cdot B_{ij}^m. \end{aligned}$$

Eine Umänderung der Summationsindizes zeigt sofort, daß $\Psi = \Phi$ ist, was zu beweisen war.

Hauptsatz. Wenn man die Struktur der Relationen (10) beobachtet, so erkennt man, daß (10) in bezug auf A_{jk}^i ein System von $n \cdot \binom{n+1}{2}$ linearen und homogenen Gleichungen darstellt, wobei die Koeffizienten rationale (oder nach dem Multiplizieren beider Seiten mit J sogar ganze) Funktionen der A_k^i darstellen.

Außer der trivalen Lösung $A_{jk}^i = 0$ könnte also (10) nur dann erfüllt werden, falls die Determinante des Systems (10), die den Grad $n \cdot \binom{n+1}{2}$ besitzt, verschwindet. Dies würde eine algebraische Gleichung in bezug auf die A_k^i bedeuten und folglich eine Einschränkung der Gruppe L_1^n zu einer Untergruppe $\tilde{L}_1^n$ mit sich bringen. Dem ist aber nicht so. Wir werden nämlich den folgenden Satz beweisen.

Satz. Aus den Relationen (10) folgt $A_{kj}^i = 0$ für $i, k, j = 1, \dots, n$. Anders gesagt, die Untergruppe $\tilde{L}_2^n$ reduziert sich zu der Untergruppe L_1^n .

Beweis. Wir führen die folgenden kurzen Bezeichnungen ein:

$$W_i \stackrel{\text{df}}{=} \bar{A}_m^j \cdot A_{ij}^m. \quad (15)$$

Aus (10) und (15) erhalten wir

$$A_{kl}^i = A_k^i \cdot W_l. \quad (16)$$

Aus

$$A_{kl}^i = A_{lk}^i \quad (17)$$

und (16) folgt

$$A_k^i \cdot W_l = A_l^i \cdot W_k. \quad (18)$$

Setzen wir vorläufig voraus, daß wenigstens ein W_i von Null verschieden ist. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann $W_1 \neq 0$ vorausgesetzt werden. Für $k = 1$ folgt dann aus (18)

$$A_1^i \cdot W_l = A_l^i \cdot W_1$$

oder

$$A_l^i = \frac{W_l}{W_1} \cdot A_1^i. \quad (19)$$

(19) besagt aber, daß jede Spalte der Determinante J proportional zu der ersten Spalte ist, woraus $J = 0$ folgt entgegen der Voraussetzung (2). Die Annahme, daß wenigstens ein W_i von Null verschieden ist, führt also zum Widerspruch. Folglich haben wir $W_i = 0$ für $i = 1, \dots, n$, was zusammen mit (16) den Beweis vollendet.

Manuskripteingang: 5. 1. 1971

VERFASSER:
STANISŁAW GOŁĄB, Kraków (Polen)