Werk

Titel: Zur Berechnung der Homologiegruppen der Quadriken

Autor: K.; Richter, P.; DRECHSLER, K.; KRÖTENHEERDT

Jahr: 1977

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?301416052_0006|log7

Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

Zur Berechnung der Homologiegruppen der Quadriken

KONRAD DRECHSLER

Die Homologiegruppen der regulären Quadriken des komplexen projektiven Raumes sind von B. L. VAN DER WAERDEN [5] bestimmt worden. Die dabei verwendete Projektionsmethode hat O.-H. KELLER [4] verallgemeinert. Die Verallgemeinerung gestattet auch die Berechnung der Homologiegruppen der singularitätenbehafteten Quadriken, worauf in [4] nicht eingegangen wird. Hier soll ein anderer Weg zur Bestimmung der Homologiegruppen einer beliebigen Quadrik in stetiger Homologietheorie mit beliebiger Koeffizientengruppe eingeschlagen werden, der von den Eilenberg-Steenrod-Axiomen ausgeht¹⁾.

§ 1. Bekanntes

Wir betrachten die Homologie im Sinne von EILENBERG-STEENROD [2], S. 10.

1. Es gibt also für jedes Raumpaars (X, Y) eine exakte Homologiesequenz [2], Axiom 4,

$$\rightarrow H_r(Y) \xrightarrow{i_*} H_r(X) \xrightarrow{j_*} H_r(X, Y) \xrightarrow{\partial_*} H_{r-1}(Y) \rightarrow, \quad (1.1)$$

wobei i_* und j_* die durch die Inklusionen $i: Y \subset X$ und $j: (X, \emptyset) \subset (X, Y)$ induzierten Homomorphismen der Homologiegruppen und ∂_* der Randhomomorphismus sind.

2. Es seien A und B zwei Räume und i_{1*}, i_{2*}, j_{1*} und j_{2*} die zu den Inklusionen $i_1: A \cap B \subset A$, $i_2: A \cap B \subset B$, $j_1: A \subset A \cup B$ und $j_2: B \subset A \cup B$ gehörenden Homomorphismen; Ψ und Φ seien definiert durch $\Psi x = (i_{1*}x, -i_{2*}x)$ und $\Phi(y_1, y_2) = j_{1*}y_1 + j_{2*}y_2$ für $x \in H_r(A \cap B)$, $y_1 \in H_r(A)$ und $y_2 \in H_r(B)$. Dann ist die Mayer-Vietoris-Sequenz

$$\rightarrow H_r(A \cap B) \xrightarrow{\Psi} H_r(A) \oplus H_r(B) \xrightarrow{\Phi} H_r(A \cup B) \xrightarrow{\partial_*} H_{r-1}(A \cap B) \rightarrow \quad (1.2)$$

exakt.

3. Für stetige Homologie und kompakte Hausdorffräume folgt aus der Homöomorphie $X \setminus Y \simeq U \setminus V$ für alle r die Isomorphie [1]

$$H_r(X, Y) \cong H_r(U, V). \quad (1.3)$$

¹⁾ und der den Eindeutigkeitsatz und den Koeffizientensatz [3] nicht benötigt.

4. Die Homologiegruppen eines komplexen projektiven Raumes CP_n sind bei beliebiger Koeffizientengruppe G

$$H_r(CP_n) = \begin{cases} G & \text{für } 0 \leq r \leq 2n \text{ und } r \text{ gerade,} \\ 0 & \text{für } r \text{ sonst.} \end{cases} \quad (1.4)$$

Außerdem induziert die Einbettung $i: CP_{n-1} \subset CP_n$ für $r \neq 2n$ einen Isomorphismus i_* der Homologiegruppen (vgl. [6, 3]¹⁾)

$$i_*: H_r(CP_{n-1}) \rightarrow H_r(CP_n). \quad (1.5)$$

§ 2. Die birationale Abbildung

Es sei Q_n^q eine n -dimensionale Quadrik des $(n+1)$ -dimensionalen projektiven Raumes CP_{n+1} über dem Körper der komplexen Zahlen. Ihre Gleichung sei

$$f = \sum_{i,k=0}^{n+1} a_{ik} x_i x_k = 0. \quad (2.1)$$

Die Matrix (a_{ik}) der Koeffizienten habe den Rang $q > 2$. Das Koordinatensystem sei so gewählt, daß $X_0 = (0, \dots, 0, 1)$ ein nichtsingulärer Punkt von Q_n^q ist und die Tangentialhyperebene T in X_0 die Gleichung $x_n = 0$ hat. Dann hat (2.1) die Form

$$f = x_{n+1} x_n + q(x_0, \dots, x_n). \quad (2.2)$$

Die Projektion der Quadrik aus X_0 auf die Hyperebene U_n mit der Gleichung $x_{n+1} = 0$ und den Koordinaten $(u_0, \dots, u_n)$ wird beschrieben durch

$$\text{und } \left. \begin{aligned} x_i &= u_i u_n & \text{für } i = 0, \dots, n \\ x_{n+1} &= -q(u_0, \dots, u_n). \end{aligned} \right\} \quad (2.3)$$

Diese rationale Abbildung ist eineindeutig bis auf den Schnitt U_{n-1} der Tangentialhyperebene T mit U_n und den Schnitt Q_{n-1} der Tangentialhyperebene T mit Q_n^q . U_{n-1} hat die Gleichung $u_n = 0$, und Q_{n-1} hat in T die Gleichung $q(x_0, \dots, x_n, 0) = 0$. Q_{n-1} ist eine $(n-1)$ -dimensionale Quadrik in T , deren Koeffizientenmatrix den Rang $q-2$ hat.

Die Projektion (2.3) ist ein Homöomorphismus

$$Q_n^q \setminus Q_{n-1}^{q-2} \simeq U_n \setminus U_{n-1}. \quad (2.4)$$

§ 3. Die Homologiegruppen

Satz 1. *Es seien G eine abelsche Gruppe, Q_n^q eine n -dimensionale Quadrik des komplexen projektiven Raumes und q der Rang ihrer Koeffizientenmatrix. Dann sind die Homologiegruppen*

$$H_r(Q_n^q) = \begin{cases} G & \text{für } 0 \leq r \leq 2n \text{ und } r \text{ gerade und } r \neq 2n - q + 2, \\ G \oplus G & \text{für } r = 2n - q + 2 \text{ und } r \text{ gerade,} \\ 0 & \text{für } r < 0 \text{ oder } r > 2n \text{ oder } r \text{ ungerade.} \end{cases} \quad (3.1)$$

¹⁾ In [3] wird dieses Ergebnis aus den Eilenberg-Steenrod-Axiomen abgeleitet.

Beweis. Aus der exakten Homologiesequenz

$$\rightarrow H_r(U_{n-1}) \xrightarrow{i_*} H_r(U_n) \rightarrow H_r(U_n, U_{n-1}) \rightarrow H_{r-1}(U_{n-1}) \rightarrow$$

folgt bei Beachtung von (1.4) und (1.5)

$$H_r(U_n, U_{n-1}) = \begin{cases} G & \text{für } r = 2n, \\ 0 & \text{für } r \neq 2n. \end{cases} \quad (3.2)$$

Nach (2.4) und (1.3) sind

$$H_r(Q_n, Q_{n-1}) \cong H_r(U_n, U_{n-1}) \quad \text{für alle } r. \quad (3.3)$$

Der Beweis wird nun durch vollständige Induktion in nach ungeraden und geraden ϱ gesonderten Induktionsketten geführt.

Q_n^1 sind projektive Räume, und der Satz ist nach (1.5) für alle n und $\varrho = 1$ richtig. Zum Beweis des Satzes für $\varrho = 2$ beachten wir, daß Q_n^2 die Vereinigungsmenge zweier projektiver Räume CP_n, CP'_n ist, die sich in einem CP_{n-1} schneiden. Die Mayer-Vietoris-Sequenz (1.2) zerfällt hier in kurze exakte Sequenzen

$$0 \rightarrow H_r(CP_{n-1}) \xrightarrow{\Psi} H_r(CP_n) \oplus H_r(CP'_n) \xrightarrow{\Phi} H_r(Q_n^2) \rightarrow 0, \quad (3.4)$$

weil nach (1.4) und (1.5) i_{1*} und i_{2*} und damit auch Ψ für alle r Monomorphismen sind. Daraus folgt

$$H_r(Q_n^2) \cong (H_r(CP_n) \oplus H_r(CP'_n)) / \text{im } \Psi^1$$

Für $r = 2n$ ist $\text{im } \Psi = 0$ wegen (1.4). Für $r \neq 2n$ ist nach (1.5) i_{2*} ein Isomorphismus und daher $H_r(Q_n^2) \cong H_r(CP_n)$. Mit (1.4) folgt also

$$H_r(Q_n^2) = \begin{cases} G & \text{für } 0 \leq r < 2n \text{ und } r \text{ gerade,} \\ G \oplus G & \text{für } r = 2n, \\ 0 & \text{für } r < 0 \text{ oder } r > 2n \text{ oder } r \text{ ungerade.} \end{cases}$$

Dies ist die Behauptung des Satzes für $\varrho = 2$.

Zur Berechnung der Homologiegruppen von Q_n^{ϱ} bei $\varrho > 2$ benutzen wir die exakte Sequenz

$$\rightarrow H_r(Q_{n-1}^{\varrho-2}) \xrightarrow{i_*} H_r(Q_n^{\varrho}) \rightarrow H_r(Q_n^{\varrho}, Q_{n-1}^{\varrho-2}) \rightarrow H_r(Q_{n-1}^{\varrho-2}) \rightarrow. \quad (3.5)$$

Da nach (3.2) und (3.3) $H_r(Q_n^{\varrho}, Q_{n-1}^{\varrho-2}) = 0$ für $r \neq 2n$ ist, folgt aus der Exaktheit von (3.5)

$$H_r(Q_n^{\varrho}) \cong H_r(Q_{n-1}^{\varrho-2}) \quad (3.6)$$

für $r \neq 2n$ und $r \neq 2n - 1$.

Nach Induktionsvoraussetzung ergibt (3.6) die Behauptung des Satzes für $r \neq 2n$ und $r \neq 2n - 1$. Da $H_{2n}(Q_{n-1}^{\varrho-2}) = 0$ und $H_{2n-1}(Q_{n-1}^{\varrho-2}) = 0$ nach Induktionsvoraussetzung, $H_{2n}(Q_n^{\varrho}, Q_{n-1}^{\varrho-2}) = G$ und $H_{2n-1}(Q_n^{\varrho}, Q_{n-1}^{\varrho-2}) = 0$ nach (3.2) und (3.3) sind, folgt aus der Exaktheit der Sequenz (3.5) $H_{2n}(Q_n^{\varrho}) = G$ und $H_{2n-1}(Q_n^{\varrho}) = 0$. Das ist bei $\varrho > 2$ die Aussage des Satzes für $r = 2n$ und $r = 2n - 1$.

¹⁾ $\text{im } \Psi = \text{Bild von } \Psi$.

§ 4. Repräsentanten

Der hier angegebene Aufbau der Homologiegruppen aus den Axiomen hat zur Folge, daß Repräsentanten, will man sie betrachten, nachträglich definiert werden müssen. Es seien X ein topologischer Raum, $\mathbf{H}$ eine Homologietheorie nach EILENBERG-STEENROD [2], Y ein Unterraum von X , $e_*: H_r(Y) \rightarrow H_r(X)$ der durch die Einbettung $e: Y \subset X$ induzierte Homomorphismus der Homologiegruppen.

Definition 1. Y heißt *Repräsentant* von im e_* oder auch *Repräsentant von $H_r(X)$ in $\mathbf{H}$* , wenn $H_q(Y) = 0$ für $q > r$ und e_* nicht trivial sind.

Definition 2. Ein Repräsentant Y heißt *Basisrepräsentant* von im e_* oder *Basisrepräsentant von $H_r(X)$ in $\mathbf{H}$* , wenn im e_* direkter Summand von $H_r(X)$ ist.

Ob ein Raum Repräsentant einer Homologiegruppe ist, hängt von der Homologietheorie ab. So sind z. B. für die reelle projektive Ebene P_2 bei der Koeffizientengruppe Z der ganzen Zahlen jede Gerade P_1 Basisrepräsentant von $H_1(P_2)$ und P_2 kein Repräsentant für $H_2(P_2)$ und bei der Koeffizientengruppe $G = Z_2 = Z/2Z$ keine Gerade Repräsentant und P_2 Basisrepräsentant für $H_2(P_2)$ (vgl. [3]). Wir stellen uns die Aufgabe, in (1.4) und (3.1) für jeden Summanden G Basisrepräsentanten zu finden.

Satz 2. Bei nichttrivialer Koeffizientengruppe G ist in jeder Homologietheorie jeder m -dimensionale Unterraum CP_m eines komplexen projektiven Raumes CP_n mit $0 \leq m \leq n$ ein Basisrepräsentant von $H_{2m}(CP_n) = G$.

Dies folgt mit (1.4) durch mehrfache Anwendung von (1.5).

Satz 3. Es sei Q_n^ρ eine n -dimensionale komplexe projektive Quadrik vom Rang ρ . In jeder Homologietheorie mit nichttrivialer Koeffizientengruppe G gibt es folgende Basisrepräsentanten:

Für $2m < 2n - \rho + 2$ ist jeder m -dimensionale lineare Unterraum CP_m von Q_n^ρ und für $2m > 2n - \rho + 2$ jede auf Q_n^ρ gelegene m -dimensionale Quadrik $Q_m^{2(m-n)+\rho}$ vom Rang $2(m-n) + \rho$ Basisrepräsentant von $H_{2m}(Q_n^\rho) = G$. Für $2m = 2n - \rho + 2$ bilden zwei lineare Unterräume CP_m und CP'_m von Q_n^ρ , die sich in einem $(n-1)$ -dimensionalen Raum schneiden, ein Basisrepräsentantensystem von $H_{2m}(Q_n^\rho) = G \oplus G$.

Beweis. Daß es auf Q_n^ρ solche Räume gibt, sieht man, wenn man die in § 2 angegebene Projektion mehrmals anwendet und die zugehörige Folge von Quadriken gegebenenfalls durch projektive Räume ergänzt. Das ergibt

$$Q_n^\rho \supset Q_{n-1}^{\rho-2} \begin{cases} \supset Q_{n-(\rho-1)/2}^1 = CP_{n-(\rho-1)/2} \supset CP_{n-(\rho-3)/2} \supset \dots \\ \supset Q_{n-(\rho-2)/2}^2 = CP_{n-(\rho-2)/2} \cup CP'_{n-(\rho-2)/2} \supset CP_{n-(\rho-2)/2} \supset \dots \end{cases} \quad (4.1)$$

wobei die obere Variante für ungerades und die untere für gerades ρ gilt. Durch geeignete Wahl des Koordinatensystems bei diesen Projektionen erfährt man außerdem, daß es immer eine Folge (4.1) gibt, die vorgegebene Mengen $Q_m^{2(m-n)+\rho}$ bzw. CP_m enthält.

Man betrachte nun die zu (4.1) gehörende Folge der Homologiegruppen

$$\begin{array}{ccccccc}
 H_{2m}(Q_n^e) & \xleftarrow{i_*'} & H_{2m}(Q_{n-1}^{e-2}) & \xleftarrow{i_*'} & H_{2m}(Q_{n-(e-1)/2}^1) & \xleftarrow{i_*} & H_{2m}(CP_{n-(e-1)/2}) & \xleftarrow{i_*} \\
 & & & & \searrow i_*' & & & \\
 & & & & H_{2m}(Q_{n-(e-2)/2}^2) & \xleftarrow{i_*} & H_{2m}(CP_{n-(e-2)/2}) & \xleftarrow{i_*} .
 \end{array}$$

Die Abbildungen i_*' sind nach (3.6) und die i_* nach (1.5) von der Dimension m an Isomorphismen. Außerdem ist j_{1*} ein Monomorphismus. Dies erfährt man durch Betrachtung der exakten Mayer-Vietoris-Sequenz (3.4), wenn man bedenkt, daß i_{2*} monomorph ist. Die Monomorphismen i_*' , j_{1*} und i_* , von den Dimensionen m bis n zusammengefaßt, ergeben einen Monomorphismus

$$e_*: H_{2m}(Q_m^{2(m-n)+e}) \rightarrow H_{2m}(Q_n^e)$$

bzw.

$$e_*: H_{2m}(CP_m) \rightarrow H_{2m}(Q_n^e).$$

Wegen (3.1) bzw. (1.4) sind dann im $e_* = G$ und außerdem $H_q(Q_m^{2(m-n)+e}) = 0$ bzw. $H_q(CP_m) = 0$ für $q > 2m$. Damit ist der Satz 3 bewiesen.

LITERATUR

[1] DRECHSLER, K.: Homologiegruppen rationaler Varietäten. Math. Nachr. 46 (1970), 107–136.
 [2] EILENBERG, S., and N. STEENROD: Foundations of Algebraic Topology. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1952.
 [3] HU, S.-T.: Homology Theory. Holden-Day, San Francisco 1966.
 [4] KELLER, O.-H.: Bestimmung der Homologiebasen durch Projektionen. Math. Nachr. 45 (1970), 296–306; KELLER, O.-H.: Vorlesungen über algebraische Geometrie. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.G., Leipzig 1974.
 [5] VAN DER WAERDEN, B. L.: Zur algebraischen Geometrie, IV. Die Homologiezahlen der Quadriken und die Formeln von Halphen in der Liniengeometrie. Math. Ann. 109 (1933), 7–12.
 [6] VAN DER WAERDEN, B. L.: Topologische Begründung des Kalküls der abzählenden Geometrie. Math. Ann. 102 (1930), 337–362.

Manuskripteingang: 2. 12. 1974

VERFASSER:

KONRAD DRECHSLER, Sektion Mathematik der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg