

Werk

Label: Other

Jahr: 1888

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X_0017|log61

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

tedy

$$\Delta \alpha\beta\gamma = \sqrt{\gamma\vartheta \cdot \vartheta\beta \cdot \beta\varepsilon \cdot \gamma\varepsilon} = \sqrt{s \cdot (s-a) \cdot (s-b) \cdot (s-c)}, \quad (2)$$

kde a, b, c značí strany a s poloviční obvod $\Delta \alpha\beta\gamma$.*)

Počet pak upraví se takto: Budiž $\alpha\beta = 13$, $\beta\gamma = 14$, $\gamma\alpha = 15$ (jednotkám). Sečti tyto strany a bude 42, polovice toho 21. Odejmi od této 13, zbude 8 a 14; zbude 7 a též 15; zbude 6. Součin těchto zbytků s polovičním obvodem Δ , t. j. $21 \times 8 \times 7 \times 6 = 7056$ jest dvojmoc hledané plochy $\Delta \alpha\beta\gamma$; pročež tato $= \sqrt{7056} = 84$ [dle vzorce (2)].

Drobné zprávy.

Souřadnice cyklické. 1. V VII. svazku časopisu „Mathesis“ str. 129.—135. píše p. *M. d' Ocagne* o nových souřadnicích, kterýmž dává jméno „cyklické“. Výměr jich jest tento: V rovině bodů, jichž polohu jest určiti, zvolme libovolnou stálou přímku OX a v ní bod stálý O ; nazveme O počátkem a OX osou. Zvolme dále jistou délku r , pro tu kterou soustavu stálou. Touto délkou r jakožto poloměrem opišme z bodu M , jehož polohu jest určiti, jakožto středu kružnici K , počínajíce tuto opisovati z některého bodu počátečního, který s M leží na téže straně osy OX , a opisujíce kružnici vždy v témž směru (na př. ve směru opačném směru ručiček hodinových). Kružnice K protne osu OX nejprve v bodu M_1 a na to při dalším postupu v bodu M_2 ; vzdálenosti $OM_1 = \xi_1$ a $OM_2 = \xi_2$ jsou pak *cyklické* souřadnice bodu M . Za učiněných podmínek přísluší danému bodu M zcela určité souřadnice ξ_1 a ξ_2 a naopak, daným souřadnicím ξ_1 a ξ_2 přísluší jediný určitý bod M (vyjma jediný případ). Neboť jest zřejmo, že (při výše vytčeném směru opisování kružnic) pro body po jedné straně osy OX jest $\xi_1 < \xi_2$ a pro body po druhé straně osy OX jest $\xi_1 > \xi_2$. Jedná-li se o nalezení bodu M příslušného souřadnicím ξ_1 a ξ_2 , nanesme,

*) Kterak z dané plochy čtverce lze vypočítati jeho stranu, nevykládá Heron; ale podává hned hotový výpočet. Z důkazu jeho vysvítá zřejmě, že znal podobnost trojúhelníků a úměrnost stran podobných trojúhelníků, dále že věděl o vlastnostech čtyřúhelníka vepsaného do kruhu, o střední měřické úměrné a j. větách planimetrických.

majíce zření ku znamením, $OM_1 = \xi_1$, $OM_2 = \xi_2$ a nad délkou M_1M_2 jakožto základnou opišme rovnoramenný trojúhelník, jehož rameno má délku r , na jednu neb druhou stranu osy OX dle toho, jest-li $\xi_1 < \xi_2$ neb $\xi_1 > \xi_2$; vrchol trojúhelníka toho jest hledaný bod M . Neurčitost nastává jedině v případě, když $\xi_1 = \xi_2$, poněvadž tu body M_1 a M_2 se stotožňují, a bod M může naleznati se ve vzdálenosti r na kolmici v M_1 vztýčené jak po jedné tak i po druhé straně osy. Neurčitost ta však v každém jednotlivém případě, kterýž právě se vyšetřuje, sama sebou odpadne.

2. Přechod k soustavě pravoúhlých souřadnic a naopak jest poněkud stížen tím, že třeba rozeznávati při tom body po jedné od bodů po druhé straně osy OX ležících. Zvolíme-li OX za osu úseček x a kolmici OY v bodu O ku OX vztýčenou za osu pořadnic y , platí převodní vzorce (jak snadno z obrazce příslušného přesvědčiti se lze)

pro body po jedné straně OX ležící ($\xi_1 < \xi_2$):

$$x = \frac{\xi_1 + \xi_2}{2}, \quad y = \sqrt{r^2 - \left(\frac{\xi_2 - \xi_1}{2}\right)^2}$$

a naopak

$$\xi_2 = x + \sqrt{r^2 - y^2}, \quad \xi_1 = x - \sqrt{r^2 - y^2};$$

pro body po druhé straně OX ležící ($\xi_1 > \xi_2$):

$$x = \frac{\xi_1 + \xi_2}{2}, \quad y = -\sqrt{r^2 - \left(\frac{\xi_2 - \xi_1}{2}\right)^2}$$

a naopak

$$\xi_2 = x - \sqrt{r^2 - y^2}, \quad \xi_1 = x + \sqrt{r^2 - y^2}.$$

3. Jakákoliv rovnice $\varphi(\xi_1, \xi_2) = 0$ proměnných ξ_1 a ξ_2 udává křivku v souřadnicích cyklických. P. d' Ocagne odvozuje zajímavou relaci, pomocí které lze ustanoviti polohu průsečného bodu osy OX s normalou sestrojenou v některém bodě křivky. Jest-li totiž M bod křivky $\varphi(\xi_1, \xi_2) = 0$, jemuž přísluší souřadnice $OM_1 = \xi_1$ a $OM_2 = \xi_2$, jest-li dále N průsečný bod osy OX s normalou sestrojenou v bodu M , tu platí jednoduchá rovnice

$$(\alpha) \quad n_1 \varphi_1 = n_2 \varphi_2,$$

kdež značí φ_1, φ_2 částečné derivace φ dle ξ_1, ξ_2 a n_1, n_2 jsou vzdálenosti bodu N od bodů M_1, M_2 . Jest tedy poloha bodu N vzhledem ku bodům M_1 a M_2 určena dělicím poměrem $\frac{n_1}{n_2} = \frac{\varphi_2}{\varphi_1}$.

4. Některé příklady. Lineární rovnice

$$A\xi_1 + B\xi_2 + C = 0$$

udává dva protilehlé quadranty ellipsy, jejíž střed jest v ose OX ve vzdálenosti $\frac{-C}{A+B}$ od bodu O a jejíž poloosy jsou $\frac{r(A-B)}{A+B}$ v ose OX a r v kolmici ku OX. Druhé dva protilehlé kvadranty téže ellipsy dány jsou rovnicí

$$A\xi_2 + B\xi_1 + C = 0.$$

Leží-li střed ellipsy v počátku O, obdrží rovnice ty tvar

$$\xi_2 = k\xi_1 \quad \text{a} \quad \xi_1 = k\xi_2,$$

načež poloosy jsou $\frac{r(k+1)}{k-1}$ v ose OX a r v kolmici ku OX. Pro quadrant na př. daný rovnicí $\xi_2 = k\xi_1$ obdrží se dle (α)

$$n_2 = -kn_1;$$

jest tedy střed O vzhledem ku bodům M_2 a M_1 dán poměrem $\frac{\xi_2}{\xi_1} = k$ a průsečný bod N normaly s osou OX poměrem $\frac{n_2}{n_1} = -k$, t. j. body O a N jsou harmonicky sdružené vzhledem ku bodům M_1 a M_2 .

Toho lze užiti ke konstrukci normaly v daném bodu M ellipsy. Opišme z bodu M poloměrem, který se rovná jedné poloose, kružnici; tato protne druhou osu v bodech M_1 a M_2 , a stačí nyní, určití bod N harmonicky sdružený se středem O vzhledem k bodům M_1 a M_2 ; přímka MN jest hledaná normála.

5. Rovnice

$$\xi_1 \xi_2 - m(\xi_1 + \xi_2) = R^2 - m^2 - r^2$$

udává kružnici o poloměru R, jejíž střed jest v ose OX ve vzdálenosti m od počátku O.

Jest-li střed kružnice v počátku O, t. j. $m = 0$, přejde rovnice v

$$\xi_1 \xi_2 = R^2 - r^2.$$

Z rovnice té jest zřejmo, že veškeré dvojice bodů M_1 a M_2 tvoří involuci, jejíž konstanta jest $c^2 = R^2 - r^2$ a jejíž střed jest v počátku O. Lze tedy říci: *Dána-li kružnice poloměru R , a opíšeme-li z jednotlivých jejích bodů jakožto středu kružnice o libovolném poloměru r , vytvoří průsečné body těchto kružnic s kterýmkoliv průměrem dané kružnice involuci bodovou, jejíž bod centrálný jest ve středu dané kružnice.*

A naopak: *Proložíme-li veškerými dvojicemi bodů dané involuce kružnice téhož poloměru, leží středy veškerých těchto kružnic v nové kružnici, jejíž střed jest v centrálném bodu involuce.*

Vlastnosti této lze s výhodou užiti ku sestřování dalších dvojic involuce, kteráž dvěma dvojicemi určena jest.

6. Rovnice

$$\frac{\xi_1^2 + \xi_2^2}{2} - m(\xi_1 + \xi_2) = a^2 - m^2 + r^2$$

udává rovnoramennou hyperbolu, jejíž poloosa $= a$, střed v ose OX ve vzdálenosti m a realná osa shoduje se s osou OX. Leží-li střed hyperboly v počátku O, t. j. pro $m = 0$, bude rovnice hyperboly

$$\xi_1^2 + \xi_2^2 = 2(a^2 + r^2).$$

7. P. d' Ocagne zmiňuje se ku konci o upotřebení *principu duality*, jehož podstata záleží v tomto: Dokazujeme-li některou poučku v jisté soustavě souřadnicové, kdež užíváme souřadnic α_1 a α_2 , a nahradíme-li v analytických vzorcích se tu vyskytující souřadnice α_1 a α_2 veskrze souřadnicemi β_1 a β_2 , jiné soustavy, obdržíme tím důkaz nové poučky, jakmile význam vzorců v soustavě (β_1, β_2) dovedeme vyložit. Na př. poučku: *Bod dotyku tečny kružnice leží na poloměru kolmém ku tečně* lze v souřadnicích pravoúhlých podati takto: Dotýká-li se čára $y = mx + n$ čáry $x^2 + y^2 = R^2$, leží bod dotyku na čáře $y = -\frac{1}{m}x$. Nahradíme-li v těchto vzorcích souřadnice x a y souřadnicemi cyklickými ξ_1 a ξ_2 , obdržíme podobně: Dotýká-li