

Werk

Label: Article

Jahr: 1928

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X_0057|log34

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

O integrování nekonečných řad.

Napsal Vojtěch Jarník.

§ 1. Úvod.

V nauce o integrování nekonečných řad je zvláště důležitá následující **věta Arzelova**:¹⁾

Věta 1. Budiž $f_1(x), f_2(x), \dots$ posloupnost funkcí, definovaných v intervalu $\langle a, b \rangle$, jež má tyto vlastnosti:

1. Funkce $f_1(x), f_2(x), \dots$ jsou integrace schopny²⁾ v intervalu $\langle a, b \rangle$.

2. Pro každé x intervalu $\langle a, b \rangle$ existuje limita $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

3. Funkce $f(x)$ jest integrace schopna v intervalu $\langle a, b \rangle$.

4. Existuje kladné číslo C tak, že $|f_n(x)| < C$ pro všechna x intervalu $\langle a, b \rangle$ a pro všechna $n = 1, 2, 3, \dots$.

Potom jest

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Věta tato praví tedy, že za určitých předpokladů lze zaměnit pořádek mezi limitním přechodem a integrací, t. j. že za oněch předpokladů platí

$$\int_a^b (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Věta Arzelova, tak jak byla vyslovena, jedná o integraci limity konvergentní posloupnosti; lze ji však okamžitě dát tento tvar:

Věta 2. Budiž $g_1(x), g_2(x), \dots$ posloupnost funkcí, definovaných v intervalu $\langle a, b \rangle$, jež má tyto vlastnosti:

¹⁾ Všechny funkce a všechna čísla v této práci jsou reálná, konečná. Jestliže $a < b$, potom značí $\langle a, b \rangle$ množství všech čísel x , pro něž $a \leq x \leq b$ (uzavřený interval); obdobně značí (a, b) resp. $\langle a, b \rangle$ resp. (a, b) množství všech čísel x , pro něž $a < x < b$ (otevřený interval), resp. $a \leq x < b$, resp. $a < x \leq b$ (polouzavřené intervaly).

²⁾ »Integrace schopný« a »integrál« jest rozuměti v této práci ve smyslu Riemannově; viz K. Petr, Počet integrální, str. 102.

1. Funkce $g_1(x), g_2(x), \dots$ jsou integrace schopny v intervalu $\langle a, b \rangle$.

2. Pro každé x intervalu $\langle a, b \rangle$ jest řada $g_1(x) + g_2(x) + \dots$ konvergentní. Označme

$$g_1(x) + g_2(x) + \dots = f(x).$$

3. Funkce $f(x)$ jest integrace schopna v intervalu $\langle a, b \rangle$.

4. Existuje kladné číslo C tak, že $|g_1(x) + g_2(x) + \dots + g_n(x)| < C$ pro všechna x intervalu $\langle a, b \rangle$ a pro všechna $n = 1, 2, 3, \dots$

Potom jest

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g_1(x) dx + \int_a^b g_2(x) dx + \dots$$

Věta 2 jest bezprostředním důsledkem věty 1; položíme totiž $f_n(x) = g_1(x) + g_2(x) + \dots + g_n(x)$; funkce $f_1(x), f_2(x), \dots$ splňují potom patrně předpoklady věty 1 a tedy jest následkem věty 1

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (g_1(x) + \dots + g_n(x)) dx = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b g_1(x) dx + \dots + \int_a^b g_n(x) dx \right) = \int_a^b g_1(x) dx + \int_a^b g_2(x) dx + \dots, \end{aligned}$$

jak bylo dokázati.

Věta 2 udává, že za určitých předpokladů lze nekonečnou řadu integrovati člen po členu. V literatuře existuje hojnost důkazů věty 1 a 2³⁾. V roce 1925 vypracoval jsem pro 2 vydání knihy prof. Petra »Počet integrální« nový důkaz, který zde podávám.

Důkaz je založen na pojmu vnější míry Jordanovy; čtenář nepotřebuje však teorii míry znáti: používám totiž jen definice vnější míry Jordanovy a jejích nejjednodušších vlastností, jež lze z definice přímo vyčísti. Z teorie množství bodových nemusí čtenář též nic znáti: jednoduchý speciální tvar pokrývací věty Borelovy, který v následujícím potřebuji, dokazuji v 1. pomocné větě.

Důkaz Arzelovy věty, který provádím, bylo by možno směstnati na mnohem menší prostor: abych však výklad učinil pokud možno srozumitelným, provádím obšírně všechny kroky.

§ 2. O míře Jordanově.

Zavedeme napřed několik označení. Pod »množstvím bodovým« rozumím množství reálných čísel čili — geometricky řečeno —

³⁾ Věta Arzelova pochází z roku 1885. Další důkazy podali Hartogs, Bieberbach, Landau, Osgood, F. Riesz, Hausdorff. Literární údaje viz v pojednání: F. Hausdorff, Beweis eines Satzes von Arzelà, Math. Zeitschr. 26 (1927), str. 135—137.

množství bodové na ose číselné. Jsou-li M_1, M_2 dvě množství bodová a je-li každý bod z M_1 obsažen v M_2 , značí tuto okolnost znakem $M_1 \leq M_2$. Jsou-li $M_1, M_2, \dots$ množství bodová v konečném nebo nekonečném počtu, znamená $M_1 + M_2 + \dots$ množství všech bodů, které jsou obsaženy aspoň v jednom z množství $M_1, M_2, \dots$; $M_1, M_2, \dots$ znamená množství všech bodů, jež jsou obsaženy ve všech množstvích $M_1, M_2, \dots$. Je-li dáno množství bodové M a konečný nebo nekonečný počet bodových množství $M_1, M_2, \dots$ tak, že $M \leq M_1 + M_2 + \dots$ (t. j. tak, že každý bod z M leží aspoň v jednom z množství $M_1, M_2, \dots$), říkáme, že systém množství $M_1, M_2, \dots$ pokrývá množství M .

1. pomocná věta (zvláštní případ věty Borelovy). Budiž $J = \langle a, b \rangle$ uzavřený interval; budiž

$$J_1, J_2, \dots \quad (1)$$

posloupnost otevřených intervalů, jež pokrývá interval J (t. j. $J \leq J_1 + J_2 + \dots$); potom lze zvoliti celistvé kladné číslo k tak, že také systém intervalů

$$J_1, J_2, \dots, J_k$$

pokrývá interval J (t. j. $J \leq J_1 + J_2 + \dots + J_k$).

Důkaz. V posloupnosti (1) existuje aspoň jeden interval J_{k_0} , který obsahuje bod a .⁴⁾ Pro každé celistvé $n \geq k_0$ definujeme číslo b_n jakožto největší z čísel x intervalu $\langle a, b \rangle$ takových, že

$$\langle a, x \rangle \leq J_1 + J_2 + \dots + J_n;$$

takové číslo b_n patrně existuje ke každému $n \geq k_0$ a platí $a < b_n \leq b_{n+1} \leq b$; existuje tedy $\lim b_n = c$ a jest

$$a < b_n \leq c \leq b. \quad (2)$$

Předpokládejme, že $c < b$; potom existuje v (1) aspoň jeden interval J_{k_1} , který obsahuje bod c ; volme nějaké číslo n_1 tak, že $n_1 \geq k_0$, $n_1 \geq k_1$ a dále budiž n_1 již tak veliké, že bod b_{n_1} leží v intervalu J_{k_1} ; to je možno, ježto $\lim b_n = c$. Systém intervalů $J_1, J_2, \dots, J_{n_1}$ pokrývá patrně aspoň celý interval $\langle a, d \rangle$, kde d je pravý koncový bod intervalu J_{k_1} , a tedy $d > c$. Nutně tedy jest $b_{n_1} \geq d > c$, což je však ve sporu s (2).

Je tedy nutně $c = b$. Vyberme z (1) interval J_{k_2} , který obsahuje bod b . Volme k větší než k_0 a k_2 tak, že bod b_k leží v J_{k_2} — to je možno, ježto $\lim b_n = b$; potom intervaly $J_1, J_2, \dots, J_k$ pokrývají patrně celý interval $\langle a, b \rangle$, jak bylo dokázati.

Definice. Budiž M ohraničené množství bodové; $J_1, J_2, \dots, J_n$ budiž konečný počet otevřených intervalů a budiž $M \leq J_1 + J_2 + \dots + J_n$ (t. j. systém intervalů $J_1, J_2, \dots, J_n$ nechť pokrývá množ-

⁴⁾ Obsahuje-li nějaký otevřený interval (α, β) bod a , jest $\alpha < a < \beta$ t. j. a jest vnitřním bodem intervalu (α, β) .

stvi M); označme znakem μ součet délek těchto intervalů (t. j. jestliže $J_i = (a_i, \beta_i)$, potom $\mu = \sum_{i=1}^n (\beta_i - a_i)$). Uvažujme nyní všechny systémy, složené z konečného počtu otevřených intervalů, jež pokrývají množství M ; ke každému takovému systému přísluší určité kladné číslo μ . Všechna čísla μ , příslušná ke všem těmto systémům, tvoří jisté množství čísel kladných; dolní hranici tohoto množství čísel kladných nazýváme vnější Jordanovou měrou množství M .

Poznámka. Místo »vnější Jordanova míra« budu říkati krátce »míra«. Míru množství M značiti budu mM . Je-li $M_1 \leq M_2$, je patrně $mM_1 \leq mM_2$. Míra intervalu (otevřeného, uzavřeného, nebo polouzavřeného) rovná se patrně jeho délce, na př. $m\langle a, b \rangle = b - a$. Míra množství, obsahujícího jen konečný počet bodů, je patrně rovna nule.

2. pomocná věta. Buďtež M, N dvě ohraničená množství bodová, $M \leq N$; dále budiž $I_1, I_2, \dots, I_l$ konečný počet otevřených intervalů, jež pokrývají množství M (t. j. $M \leq I_1 + I_2 + \dots + I_l$). ϵ budiž číslo kladné, libovolně zvolené. Potom lze naléztí konečný počet otevřených intervalů $I_{l+1}, I_{l+2}, \dots, I_{l+p}$, takže platí

$$1. N \leq I_1 + I_2 + \dots + I_{l+p},$$

$$2. mI_{l+1} + mI_{l+2} + \dots + mI_{l+p} \leq mN - mM + \epsilon.$$

Důkaz. Označme $M_1 = I_1 + I_2 + \dots + I_l$. Sestrojíme konečný počet otevřených intervalů $K_1, K_2, \dots, K_k$, jež pokrývají N tak, že $mK_1 + mK_2 + \dots + mK_k < mN + \frac{1}{2}\epsilon$ a označme

$$N_1 = K_1 + K_2 + \dots + K_k. \quad (3)$$

Množství N_1 jest dáno v (3) jako součet intervalů otevřených, jež mohou míti body společné; je však bezprostředně jasno, že lze vyjádřiti množství N_1 též jako součet konečného počtu otevřených intervalů $H_1, H_2, \dots, H_h$, z nichž žádné dva nemají společných bodů: $N_1 = H_1 + H_2 + \dots + H_h$. Tím spíše jest

$$mH_1 + mH_2 + \dots + mH_h < mN + \frac{1}{2}\epsilon; \quad (4)$$

obdobně lze vyjádřiti M_1 . Z toho je patrné, že také množství M_1N_1 lze vyjádřiti jako součet konečného počtu otevřených intervalů $L_1, L_2, \dots, L_l$, z nichž žádné dva nemají společných bodů: $M_1N_1 = L_1 + L_2 + \dots + L_l$. Každý bod z M leží v M_1 a rovněž v N_1 (neboť $M \leq N \leq N_1$), je tedy $M \leq M_1N_1$ a tedy nutně

$$mL_1 + mL_2 + \dots + mL_l \geq mM, \quad (5)$$

neboť mM je dolní hranicí takových součtů. Odstraníme-li z N_1 všechny body, obsažené v $L_1 + L_2 + \dots + L_l = M_1N_1$, zbude jakési množství bodové N_2 , složené z konečného počtu množství $P_1, P_2, \dots, P_p$, $N_2 = P_1 + P_2 + \dots + P_p$, tak, že každé množství P_r ($r = 1, 2, \dots, p$) je buď interval (uzavřený, polouzavřený nebo otevřený)

nebo jediný bod a dále tak, že žádná dvě z množství $P_1, P_2, \dots, P_p$ nemají bodů společných. Platí ovšem

$$mL_1 + mL_2 + \dots + mL_l + mP_1 + mP_2 + \dots + mP_p = mH_1 + mH_2 + \dots + mH_l,$$

a tedy podle (4) a (5)

$$mP_1 + mP_2 + \dots + mP_p < mN - mM + \frac{1}{2}\varepsilon.$$

Dále je $M_1N_1 + N_2 = N_1$, tedy $M_1 + N_2 \geq N$. Nahradme nyní každé množství P_r ($r = 1, 2, \dots, p$) otevřeným intervalem, jež označíme I_{i+r} , takže $P_r \subseteq I_{i+r}$, $mI_{i+r} < mP_r + \varepsilon/2p$. Potom je

1. $N \leq M_1 + N_2 \leq I_1 + \dots + I_i + I_{i+1} + \dots + I_{i+p}$,
2. $mI_{i+1} + mI_{i+2} + \dots + mI_{i+p} < mN - mM + \varepsilon$,

jak bylo dokázati.

3. pomocná věta. Budiž $M_1, M_2, \dots$ posloupnost množství bodových, jež má tyto vlastnosti: 1. $M_1 \leq M_2 \leq M_3 \leq \dots$; $M_1 + M_2 + \dots = \langle a, b \rangle$. Potom jest $\lim_{n \rightarrow \infty} mM_n = b - a$.

Důkaz. Jest $M_n \leq \langle a, b \rangle$ a tedy $mM_n \leq m \langle a, b \rangle = b - a$. Za druhé jest $mM_n \leq mM_{n+1}$. Existuje tedy limita $\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} mM_n$ a jest $\nu \leq b - a$.

Předpokládejme, že $\nu < b - a$; z toho vyvodíme spor. Zvolme $\eta = \frac{1}{2}(b - a - \nu)$; tedy $\eta > 0$. Sestrojme napřed otevřené intervaly $I_1, I_2, \dots, I_{i_1}$, takže

$$M_1 \leq I_1 + I_2 + \dots + I_{i_1}, \quad mI_1 + mI_2 + \dots + mI_{i_1} < mM_1 + \eta/2.$$

Podle druhé pomocné věty sestrojme dále otevřené intervaly $I_{i_1+1}, I_{i_1+2}, \dots, I_{i_2}$ tak, že

$$M_2 \leq I_1 + I_2 + \dots + I_{i_2}, \quad mI_{i_1+1} + mI_{i_1+2} + \dots + mI_{i_2} < mM_2 - mM_1 + \eta/2^2;$$

podle druhé pomocné věty sestrojme dále otevřené intervaly $I_{i_2+1}, I_{i_2+2}, \dots, I_{i_3}$ tak, že

$$M_3 \leq I_1 + I_2 + \dots + I_{i_3}, \quad mI_{i_2+1} + mI_{i_2+2} + \dots + mI_{i_3} < mM_3 - mM_2 + \eta/2^3;$$

tak pokračující, dostáváme posloupnost otevřených intervalů $I_1, I_2, I_3, \dots$, jež má tyto vlastnosti:

A) $\langle a, b \rangle \leq I_1 + I_2 + \dots$; neboť každý bod $z \in \langle a, b \rangle$ leží v nějakém M_n a platí

$$M_n \leq I_1 + I_2 + \dots + I_{i_n}.$$

B) Pro každé k jest $\sum_{n=1}^k mI_n < b - a - \eta$; neboť, je-li r defino-

váno nerovnostmi

$$\begin{aligned}
 i_{r-1} < k \leq i_r, \text{ je } \sum_{n=1}^k mI_n &\leq \sum_{n=1}^{i_1} mI_n + \sum_{n=i_1+1}^{i_2} mI_n + \dots + \\
 &+ \sum_{n=i_{r-1}+1}^{i_r} mI_n < \left(mM_1 + \frac{\eta}{2}\right) + \left(mM_2 - mM_1 + \frac{\eta}{2}\right) + \dots + \\
 &+ \left(mM_r - mM_{r-1} + \frac{\eta}{2}\right) < mM_r + \eta \leq \nu + \eta = b - a - \eta.
 \end{aligned}$$

Podle první pomocné věty lze nalézt k tak, že $\langle a, b \rangle \leq I_1 + I_2 + \dots + I_k$ (na základě vlastnosti A). Podle vlastnosti B je však součet délek intervalů $I_1, I_2, \dots, I_k$ menší než $b - a$, což je patrně ve sporu s okolností, že tyto intervaly pokrývají celý interval $\langle a, b \rangle$. Nemůže tedy být $\nu < b - a$ a je tedy $\nu = b - a$, jak bylo dokázáno.

§ 3. Důkaz věty Arzelovy.

4. pomocná věta. Budiž $h_1(x), h_2(x), \dots$ posloupnost funkcí definovaných v intervalu $\langle a, b \rangle$; budiž dále $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = 0$ pro $a \leq x \leq b$; konečně necht existuje kladné číslo D takové, že $|h_n(x)| < D$ pro všechna x intervalu $\langle a, b \rangle$ a pro všechna $n = 1, 2, 3, \dots$. Potom jest ⁵⁾

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \int_a^b h_n(x) dx \leq 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \inf \int_a^b h_n(x) dx \geq 0.$$

Důkaz. Pro $a \leq x \leq b$, $n = 1, 2, 3, \dots$ položíme ⁶⁾ $F_n(x) = \text{Max}(0, h_n(x), h_{n+1}(x), \dots)$. Toto číslo existuje, neboť buď jsou čísla

$$h_n(x), h_{n+1}(x), \dots \quad (6)$$

všechna ≤ 0 a potom je $\text{Max}(0, h_n(x), h_{n+1}(x), \dots) = 0$, nebo je aspoň jedno z čísel (6) kladné a potom vzhledem k $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = 0$ musí být mezi nimi aspoň jedno největší. Platí

$$0 \leq F_{n+1}(x) \leq F_n(x) < D, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = 0 \quad (7)$$

pro $a \leq x \leq b$.

Zvolme libovolné kladné číslo ε ; označme znakem $M_n(\varepsilon)$ množství oněch bodů x intervalu $\langle a, b \rangle$, pro něž $F_n(x) < \varepsilon/2(b - a)$;

⁵⁾ Definici horního a dolního integrálu viz v knize K. Petr, Počet integrální, str. 108.

⁶⁾ $\text{Max}(a_1, a_2, a_3, \dots)$ označují největší z čísel $a_1, a_2, a_3, \dots$; je-li těchto čísel nekonečné množství, je ovšem nutno existenci největšího čísla mezi nimi dokázat.

vzhledem k (7) je patrně $M_n(\varepsilon) \leq M_{n+1}(\varepsilon)$, $M_1(\varepsilon) + M_2(\varepsilon) + \dots = \langle a, b \rangle$. Podle 3. pomocné věty je tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} m M_n(\varepsilon) = b - a$; lze tedy zvoliti číslo $n_0 = n_0(\varepsilon)$ (závislé na ε) tak, že $m M_{n_0}(\varepsilon) > b - a - \varepsilon/2D$.

Rozdělme nyní interval $\langle a, b \rangle$ na konečný počet dílů body $x_0, x_1, x_2, \dots, x_l$ tak, že

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{l-1} < x_l = b, l \geq 1 \quad (8)$$

a označme symbolem μ_i ($i = 1, 2, \dots, l$) dolní hranici funkce $F_{n_0}(x)$ v intervalu $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$. Sestrojíme součet

$$s = \sum_{i=1}^l \mu_i (x_i - x_{i-1}).$$

Tvrdím: ony z intervalů $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$, v nichž je $\mu_i \geq \varepsilon/2 (b - a)$, mají součet délek nejvýše $\varepsilon/2D$; kdyby totiž součet jejich délek byl větší než $\varepsilon/2D$, byl by součet délek ostatních intervalů $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$ menší než $b - a - \varepsilon/2D$. Množství $M_{n_0}(\varepsilon)$ nemá však žádný bod v intervalech $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$, v nichž $\mu_i \geq \varepsilon/2 (b - a)$; jest tedy množství $M_{n_0}(\varepsilon)$ pokryto těmi ostatními intervaly $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$, jichž délky by měly součet menší než $b - a - \varepsilon/2D$. Bylo by tedy možno pokryti množství $M_{n_0}(\varepsilon)$ konečným počtem uzavřených intervalů o součtu délek menším než $b - a - \varepsilon/2D$ a tedy také konečným počtem otevřených intervalů o součtu délek menším než $b - a - \varepsilon/2D$ (k tomu stačí, nahraditi každý z těch uzavřených intervalů intervalem otevřeným trochu větším); to je však ve sporu s nerovností $m M_{n_0}(\varepsilon) > b - a - \varepsilon/2D$.

Jest tedy příspěvek oněch intervalů $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$, pro něž $\mu_i \geq \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$, k součtu s menší než $D \cdot \frac{\varepsilon}{2D} = \frac{\varepsilon}{2}$, neboť $\mu_i < D$. Příspěvek ostatních intervalů $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$ k součtu s je pak menší než

$$\frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=1}^l (x_i - x_{i-1}) = \frac{\varepsilon}{2}. \text{ Je tedy } s < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

ať jsou čísla $l, x_0, x_1, \dots, x_l$, hovící vztahům (8), zvolena jakkoli.

Dolní integrál $\int_a^b F_{n_0}(x) dx$ je však podle definice roven právě horní hranici součtů s , vzatých pro všechny možné volby čísel $l, x_0, x_1, \dots, x_l$, pro něž platí (8). Jest tedy

$$\int_a^b F_{n_0}(x) dx \leq \varepsilon.$$

Vzhledem k (7) je tedy

$$0 \leq \int_a^b F_n(x) dx \leq \varepsilon \text{ pro } n \geq n_0(\varepsilon),$$

tedy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b F_n(x) dx = 0.$$

Ježto patrně $h_n(x) \leq F_n(x)$, jest konečně

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \int_a^b h_n(x) dx \leq 0.$$

Užijí-li tohoto výsledku na funkce $-h_1(x), -h_2(x), \dots$, dostávám

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \int_a^b (-h_n(x)) dx \leq 0;$$

ale

$$\int_a^b (-h_n(x)) dx = - \int_a^b h_n(x) dx,$$

tedy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \int_a^b (-h_n(x)) dx = - \lim_{n \rightarrow \infty} \inf \int_a^b h_n(x) dx,$$

čili

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf \int_a^b h_n(x) dx \geq 0,$$

jak bylo dokázati.

Důkaz věty 1. Funkce $f_1(x), f_2(x), \dots$ necht' splňují předpoklady věty 1 z § 1; položme $f_n(x) - f(x) = h_n(x)$, $2C = D$; potom je⁷⁾ $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = 0$, $|h_n(x)| < D$ pro $a \leq x \leq b$, $n = 1, 2, 3, \dots$; podle 4. pomocné věty je tedy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \int_a^b h_n(x) dx \leq 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \inf \int_a^b h_n(x) dx \geq 0.$$

Funkce $h_n(x)$ jsou však v intervalu $\langle a, b \rangle$ integrace schopny; jest tedy

$$\int_a^b h_n(x) dx = \int_a^b h_n(x) dx = \int_a^b h_n(x) dx,$$

⁷⁾ Neboť $|f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| \leq C$.