

Werk

Label: Article

Jahr: 1933

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X_0062|log61

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

Příspěvek k teorii dimense.

Eduard Čech.

(Došlo 14. března 1933.)

Úvod. Necht $n = 1, 2, 3, \dots$. Označme C_n množství těch „bodů“ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, pro něž $0 \leq x_i \leq 1$ ($1 \leq i \leq n$). C_n jest nejjednodušší příklad bodového množství *dimense* n . Speciálně pro $m < n$ *dimense* množství C_m je menší než *dimense* množství C_n . Otázka po přesném matematickém smyslu ležatě vytištěného výroku není však zcela prostá. Na první pohled se zdá, že C_n má více bodů než C_m . Avšak již r. 1877 G. Cantor ukázal,¹⁾ že tomu tak není, že totiž existuje *jednoznačné* zobrazení C_m na C_n . Zkusme to tedy jinak! Je zřejmé, že (stále pro $m < n$) C_m je *spojitý* obraz (na př. projekce) množství C_n ; naproti tomu z názoru se zdá, že C_n není *spojitým* obrazem množství C_m . Avšak ani tato cesta nevede k cíli, neboť r. 1890 ukázal G. Peano,²⁾ že naopak existuje také *spojité* zobrazení množství C_m na množství C_n .

R. 1910 H. Lebesgue vyslovil³⁾ větu (*Lebesgueovo lemma*): C_n dá se pokrýti konečným počtem libovolně malých uzavřených množství tak, že každý bod náleží nejvýš do $n + 1$ z nich, nikoli však tak, aby každý bod náležel nejvýš do n z nich. Je patrné, že na základě Lebesgueova lemmatu lze vysloviti obecnou definici *dimense*. To však Lebesgue neučinil, nýbrž užil svého lemmatu pouze k odůvodnění faktu, že C_m a C_n ($m \neq n$) mají různou topologickou strukturu.⁴⁾

Prvou obecnou definici *dimense* vyslovil r. 1913 L. E. J. Brouwer.⁵⁾ Brouwerova práce zůstala však izolovaná a za zakladatele obecné *teorie* *dimense* jest považovati teprve K. Menger a P. Ury-

¹⁾ Journal f. Math., sv. 84 (1877), str. 242.

²⁾ Math. Ann., sv. 36 (1890), str. 257.

³⁾ Math. Ann., sv. 70 (1911), str. 166. Důkaz zde naznačený není úplný a byl Lebesguem přesně vyložen teprve ve Fund. Math., sv. 2 (1921), str. 256. První přesný důkaz Lebesgueova lemmatu udal Brouwer ve článku citovaném v pozn. ⁵⁾. Lebesgueův důkaz byl později značně zjednodušen W. Hurewiczem [Math. Ann., sv. 101 (1929), str. 210] a E. Spernerem [Hamb. Abh., sv. 6 (1928), str. 265].

⁴⁾ První přesný důkaz tohoto faktu udal Brouwer v Math. Ann., sv. 70 (1911), str. 161.

⁵⁾ Journ. f. Math., sv. 142 (1913), str. 146 [v. též sv. 153 (1924), str. 253].

sohna.⁶⁾ Vznik těchto prací jest umístiti asi do let 1921—1923. Z jiných autorů, kteří přispěli k dalšímu rozvoji této teorie, jest připomenouti zejména W. Hurewicze.

Tato teorie dimense je vybudována v separabilních⁷⁾ prostorech. Četné věty mají však platnost pouze v kompaktních⁸⁾ nebo polokompaktních⁹⁾ prostorech. Omezení na separabilní prostory jest u některých problémů,¹⁰⁾ jak se zdá, odůvodněno povahou věci. U některých problémů má se však věc jinak. Jak jsem ukázal,¹¹⁾ lze Menger-Urysohnovu definici dimense upravit tak, že platnost některých vět se rozšíří na mnohem obecnější prostory dokonale normální,¹²⁾ obsahující jako zvláštní případ všechny prostory metrické.¹³⁾

Urysohn dokázal,¹⁴⁾ že u kompaktních prostorů lze dimensi definovati vlastností vyslovenou v Lebesgueově lemmatu; upozorňuje při tom, že tato definice je omezena na kompaktní prostory. Avšak později Hurewicz vyslovil Lebesgueovo lemma v takové formě, že udává charakteristickou vlastnost dimense i při libovolných separabilních prostorech. Je tedy nasnadě pokus, odvoditi některé věty teorie dimense tak, že naznačená vlastnost se zvolí za definici. V tomto článku ukazují, jak lze tímto způsobem odvoditi t. zv. *součtovou větu*.¹⁵⁾ Tento důkaz nejen je spíše jednodušší než dosavadní, ale má tu přednost, že platí v každém normálním¹⁶⁾ prostoru.

Zvolená definice má dvě nevýhody. Předně není zřejmé, že dimense části nemůže převýšiti dimensi celku; ukáží však, že aspoň u dokonale normálních prostorů věta o dimensi části je důsledkem součtové věty. Druhá nevýhoda je podstatnější: Zvoleným způ-

⁶⁾ Systematický výklad této teorie podává Menger ve své knize *Dimensionstheorie* (1928). V. též posmrtně uveřejněné pojednání Urysohnovo ve *Fund. Math.*, sv. 7 (1925), str. 30—137 a sv. 8 (1926), str. 225—351. Pro prvou informaci dobře poslouží článek V. Jarníka v *Časopise*, roč. 58 (1929), str. 367.

⁷⁾ Prostor R je separabilní, když je metrický (v. odst. 5) a když z každého systému v R otevřených množství pokrývajících R (v. odst. 1) lze vybrati nejvýš spočetný systém pokrývajících R .

⁸⁾ Prostor R je kompaktní, když je metrický a když z každého systému v R otevřených množství pokrývajících R lze vybrati konečný systém pokrývajících R .

⁹⁾ Prostor R je polokompaktní, když je metrický a když je součtem nejvýš spočetného systému kompaktních částí.

¹⁰⁾ Na př. u problémů studovaných v kap. 4. Mengerovy knihy.

¹¹⁾ Rozpr. II. tř. čes. Akad., roč. 42 (1932), č. 13. V. též *Comptes Rendus Paris*, sv. 193 (1931), str. 976—977.

¹²⁾ V. odst. 25.

¹³⁾ V. odst. 26.

¹⁴⁾ *Fund. Math.*, sv. 8, str. 301.

¹⁵⁾ V. odst. 23 a 24.

¹⁶⁾ V. odst. 9.

sobem lze definovat pouze dimenzi prostoru jako celku, nikoli dimenzi prostoru v jednotlivých jeho bodech nebo částech. V souvislosti s tím je moje domněnka, že u dokonale normálních prostorů zde zvolená definice dimenze jest ekvivalentní s tou, kterou jsem zvolil ve článku citovaném v pozn. ¹¹). Důkaz této domněnky znamená by podle mého mínění důležitý pokrok v teorii dimenze.

Proti naznačeným nevýhodám stojí dvě výhody. Předně zvolená definice je nejvhodnější k důkazu fakta, že euklidovský prostor a jeho elementární části mají ve smyslu obecné teorie tu dimenzi, která se jim odedávna přisuzuje.¹⁷) Za druhé existují důležité věty, k jejichž odvození je třeba pouze té vlastnosti dimenze, která zde byla zvolena za definici. Tak tomu je na př. s větou, kterou odvodil P. Alexandroff: *Kompaktní prostor dimenze n dá se libovolně malou spojitou deformací převést v polyedr dimenze n , nikoli však v polyedr dimenze $< n$.*¹⁸)

Připomínám ještě, že k úplnému porozumění textu není třeba žádných matematických znalostí; stačí si přečísti několik prvních odstavců (1—6) mého článku *Množství ireducibilně souvislá mezi n body*.¹⁹) Že bylo možné zvoliti tak elementární formu výkladu, není náhodné. Vskutku moderní topologie při své pronikavé analýze prostoru nikterak nečerpá z jemně rozvětvené zásoby poznatků klasické matematiky, nýbrž zdolává s úspěchem svoje problémy zbraní zcela prostou, totiž elementárními pravidly logického myšlení, aplikovanými přímo na jednoduché pojmy z názoru získané a axiomaticky precisované. Necht' tento skromný článek přispěje poněkud k tomu, aby tato krásná disciplína matematická i u nás se těšila takové oblibě, jakou svými vnitřními půvaby i svým významem v celku matematických věd zaslouhuje!

1. Necht' A je část topologického prostoru²⁰) R . Necht' $\mathcal{S}$ je systém částí prostoru R . Pravíme, že $\mathcal{S}$ pokrývá A , když každý bod $a \in A$ ²¹) je částí některého $S \in \mathcal{S}$.

2. Necht' $n = -1, 0, 1, 2, \dots$. Necht' $\mathcal{S}$ je systém částí prostoru R . Pravíme, že $\mathcal{S}$ má řád $\leq n$, když žádný bod $a \in R$ není obsažen ve více než $n+1$ elementech systému $\mathcal{S}$. Pravíme, že $\mathcal{S}$ má řád n , když 1° $\mathcal{S}$ má řád $\leq n$, 2° buďto $n = -1$ nebo $\mathcal{S}$ nemá řád $\leq n-1$.

¹⁷) Čtenář začátečník snad bude postrádati důkaz tohoto fakta; v jiném článku, který v brzké době vyjde v tomto časopise, budu míti příležitost takový důkaz uvést.

¹⁸) Annals of Math., sv. 30 (1929), str. 120 (Überführungssatz). Jednoduchý důkaz vyjde ve článku C. Kuratowského *Sur un théorème fondamental* etc. ve sv. 20 Fund. Math.

¹⁹) Časopis, roč. 61 (1932), str. 109. Citováno zkratkou M.

²⁰) M, I.

²¹) $a \in A$ znamená, že a jest element množství A .

3. Necht $n = -1, 0, 1, 2, \dots$. Necht R je topologický prostor. Pravíme, že *dimense* prostoru R je $\leq n$ a píšeme $\dim R \leq n$, když každému konečnému²²⁾ systému $\mathcal{U}$ v R otevřených²⁰⁾ množství pokrývajícimu R lze přiřaditi konečný systém $\mathcal{B}$ v R otevřených množství takový, že 1° $\mathcal{B}$ pokrývá R ; 2° každé $V \in \mathcal{B}$ je částí některého $U \in \mathcal{U}$; 3° $\mathcal{B}$ má řád $\leq n$. Pravíme, že R má *dimensi* n a píšeme $\dim R = n$, když 1° $\dim R \leq n$; 2° buďto $n = -1$ nebo není $\dim R \leq n - 1$.

Zřejmě $\dim R = -1$, když a jen když $R = \emptyset$.²³⁾

Podle M, 1,2 dimense jednobodového prostoru rovná se 0.

Zřejmě $\dim R = n$ implikuje, že $\dim R^* = n$ pro každý prostor R^* homeomorfní²⁴⁾ s R .

4. Necht R je topologický prostor. Necht $S \subset R$.²⁵⁾ Necht S jest uzavřená v R . Necht $\dim R \leq n$. Pak $\dim S \leq n$.²⁶⁾

Důkaz. Necht $\mathcal{U}'$ je konečný systém v S otevřených množství; necht $\mathcal{U}'$ pokrývá S . Máme ukázati, že existuje konečný systém $\mathcal{B}'$ v S otevřených množství takový, že 1° $\mathcal{B}'$ pokrývá S ; 2° každé $V' \in \mathcal{B}'$ je částí některého $U' \in \mathcal{U}'$; 3° $\mathcal{B}'$ má řád $\leq n$. Podle definice množství v S otevřených²⁷⁾ lze každému $U' \in \mathcal{U}'$ přiřaditi v R otevřené U tak, že $U' = S \cap U$.²⁸⁾ K množstvím U takto určeným připojme ještě v R otevřené²⁰⁾ množství $R - A$.²⁹⁾ Tím vznikne konečný systém $\mathcal{U}$ v R otevřených množství; zřejmě $\mathcal{U}$ pokrývá R . Ježto $\dim R \leq n$, existuje konečný systém $\mathcal{B}$ v R otevřených množství takový, že 4° $\mathcal{B}$ pokrývá R ; 5° každé $V \in \mathcal{B}$ je částí některého $U \in \mathcal{U}$; 6° $\mathcal{B}$ má řád $\leq n$. Každému $V \in \mathcal{B}$ přiřadíme $V' = S \cap V$. Tato V' tvoří systém $\mathcal{B}'$. Zřejmě $\mathcal{B}'$ je konečný systém v S otevřených množství. Z vlastností 4°, 5°, 6° systému $\mathcal{B}$ následují vlastnosti 1°, 2°, 3° systému $\mathcal{B}'$.

5. Množství R (složené z jakýchkoli prvků) nazveme *metrický prostor* (a jeho prvky nazveme *bodý*), když každému páru a, b bodů z R bylo přiřazeno reálné číslo $\varrho(a, b)$ (*vzdálenost* bodů a, b v prostoru R). Při tom musí býti splněny následující tři axiomy:

5,1. Když $a \in R$, pak $\varrho(a, a) = 0$.

5,2. Když $a \in R, b \in R, \varrho(a, b) = 0$, pak $a = b$.

5,3. Když $a \in R, b \in R, c \in R$, pak $\varrho(a, b) + \varrho(c, b) \geq \varrho(a, c)$.

²²⁾ To znamená, že počet elementů je konečný.

²³⁾ M, 2).

²⁴⁾ M, 3.

²⁵⁾ M, 6).

²⁶⁾ S je topologický prostor podle M, 5.

²⁷⁾ M, 5.

²⁸⁾ M, 5).

²⁹⁾ M, 7).

Platí pak následující věty 5,4 a 5,5.³⁰⁾

5.4. Když $a \in R$, $b \in R$, $a \neq b$, pak $\varrho(a, b) > 0$. Důkaz. Podle 5,3 jest $2\varrho(a, b) \geq \varrho(a, a)$, tedy $\varrho(a, b) \geq 0$ podle 5,1, tedy $\varrho(a, b) > 0$ podle 5,2.

5.5. Když $a \in R$, $b \in R$, pak $\varrho(a, b) = \varrho(b, a)$. Důkaz. Podle 5,3 jest $\varrho(a, a) + \varrho(b, a) \geq \varrho(a, b)$, tedy $\varrho(b, a) \geq \varrho(a, b)$ podle 5,1; a stejně se odvodí, že $\varrho(a, b) \geq \varrho(b, a)$.

6. Necht R je metrický prostor. Pak definujeme: Množství $A \subset R$ nazývá se v R *otevřené*, když každému $a \in A$ lze přiřaditi kladné číslo η tak, že $x \in R$, $\varrho(a, x) < \eta$ implikuje $x \in A$. Snadno se nahlédne, že v důsledku této definice platí věty M. 1,5—1,8, t. j. *metrický prostor je (na základě naší definice otevřených množství) topologickým prostorem*.

7. Necht R je metrický prostor. Necht $A \subset R$; necht $A \neq \emptyset$. Necht $r > 0$. Nazveme *kouli o středu A a poloměru r* a označme $K(A, r)$ množství těch $x \in R$, pro něž $\varrho(a, x) < r$ při vhodném $a \in A$. Když $A = \{a\}$ je jednobodové množství, píšeme $K(A, r) = K(a, r)$.³¹⁾

8. Necht R je metrický prostor. Necht $A \subset R$; necht $A \neq \emptyset$. Necht $r > 0$. Pak množství $K(A, r)$ je v R *otevřené*.

Důkaz. Máme ukázati, že každému $x \in K(A, r)$ lze přiřaditi $\eta > 0$ tak, že $y \in R$, $\varrho(x, y) < \eta$ implikuje $y \in K(A, r)$. Necht tedy $x \in K(A, r)$. Pak existuje bod $a \in A$ takový, že $\vartheta = \varrho(a, x) < r$. Tedy číslo $\eta = r - \vartheta$ je kladné. Necht $y \in R$, $\varrho(x, y) < \eta$. Podle 5,5 jest $\varrho(y, x) < \eta$. Podle 5,3 jest $\varrho(a, y) \leq \varrho(a, x) + \varrho(y, x) < \vartheta + \eta = r$. Tedy $\varrho(a, y) < r$, takže $y \in K(A, r)$.

9. Topologický prostor R nazývá se *normální*,³²⁾ když má následující vlastnost: Je-li A, B pár v R uzavřených množství a je-li $A \cdot B = \emptyset$, existují v R *otevřené* množství U, V taková, že $A \subset U$, $B \subset V$, $U \cdot V = \emptyset$.

10. Necht R je normální prostor. Necht $A \subset U \subset R$. Necht A je v R uzavřené; necht U je v R otevřené. Pak existuje v R *otevřené* V takové, že $A \subset V \subset \bar{V} \subset U$.³³⁾

Důkaz. Množství $A, R - U$ jsou v R uzavřené a jest $A(R - U) = \emptyset$. Ježto R je normální, existují v R *otevřené* V, W taková, že $A \subset V$, $R - U \subset W$, $VW = \emptyset$. Ježto $VW = \emptyset$, jest

³⁰⁾ Vlastnosti 5,4 a 5,5 berou se obvykle do definice metrického prostoru. Jejich odvození z vlastností 5,1, 5,2 a 5,3 podal A. Lindenbaum ve Fund. Math., sv. 8 (1926), str. 211.

³¹⁾ Množstvím $K(A, r)$ nemusí býti ani A ani r jednoznačně určeno. Příklad: Necht prostor R obsahuje pouze dva body a, b a necht $\varrho(a, b) = 1$. Pak $K(a, 2) = K(b, 3)$.

³²⁾ Tento pojem vyskytuje se po prvé u H. Tietze [Math. Ann., sv. 88 (1923), str. 301]; název *normální* u P. Urysohna [Math. Ann., sv. 94 (1925), str. 265].

³³⁾ M, 4.

$V \subset R - W$; ježto $R - W$ je v R uzavřené, jest³³⁾ $\bar{V} \subset R - W$, t. j. $\bar{V}W = 0$. Ježto $R - U \subset W$, jest $\bar{V}(R - U) = 0$, t. j. $\bar{V} \subset U$.

11. *Nechť topologický prostor R má následující vlastnost: Je-li $A \subset U \subset R$, je-li A v R uzavřené, je-li U v R otevřené, pak existuje v R otevřené V takové, že $A \subset V \subset \bar{V} \subset U$. Pak R je normální prostor.*

Důkaz. Nechť $A \subset R$, $B \subset R$. Nechť A, B jsou v R uzavřené. Nechť $AB = 0$. Máme dokázati, že existují v R otevřené V, W takové, že $A \subset V$, $B \subset W$, $VW = 0$. Položme $U = R - B$. Ježto B jest v R uzavřené, jest U v R otevřené. Ježto $AB = 0$, jest $A \subset U$. Tedy existuje v R otevřené V takové, že $A \subset V \subset \bar{V} \subset U$. Položme $W = R - \bar{V}$. Ježto $\bar{V}$ je v R uzavřené,³³⁾ jest W v R otevřené. Ježto $V \subset \bar{V}$, jest $VW = 0$. Ježto $U = R - B$, $\bar{V} \subset U$, jest $\bar{V}B = 0$, tedy $B \subset R - \bar{V}$, t. j. $B \subset W$.

12. *Nechť R je normální prostor. Nechť $F_1, F_2, \dots, F_m$ jsou v R uzavřená množství v konečném počtu. Pak lze každému F_i ($1 \leq i \leq m$) přiřaditi v R otevřené $U_i \supset F_i$ tak, že, když při nějaké kombinaci $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ ($1 \leq k \leq m$) indexů $1, 2, \dots, m$ jest*

$$\prod_{r=1}^k \bar{U}_{i_r} \neq 0, \text{ je také } \prod_{r=1}^k F_{i_r} \neq 0.^{34)}$$

Důkaz. Nechť $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_{2^m-1}$ jsou všechny součiny tvaru $\prod_{r=1}^k F_{i_r}$,

kde $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ probíhá všechny kombinace indexů $1, 2, \dots, m$.³⁵⁾ Nechť $S = \Sigma \Phi_j$, kde j probíhá všechny ty hodnoty ($1 \leq j \leq 2^m - 1$), pro něž $F_1 \cdot \Phi_j = 0$. Množství S je stejně jako F_1 uzavřené v R ³⁶⁾ a jest $F_1 \cdot S = 0$. Ježto R je normální, existují v R otevřená množství U_1, V_1 taková, že $F_1 \subset U_1, S \subset V_1, U_1 V_1 = 0$. Jest $U_1 \subset R - V_1$; ježto $R - V_1$ je v R uzavřené, jest³³⁾ $\bar{U}_1 \subset R - V_1$, t. j. $\bar{U}_1 V_1 = 0$, tedy $\bar{U}_1 S = 0$, takže $\bar{U}_1 \cdot \Phi_j \neq 0$ ($1 \leq j \leq 2^m - 1$) implikuje $F_1 \cdot \Phi_j \neq 0$. Tím jsme ze systému $F_1, F_2, \dots, F_m$ obdrželi *prvou modifikací* systém $\bar{U}_1, F_2, \dots, F_m$, z něhož stejným postupem (vycházejíce od F_2 místo od F_1) dostaneme *druhou modifikaci* systém $\bar{U}_1, \bar{U}_2, F_3, \dots, F_m$. Po m takových modifikacích dospějeme k žádanému systému $\bar{U}_1, \bar{U}_2, \dots, \bar{U}_m$.

³⁴⁾ W. Hurewicz a K. Menger, Math. Ann., sv. 100 (1928), pozn. ²²⁾.

³⁵⁾ Počet všech kombinací indexů $1, 2, \dots, m$ jest $\binom{m}{1} + \binom{m}{2} + \dots + \binom{m}{m} = 2^m - 1$. Ostatně pro náš účel je podstatné pouze, že tento počet je konečný.

³⁶⁾ M, 1,3.

13. Je zřejmé, že věta odst. 12 ani ve zvláštním případě $m = 2$ nemůže platiti, není-li prostor R normální.

14. *Nechť R je normální prostor. Necht množství $U_1, U_2, \dots, U_m$ v konečném počtu jsou v R otevřená a pokrývají R . Pak lze každému U_i ($1 \leq i \leq m$) přiřaditi v R otevřené V_i tak, že $1^0 \bar{V}_i \subset U_i$ pro $1 \leq i \leq m$; 2^0 množství $V_1, V_2, \dots, V_m$ pokrývají R .³⁷⁾*

Důkaz.³⁸⁾ Položme $F_i = R - U_i$ ($1 \leq i \leq m$). Pak množství F_i jsou uzavřená v R a jest $\prod_{i=1}^m F_i = R - \sum_{i=1}^m U_i = 0$.³⁹⁾ Podle

odst. 12 existují v R otevřená $W_i \supset F_i$ taková, že $\prod_{i=1}^m \bar{W}_i = 0$.

Položme $V_i = R - \bar{W}_i$, takže $V_i \subset R - W_i$. Ježto $R - W_i$ jest v R uzavřené, jest $\bar{V}_i \subset R - W_i$, tedy $\bar{V}_i \cdot W_i = 0$; ježto $W_i \supset F_i$, jest $\bar{V}_i F_i = 0$, tedy $\bar{V}_i \subset R - F_i$, t. j. $\bar{V}_i \subset U_i$. Mimoto $\sum_{i=1}^m V_i =$

$$= \sum_{i=1}^m (R - \bar{W}_i) = R - \prod_{i=1}^m \bar{W}_i = R - 0 = R.$$

15. Také věta odst. 14 platí jen za předpokladu, že R je normální prostor. Dokonce platí věta: *Nechť topologický prostor R má následující vlastnost: Každému konečnému systému $\mathfrak{U}$ v R otevřených množství pokrývajících R lze přiřaditi konečný systém $\mathfrak{F}$ v R uzavřených množství tak, že $1^0 \mathfrak{F}$ pokrývá R ; 2^0 každé $F \in \mathfrak{F}$ je částí některého $U \in \mathfrak{U}$. Pak R je normální prostor.*

Důkaz. Necht $A \subset U \subset R$. Necht A je v R uzavřené; necht U je v R otevřené. Podle 11 stačí ukázati, že existuje v R otevřené V takové, že $A \subset V \subset \bar{V} \subset U$. Dvě množství U a $R - A$ tvoří zřejmě konečný systém $\mathfrak{U}$ v R otevřených množství pokrývajících R . Tedy existuje konečný systém $\mathfrak{F}$ v R uzavřených množství pokrývajících R a takový, že pro každé $F \in \mathfrak{F}$ relace $AF \neq 0$ implikuje $F \subset U$. Necht $F'_1, F'_2, \dots, F'_h$ jsou ty elementy $F \in \mathfrak{F}$, pro něž $AF = 0$; necht $F''_1, F''_2, \dots, F''_k$ jsou ty elementy $F \in \mathfrak{F}$, pro něž $AF \neq 0$, tedy $F \subset U$. Položme $\Phi' = \sum_{i=1}^h F'_i$, $\Phi'' = \sum_{j=1}^k F''_j$. Množství Φ' a Φ'' jsou v R uzavřená, jest $A\Phi' = 0$, $\Phi'' \subset U$ a $\Phi' + \Phi'' = R$, neboť $\mathfrak{F}$ pokrývá R . Položme $V = R - \Phi'$, takže V je v R otevřené. Ježto $A\Phi' = 0$, jest $A \subset V$. Ježto $\Phi' + \Phi'' = R$, jest $V \subset \Phi''$. Ježto Φ'' je v R uzavřené, je $\bar{V} \subset \Phi''$. Avšak $\Phi'' \subset U$. Tedy $A \subset V \subset \bar{V} \subset U$.

³⁷⁾ K. Menger, *Dimensionstheorie*, str. 159—160 (Bemerkung).

³⁸⁾ Podle rukopisu Kuratowského *Topologie*. (Vyjde ve sbírce *Monografie Matematyczne* jako sv. 3.)

³⁹⁾ M, 4)

16. *Nechť R je metrický prostor. Pak R je normální prostor.*

Důkaz. Necht' A, B jsou v R uzavřená množství; necht' $AB = 0$. Máme ukázati, že existují v R otevřená U, V taková, že $A \subset U, B \subset V, UV = 0$. Ježto množství $R - B$ je v R otevřené a ježto $A \subset R - B$, podle 6 lze každému $a \in A$ přiřaditi $\eta_a > 0$ tak, že $K(a, 2\eta_a) \subset R - B$ (v. 7). Podobně každému $b \in B$ lze přiřaditi $\zeta_b > 0$ tak, že $K(b, 2\zeta_b) \subset R - A$. Položme

$$U = \sum_{a \in A} K(a, \eta_a); \quad V = \sum_{b \in B} K(b, \zeta_b).$$

Podle 5.1 jest $a \in K(a, \eta_a)$, tedy $A \subset U$; podobně $B \subset V$. Podle 8 a M, 1.8 množství U, V jsou otevřená v R . Zbývá ukázati, že $UV = 0$. Dokazujeme nepřímou předpokládejme, že $c \in UV$. Pak existují body $a \in A, b \in B$ takové, že $c \in K(a, \eta_a), c \in K(b, \zeta_b)$, t. j. $\varrho(a, c) < \eta_a, \varrho(b, c) < \zeta_b$. Pro určitost necht' $\eta_a \geq \zeta_b$. Podle 5.3 jest $\varrho(a, b) \leq \varrho(a, c) + \varrho(b, c) < \eta_a + \zeta_b \leq 2\eta_a$, t. j. $b \in K(a, 2\eta_a)$, což je spor, neboť $b \in B, K(a, 2\eta_a) \subset R - B$.

17. *Nechť R je topologický prostor. Necht' $A \subset R$. Pravíme, že A je F_σ v R (G_δ v R), když existují v R uzavřená (v R otevřená) A_ν*

taková, že $A = \sum_{\nu=1}^{\infty} A_\nu$ ($A = \prod_{\nu=1}^{\infty} A_\nu$).

A je G_δ v R (F_σ v R), když a jen když $R - A$ je F_σ v R (G_δ v R).

Vskutku $A = \prod_{\nu=1}^{\infty} A_\nu$ znamená totéž jako $R - A = \sum_{\nu=1}^{\infty} (R - A_\nu)$.

Je-li A otevřené v R (uzavřené v R), pak A je G_δ v R (F_σ v R).

Vskutku, když $A_\nu = A$ ($\nu = 1, 2, 3, \dots$), jest $\prod_{\nu=1}^{\infty} A_\nu = \sum_{\nu=1}^{\infty} A_\nu = A$.

18. *Nechť R je normální prostor. Necht' $A \subset R, B \subset R$. Necht' A, B jsou F_σ v R . Necht' $A \cdot \bar{B} = \bar{A} \cdot B = 0$. Pak existují v R otevřená U, V taková, že $A \subset U, B \subset V, UV = 0$.⁴⁰⁾*

Důkaz. Ježto A, B jsou F_σ v R , existují v R uzavřená A_ν, B_ν taková, že $A = \sum_{\nu=1}^{\infty} A_\nu, B = \sum_{\nu=1}^{\infty} B_\nu$, tedy $A_\nu \subset A, B_\nu \subset B$. Ježto $AB \subset A\bar{B} = 0$, jest $A_\nu B_\nu = 0$. Ježto A_ν, B_ν jsou uzavřená v normálním R a ježto $A_\nu B_\nu = 0$, existují v R otevřená G_ν, H_ν taková, že $A_\nu \subset G_\nu, B_\nu \subset H_\nu, G_\nu H_\nu = 0$. Ježto $A_\nu \subset A, A\bar{B} = 0$, jest $A_\nu \bar{B} = 0$; podobně $B_\nu \bar{A} = 0$. Tedy $A_\nu \subset G_\nu - \bar{B}, B_\nu \subset H_\nu - \bar{A}$. Množství $G_\nu - \bar{B} = G_\nu \cdot (R - \bar{B})$ je podle M, 1.7 v R otevřené; ježto $A_\nu \subset G_\nu - \bar{B}$, podle 10 existuje v R otevřené P_ν takové, že

⁴⁰⁾ Věty 18, 19 a 27 pocházejí od Urysohna; l. c. sub ³²⁾, str. 285—288.

$A_\nu \subset P_\nu \subset \bar{P}_\nu \subset G_\nu - \bar{B}$. Podobně existuje v R otevřená Q_ν taková, že $B_\nu \subset Q_\nu \subset \bar{Q}_\nu \subset H_\nu - \bar{A}$. Položme

$$U_1 = P_1, V_1 = Q_1 - \bar{P}_1; U_\nu = P_\nu - \sum_{\mu=1}^{\nu-1} \bar{Q}_\mu, \\ V_\nu = Q_\nu - \sum_{\mu=1}^{\nu} \bar{P}_\mu \quad (\nu = 2, 3, \dots); U = \sum_{\nu=1}^{\infty} U_\nu, V = \sum_{\nu=1}^{\infty} V_\nu.$$

Ježto P_ν, Q_ν jsou otevřená v R , podle M, 1,3 a M, 1,7 také U_ν, V_ν jsou otevřená v R ; tedy podle M, 1,8 také U, V jsou otevřená v R . Ježto $\bar{Q}_\mu \subset H_\mu - \bar{A} \subset R - \bar{A}$, $A_\nu \subset P_\nu$, $A_\nu \subset A \subset \bar{A}$, jest $A_\nu \subset U_\nu$; podobně $B_\nu \subset V_\nu$. Tedy $A = \sum_{\nu=1}^{\infty} A_\nu \subset U$ a podobně $B \subset V$. Zbývá ukázati, že $UV = 0$, t. j., že pro $\mu, \nu = 1, 2, 3, \dots$ jest $U_\mu V_\nu = 0$. Necht' předně $\mu \leq \nu$. Pak $U_\mu \subset P_\mu$, $V_\nu = Q_\nu - \sum_{\mu=1}^{\nu} \bar{P}_\mu \subset R - \bar{P}_\mu \subset R - P_\mu$, tedy $U_\mu V_\nu = 0$. Necht' za druhé $\mu > \nu$. Pak $V_\nu \subset Q_\nu$, $U_\mu = P_\mu - \sum_{\nu=1}^{\mu-1} \bar{Q}_\nu \subset R - \bar{Q}_\nu \subset R - Q_\nu$, tedy $U_\mu V_\nu = 0$.

19. Necht' R je normální prostor. Necht' $S \subset R$. Necht' S je F_σ v R . Pak S je normální prostor.⁴⁰⁾

Důkaz. Ježto S je F_σ v R , existují v R uzavřená S_ν taková, že $S = \sum_{\nu=1}^{\infty} S_\nu$. Necht' A, B jsou uzavřená v S ; necht' $AB = 0$. Máme ukázati, že existují v S otevřená U_0, V_0 taková, že $A \subset U_0, B \subset V_0, U_0 V_0 = 0$. Ježto A jest uzavřená v S , podle M, 6 jest $A = \bar{A}S$. Ježto $S = \sum_{\nu=1}^{\infty} S_\nu$, je $A = \sum_{\nu=1}^{\infty} \bar{A}S_\nu$. Ježto S_ν jsou uzavřená v R , podle M, 1,4 jsou $\bar{A}S_\nu$ uzavřená v R . Tedy A je F_σ v R ; podobně B jest F_σ v R . Ježto $A = \bar{A}S, AB = 0, B \subset S$, jest $\bar{A}B = 0$; podobně $A\bar{B} = 0$. Tedy podle 18 existují v R otevřená U, V taková, že $A \subset U, B \subset V, UV = 0$. Položme $U_0 = US, V_0 = VS$, takže U_0, V_0 jsou²⁷⁾ otevřená v S a $U_0 V_0 = 0$. Ježto $A \subset S, B \subset S$, jest $A \subset U_0, B \subset V_0$.

20. Necht' R je normální prostor. Necht' $\dim R \leq n$. Necht' množství $U_1, U_2, \dots, U_m$ v konečném počtu jsou v R otevřená a pokrývají R . Pak lze každému U_i ($1 \leq i \leq m$) přiřaditi v R otevřenou V_i tak, že 1° $\bar{V}_i \subset U_i$ pro $1 \leq i \leq m$; 2° množství $V_1, V_2, \dots, V_m$ pokrývají R ; 3° systém množství $\bar{V}_1, \bar{V}_2, \dots, \bar{V}_m$ má řád $\leq n$.

Důkaz. Podle 3 existuje konečný systém $\mathfrak{B}$ v R otevřených množství takový, že 1° $\mathfrak{B}$ pokrývá R ; 2° každé $W \in \mathfrak{B}$ je částí

některého U_i ($1 \leq i \leq m$); 3^o systém $\mathfrak{B}$ má řád $\leq n$. Necht $W_1, W_2, \dots, W_k$ jsou elementy systému $\mathfrak{B}$. Každému indexu j ($1 \leq j \leq k$) přiřadíme index $\varphi(j) = i$ ($1 \leq i \leq m$) tak, aby $W_j \subset U_i$. Pro $1 \leq i \leq m$ položme $Z_i = \sum_j W_j$, kde j probíhá ty hodnoty ($1 \leq j \leq k$), pro něž $\varphi(j) = i$. Zřejmě množství $Z_1, Z_2, \dots, Z_m$ jsou v R otevřená, tvoří systém řádu $\leq n$, pokrývají R a jest $Z_i \subset U_i$ pro $1 \leq i \leq m$. Podle 14 určíme v R otevřená V_i ($1 \leq i \leq m$) pokrývající R a taková, že $\bar{V}_i \subset Z_i$ pro $1 \leq i \leq m$. Zřejmě množství $V_1, V_2, \dots, V_m$ mají žádané vlastnosti.

21. Necht $n = -1, 0, 1, 2, \dots$. Necht topologický prostor R má následující vlastnost: Každému konečnému systému $\mathfrak{U}$ v R otevřených množství pokrývajících R lze přiřaditi konečný systém $\mathfrak{F}$ v R uzavřených množství tak, že 1^o $\mathfrak{F}$ pokrývá R ; 2^o každé $F \in \mathfrak{F}$ je částí některého $U \in \mathfrak{U}$; 3^o $\mathfrak{F}$ má řád $\leq n$. Pak R je normální prostor a $\dim R \leq n$.

Důkaz. R je normální prostor podle 15. Zbývá ukázati, že každému $\mathfrak{U}$ lze přiřaditi konečný systém $\mathfrak{B}$ v R otevřených množství tak, že 1^o $\mathfrak{B}$ pokrývá R ; 2^o každé $V \in \mathfrak{B}$ je částí některého $U \in \mathfrak{U}$; 3^o $\mathfrak{B}$ má řád $\leq n$. Danému $\mathfrak{U}$ lze podle předpokladu přiřaditi $\mathfrak{F}$. Necht $F_1, F_2, \dots, F_m$ jsou všechny elementy systému $\mathfrak{F}$. Každému F_i ($1 \leq i \leq m$) můžeme přiřaditi $U_i \in \mathfrak{U}$ tak, že $F_i \subset U_i$. Podle 12 lze každému F_i ($1 \leq i \leq m$) přiřaditi v R otevřené $W_i \supset F_i$ tak, že

$$\prod_{r=1}^k \bar{W}_{i_r} \neq 0 \text{ implikuje } \prod_{r=1}^k F_{i_r} \neq 0 \text{ pro každou kombinaci } (i_1, i_2, \dots, i_k)$$

($1 \leq k \leq m$) indexů $1, 2, \dots, m$. Lehko vidíme, že množství $V_i = U_i W_i$ tvoří žádaný systém $\mathfrak{B}$.

22. Necht R je normální prostor. Necht $A \subset R$; necht A jest uzavřené v R . Necht $\dim A \leq n$. Necht množství $U_1, U_2, \dots, U_m$ v konečném počtu jsou v R otevřená a pokrývají A . Pak lze každému U_i ($1 \leq i \leq m$) přiřaditi v R otevřené V_i tak, že 1^o $\bar{V}_i \subset U_i$; 2^o množství $V_1, V_2, \dots, V_m$ pokrývají A ; 3^o systém množství $\bar{V}_1, \bar{V}_2, \dots, \bar{V}_m$ má řád $\leq n$.

Důkaz. Necht $U'_i = AU_i$ ($1 \leq i \leq m$). Množství $U'_1, U'_2, \dots, U'_m$ jsou v A otevřená a pokrývají A . Podle 19 A jest normální prostor. Ježto $\dim A \leq n$, podle 20 lze každému U'_i ($1 \leq i \leq m$) přiřaditi v A uzavřené F_i tak, že 1^o $F_i \subset U'_i$ pro $1 \leq i \leq m$; 2^o množství $F_1, F_2, \dots, F_m$ pokrývají A ; 3^o systém $F_1, F_2, \dots, F_m$ má řád $\leq n$. Ježto F_i jsou uzavřené v A a ježto A jest uzavřené v R , jsou²⁷⁾ F_i uzavřené v R . Ježto $F_i \subset U'_i \subset U_i$, podle 10 existují v R otevřená Z_i taková, že $F_i \subset Z_i \subset \bar{Z}_i \subset U_i$. Ježto systém $F_1, F_2, \dots, F_m$ má řád $\leq n$, podle 12 existují v R otevřená W_i ($1 \leq i \leq m$) taková, že 1^o $F_i \subset W_i$, 2^o systém $\bar{W}_1, \bar{W}_2, \dots, \bar{W}_m$ má řád $\leq n$.

Zřejmě množství $V_i = Z_i W_i$ ($1 \leq i \leq m$) mají žádané vlastnosti.

23. Necht R je normální prostor. Necht $R = \sum_{v=1}^{\infty} A_v$. Necht pro $v = 1, 2, 3, \dots$ množství A_v jest uzavřené v R a má dimenzi $\leq n$. Pak $\dim R \leq n$.

Důkaz. Necht U_i ($1 \leq i \leq m$) jsou v R otevřená množství pokrývající R . Stačí sestrojiti v R otevřená V_i ($1 \leq i \leq m$) taková, že 1° systém $V_1, V_2, \dots, V_m$ pokrývá R a má řád $\leq n$, $2^\circ V_i \subset U_i$.

Podle 22 existuje systém $\mathfrak{B}^1$ v R otevřených V_i^1 ($1 \leq i \leq m$) takový, že $1^\circ \bar{V}_i^1 \subset U_i$; $2^\circ \mathfrak{B}^1$ pokrývá A_1 ; 3° systém $\mathfrak{B}^1$ množství $\bar{V}_i^1$ (41) má řád $\leq n$. Obecněji předpokládejme, že při určitém r ($= 1, 2, \dots$) byl již sestrojen systém $\mathfrak{B}^r$ v R otevřených V_i^r ($1 \leq i \leq m$) takový, že $1^\circ \mathfrak{B}^r$ pokrývá $\sum_{\lambda=1}^r \bar{A}_\lambda$; $2^\circ \bar{V}_i^r \subset U_i$; $3^\circ \mathfrak{B}^r$ má řád $\leq n$. Ukažme, že lze pak sestrojiti obdobný systém $\mathfrak{B}^{r+1}$.

Ježto $\mathfrak{B}^r$ je konečný systém řádu $\leq n$ v R uzavřených množství, podle 12 existují v R otevřená S_i ($1 \leq i \leq m$) taková, že $1^\circ \bar{V}_i^r \subset S_i$; 2° systém $S_1, S_2, \dots, S_m$ má řád $\leq n$. Ježto $\bar{V}_i^r \subset U_i$, podle 10 existují v R otevřená T_i taková, že $\bar{V}_i^r \subset T_i \subset \bar{T}_i \subset U_i$. Položme $W_i = S_i T_i$. Systém $\mathfrak{B}$ množství $W_1, W_2, \dots, W_m$ je konečný systém řádu $\leq n$ v R otevřených množství a jest $\bar{V}_i^r \subset W_i \subset \bar{W}_i \subset U_i$. Podle 10 existují v R otevřená P_i ($1 \leq i \leq m$) taková, že $\bar{V}_i^r \subset P_i \subset \bar{P}_i \subset W_i$.

Pro $1 \leq i \leq m$ necht: $1^\circ \mathfrak{M}_i$ znamená systém dvou množství P_i a $R - \bar{V}_i^r$; $2^\circ \mathfrak{N}_i$ znamená systém dvou množství W_i a $R - \bar{P}_i$. Zřejmě každým z $2m$ systémů $\mathfrak{M}_i$ a $\mathfrak{N}_i$ pokrývá R . Označme $\mathfrak{S}$ systém $m \cdot 4^m$ v R otevřených množství tvaru $U_i \prod_{j=1}^m M_j \prod_{k=1}^m N_k$

($1 \leq i, j, k \leq m$; $M_j \in \mathfrak{M}_j$; $N_k \in \mathfrak{N}_k$). Pak $\mathfrak{S}$ je konečný R pokrývající systém v R otevřených množství. Ježto A_{r+1} jest uzavřené v R a ježto $\dim A_{r+1} \leq n$, podle 22 existuje konečný systém $\mathfrak{Z}$ v R otevřených množství Z_r ($1 \leq r \leq t = m \cdot 4^m$) takový, že 1° každé $\bar{Z}_r$ je částí některého elementu systému $\mathfrak{S}$; $2^\circ \mathfrak{Z}$ pokrývá A_{r+1} ; $3^\circ \mathfrak{Z}$ má řád $\leq n$. Z vlastnosti 1° následuje podle definice systémů $\mathfrak{M}_i, \mathfrak{N}_i, \mathfrak{S}$: $4^\circ \bar{Z}_r \bar{V}_i^r \neq 0$ implikuje $\bar{Z}_r \subset P_i$; $5^\circ \bar{Z}_r \bar{P}_i \neq 0$ implikuje $\bar{Z}_r \subset W_i$.

Množství Z_r ($1 \leq r \leq t$) rozdělme ve tři druhy: Z_r je prvního druhu, když existuje i ($1 \leq i \leq m$) takové, že $\bar{Z}_r \bar{V}_i^r \neq 0$. Z_r je druhého druhu, když není prvního druhu a když existuje i ($1 \leq i \leq m$)

⁴¹⁾ Obdobný význam má v dalším symbol $\mathfrak{B}^r$.

takové, že $\bar{Z}_r \bar{P}_i \neq 0$. Z_r je *třetího* druhu, když není ani prvního ani druhého druhu.

Každé Z_r prvního druhu přiřadíme *každému* indexu i takovému, že $Z_r \bar{V}_i \neq 0$. Každé Z_r druhého druhu přiřadíme *jedinému* indexu i tak zvolenému, že $Z_r \bar{P}_i \neq 0$. Každé Z_r třetího druhu přiřadíme *jedinému* indexu i tak zvolenému, že $\bar{Z}_r \subset U_i$.⁴²⁾

Pro $1 \leq i \leq m$ položme $W'_i = V_i^v + \Sigma Z_r$, kde Z_r probíhá všechny indexy i přiřazené prvniho a druhého druhu systému $\mathfrak{Z}$. Zřejmě $V_i^v \subset W'_i$ a podle vlastnosti 5^o systému $\mathfrak{Z}$ jest $\bar{W}'_i \subset W_i$. Dále položme $V_i^{v+1} = W'_i + \Sigma Z_r$, kde Z_r probíhá všechny indexy i přiřazené prvniho a druhého druhu systému $\mathfrak{Z}$. Zřejmě V_i^{v+1} jsou v R otevřená množství a jest $V_i^v \subset V_i^{v+1} \subset \bar{V}_i^{v+1} \subset U_i$. Ježto $\mathfrak{B}^v$ pokrývá $\sum_{\lambda=1}^v A_\lambda$ a ježto $\mathfrak{Z}$ pokrývá A_{v+1} , zřejmě

systém $\mathfrak{B}^{v+1}$ množství $V_1^{v+1}, V_2^{v+1}, \dots, V_m^{v+1}$ pokrývá $\sum_{\lambda=1}^{v+1} A_\lambda$.

Ještě jest ukázati, že $\mathfrak{B}^{v+1}$ má řád $\leq n$, t. j. že každý bod $a \in R$ jest obsažen nejvýš v $n+1$ elementech systému $\mathfrak{B}^{v+1}$. Rozeznávejme dva případy. Předně nechť existuje index j ($1 \leq j \leq m$) takový, že $a \in \bar{P}_j$. Pak $a \in Z_r$ implikuje, že $Z_r \bar{P}_j \neq 0$, t. j. že Z_r není třetího druhu. Tedy $a \in V_i^{v+1}$ implikuje $a \in W'_i \subset W_i$. Tedy bod a jest obsažen nejvýš v tolika V_i^{v+1} , v kolika W_i ; ježto systém $\mathfrak{B}$ jest řádu $\leq n$, jest bod a nejvýš v $n+1$ z množství V_i^{v+1} . Za druhé nechť pro žádný index i není $a \in \bar{P}_i$. Podle vlastnosti 4^o systému $\mathfrak{Z}$ relace $a \in Z_r$ implikuje $Z_r \bar{V}_i = 0$, takže jednak bod a není v žádném V_i^v , jednak bod a není v žádném Z_r prvního druhu. Tedy $a \in W'_i$ implikuje $a \in Z_r$, kde Z_r je druhého druhu a je přiřazeno indexu i . Ježto každé Z_r druhého druhu je přiřazeno *jedinému* i , je bod a nejvýš v tolika W'_i , v kolika Z_r druhého druhu jest. Podobně a je nejvýš v tolika $V_i^{v+1} - W'_i$, v kolika Z_r třetího druhu jest. Tedy bod a jest nejvýš v tolika V_i^{v+1} , v kolika Z_r ; ježto systém $\mathfrak{Z}$ jest řádu $\leq n$, jest bod a nejvýš v $n+1$ z množství V_i^{v+1} .

Tím je dokázáno, že lze rekurentně určit systémy $\mathfrak{B}^v$ ($v = 1, 2, 3, \dots$) v R otevřených V_i^v ($1 \leq i \leq m$) tak, že: 1^o $V_i^v \subset V_i^{v+1}$; 2^o $V_i^v \subset U_i$; 3^o $\mathfrak{B}^v$ pokrývá A_v ; 4^o $\mathfrak{B}^v$ má řád $\leq n$.

Položme $V_i = \sum_{v=1}^{\infty} V_i^v$ ($1 \leq i \leq m$). Pak V_i jsou v R otevřená

množství. Podle 2^o jest $V_i \subset U_i$. Ježto $R = \sum_{v=1}^{\infty} A_v$, podle 3^o systém

⁴²⁾ To lze podle definice $\mathfrak{S}$ a podle vlastnosti 1^o systému $\mathfrak{Z}$.

$\mathfrak{B}$ množství $V_1, V_2, \dots, V_m$ pokrývá R . Zbývá ukázati, že $\mathfrak{B}$ jest řádu $\leq n$. V opačném případě by bylo lze udati $n+2$ různé indexy $i_1, i_2, \dots, i_{n+2}$ a bod $a \in R$ tak, že $a \in V_{i_s}$ ($i \leq s \leq n+2$). Podle 1^o by existoval index ν takový, že $a \in V_{i_s}^\nu$ ($1 \leq s \leq n+2$). To jest spor proti 4^o.

24. *Nechť R jest normální prostor. Nechť pro $\nu = 1, 2, 3, \dots$ množství A_ν jest F_σ v R a má dimenzi $\leq n$. Pak $\dim \sum_{\nu=1}^{\infty} A_\nu \leq n$.*

Důkaz. Nechť $S = \sum_{\nu=1}^{\infty} A_\nu$. Ježto A_ν jsou F_σ v R , existují v R uzavřená $B_{\nu\mu}$ ($\mu = 1, 2, 3, \dots$) taková, že $A_\nu = \sum_{\mu=1}^{\infty} B_{\nu\mu}$. Ježto $B_{\nu\mu} \subset A_\nu$ a ježto $B_{\nu\mu}$ jest uzavřené v R , jest $B_{\nu\mu}$ uzavřené v A_ν . Ježto $\dim A_\nu \leq n$, podle 4 jest $\dim B_{\nu\mu} \leq n$. Dvojnou posloupnost $B_{\nu\mu}$ ($\nu, \mu = 1, 2, 3, \dots$) uspořádejme⁴³⁾ v jednoduchou posloupnost B_λ ($\lambda = 1, 2, 3, \dots$). Pak jest $S = \sum_{\lambda=1}^{\infty} B_\lambda$, množství B_λ jsou uzavřená v R , tedy v S a jest $\dim B_\lambda \leq n$. S jest F_σ v R , takže S jest normální prostor podle 19. Tedy $\dim S \leq n$ podle 23.

25. *Nechť R jest topologický prostor. Pravíme, že R jest dokonale normální, když: 1^o R jest normální; 2^o každé v R otevřené množství jest F_σ v R . Podmínka 2^o dá se také takto vysloviti: každé v R uzavřené množství jest G_δ v R .*

26. *Nechť R jest metrický prostor. Pak R jest dokonale normální prostor.*

Důkaz. Podle 16 stačí ukázati, že každé v R uzavřené množství jest G_δ v R . Nechť tedy A jest v R uzavřené množství; zřejmě můžeme předpokládati $A \neq \emptyset$. Nechť (v. 7) $U_\nu = K\left(A, \frac{1}{\nu}\right)$ ($\nu = 1, 2, 3, \dots$). Množství U_ν podle 8 jsou v R otevřená, takže stačí ukázati, že $A = \bigcap_{\nu=1}^{\infty} U_\nu$. Zřejmě $A \subset \bigcap_{\nu=1}^{\infty} U_\nu$, takže zbývá ukázati, že ke každému $x \in R - A$ existuje ν takové, že $x \in R - U_\nu$. Ježto $R - A$ jest v R otevřené, existuje $\eta > 0$ takové, že $y \in R$. $\varrho(x, y) < \eta$ implikuje $y \in R - A$. Při vhodném ν bude $\frac{1}{\nu} < \eta$, tedy $x \in R - U_\nu$ podle definice U_ν .

27. *Nechť R jest dokonale normální prostor. Nechť $S \subset R$. Pak S jest dokonale normální prostor.⁴⁰⁾*

Důkaz. Nechť Z jest otevřené v S ; pak existuje v R otevřené G takové, že $Z = SG$. Ježto R je dokonale normální, existují v R

⁴³⁾ Třeba diagonálně: $B_{11} = B_1$; $B_{21} = B_2$, $B_{12} = B_3$; $B_{31} = B_4$, $B_{22} = B_5$, $B_{13} = B_6$; $B_{41} = B_7, \dots$