

## Werk

**Label:** Article

**Jahr:** 1934

**PURL:** [https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X\\_0063|log79](https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X_0063|log79)

## Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)  
SUB Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen

✉ [info@digizeitschriften.de](mailto:info@digizeitschriften.de)

$$\left( t^6 s' + \frac{t^6 - 1}{t^3} \right) \left( 1 - \frac{t^3 s'}{t^2 - 1} \right) \left[ \frac{t^6 - 1}{t^3} + s' (t^2 + 2) (t^2 - 1) + s'^2 t^3 (t^2 - 1) \right] = A^2.$$

Položíme-li  $A = \frac{t^6 - 1}{t^3} + s' (t^2 + 2) (t^2 - 1) + s'^2 (t^2 - 1) t^3$ , obdržíme po krácení kvadr. rovnici pro  $s'$  bez absol. členu, a z ní plyne

$$s' = \frac{t^3 - 3t^6 + 3t^2 - 1}{t^3 (t^6 + t^4 - 2t^2 + 1)}$$

a tedy

$$s = s' + \frac{1}{t^3} = \frac{t^6 - 2t^4 + t^2 + 1}{t (t^6 + t^4 - 2t^2 + 1)}.$$

Z rovnic (5), (6), (7) dostaneme

$$\begin{aligned} x &= t^6 + 3t^5 - 2t^4 + t^2 + 1, \\ y &= -t^6 + 3t^5 + 2t^4 - t^2 - 1, \\ z &= t (t^6 + t^4 - 2t^2 + 3t + 1), \\ u &= t (-t^6 - t^4 + 2t^2 + 3t - 1), \end{aligned}$$

kde ještě lze položit  $t = a/b$  ( $a, b$  celá čísla) a pak výrazy pro  $x, y, z, u$  učinit homogenními. — To je vlastně řešení p. Matějčička (Rozhledy, roč. 5, 1925, čís. 1). (Příště dokončení.)

## O průmětu kuželoseček rotačního kužele.

Podle † řed. V. Jeřábka sestavil dr. J. Roháček.

Rotační kužel budiž dán vrcholem  $v$  a podstavnou kružnicí  $K(v_1a)$  v průmětně  $\pi$ .  $K$  zvolené tětivě  $cd$  v kružnici  $K$  sestrojíme pól  $p$  a příslušnou sdruženou poláru, kterou považujeme za stopu

$P^\sigma$  roviny  $\sigma$ , procházející vrcholem kužele  $v$ ; rovinu  $\rho$  pak vedme přímkou  $cd$  rovnoběžně.

Rovina  $\rho$  protne kužel v elipse  $K'$  (obr. 1).


$P^\rho$  roviny  $\rho$ , vedené rovnoběžně s rovinou  $\sigma$ , určenou stopou  $cd \equiv P^\sigma$  a vrcholem  $v$ .

Rovina  $\rho$  protne kužel v hyperbole  $K$  (obr. 2).

Dokážeme nyní, že průmětem této křivky  $K'$  je kuželosečka  $K_1$ , jejímž jedním ohniskem je průmět  $v_1$  vrcholu  $v$  kužele.

Za tím účelem vedme v rovině sečné  $\rho$  přímkou  $L$ , kolmou na její stopu  $P^\rho$  v jakémkoliv bodě  $q$  ( $L_1 \perp cd$ ) a hledejme její průsečíky s kuželem. Přímkou  $L$  a

rovnoběžkou  $vp$  | spádovou přímkou  $vo$  roviny  
 je určena rovina  $\lambda$ , mající svojí stopu  $P^\lambda$  ve spojnici  $pq \equiv P^\lambda$ ,  
 resp.  $oq \equiv P^\lambda$ ;  $\lambda$  protíná kužel ve dvou površkách, vycházejících  
 z průsečných bodů  $m_0, n_0$  stopy  $P^\lambda$  s kružnicí  $K$ . Povrchové přímky  
 tyto sekou pak přímkou  $L$  v bodech  $m, n$  křivky  $K'$  [ $m_1 \equiv (L_1 \times m_0v)$ ,  
 $n_1 \equiv (L_1 \times n_0v)$ ].



Obr. 1.

Vedlejší osou průsečné elipsy (i jejího průmětu) je tětiva  $\overline{cd}$ , neboť stojí kolmo na směr  $vp$  hlavní osy a tečny ve vrcholech  $c, d$ , jako průsečnice rovin tečných ke kuželi v bodech  $c$  a  $d$  s rovinou sečnou  $q$ , jsou s tímto směrem taktéž rovnoběžny. Půlicím bod  $o$  tětivy  $\overline{cd}$  je tudíž středem elipsy  $K'$  i jejího průmětu  $K'_1$ .


Asymptoty průsečné hyperboly  $K'$  mají směr površek  $vc, vd$  a jejich průměty směry  $v_1c, v_1d$ . Poněvadž stopy tečných rovin ke kuželi podél površek  $vc, vd$  protínají se v bodě  $p$ , je bod  $p$  středem hyperboly  $K'$  i jejího průmětu  $K'_1$  a stopa  $P^e$  osou imaginární.

Čtveřina bodová  $(pqn_0m_0) = -1$  resp.  $(oqn_0m_0) = -1$  je — jak patrné — harmonická a promítá se ze středu  $v_1$  na přímkou  $L_1$  do čtyř bodů opět harmonicky sdružených  $(m_1n_1q\infty) = -1$  a ježto jeden bod této čtveřiny je v nekonečnu, je k němu sdružený bod  $q$  půlicím bodem tětivy  $\overline{m_1n_1}$  kuželosečky  $K'_1$  a tedy též půlicím bodem tětivy  $\overline{mn}$  křivky  $K'$ . Jsou tedy body  $m, n$  na kuželi po

obou stranách průmětny stejně od ní vzdáleny. Otočíme-li nyní povrchy  $vm_0$ ,  $vn_0$  na kuželi do přímky  $vc$ , přejdou body  $m$ ,  $n$  do nových poloh  $m'$ ,  $n'$  na  $vc$  tak, že  $m'$  je nad a  $n'$  pod průmětnou  $\pi$ . Jsou-li půdorysy nových poloh  $m'_1$ ,  $n'_1$ , musí

$$\overline{m'_1c} = \overline{n'_1c} = u.$$

Z obrázců je dále patrné, že



Obr. 2.

$$\begin{aligned} \overline{vm'_1} &= a - u, \\ \overline{vn'_1} &= a + u, \end{aligned}$$

sečtením ihned plyne

$$\overline{vm'_1} + \overline{vn'_1} = 2a.$$

Sestrojíme-li bod  $e$  souměrný k bodu  $f \equiv v_1$  podle stopy  $P^e$ , jest na základě souměrnosti  $fm_1 = en_1$  a  $fn_1 = em_1$  a hořejší rovnosti nabývají známých tvarů:

$$\overline{m_1f} + \overline{m_1e} = 2a \text{ resp. } \overline{m_1f} - \overline{m_1e} = 2a,$$

což praví, že průmětem křivky  $K'_1$  je elipsa, resp. hyperbola, jejímž jedním ohniskem je bod  $v_1$ . Učiníme-li  $\overline{oa_1} = \overline{ob_1} = a$  ( $\overline{pa_1} = \overline{pb_1} = a$ ) = poloměru podstavné kružnice kužele, obdržíme vrcholy hlavní osy kuželosečky  $K'_1$ .

Při průseku parabolického vedme v podstavné kružnici  $K$  rotačního kužele vodorovný průměr  $ap$  (obr. přenechávám lask.

$$\begin{aligned} \overline{vm'_1} &= u - a, \\ \overline{vn'_1} &= u + a, \end{aligned}$$

odečtením vyplývá

$$\overline{vn'_1} - \overline{vm'_1} = 2a.$$