

Werk

Label: Article

Jahr: 1947

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X_0072|log74

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

VYUČOVÁNÍ

Metodické poznámky k vete sinovej.

Dr Frant. Krňan, Bratislava.

Sinusovú vetu elegantne vyvodíme takto: Danému trojuholníku opíšeme kružnicu, viď obr. 1. Niektorý vrchol napr. B posunieme do bodu B' — spojnice CB' je priemer kružnice. $\sphericalangle AB'C$ je β .


Platí $\sin \beta = \frac{b}{2r}$, odkiaľ $\frac{b}{\sin \beta} = 2r$.

Práve tak isto sme mohli posunovať vrchol A prípadne C . Tým dochádzame pre trojuholník ostrouhlý k tejto formulácii sinusovej vety:


$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r,$$

ktorá hovorí viac ako formulácia:

$$a : b : c = \sin \alpha : \sin \beta : \sin \gamma,$$



Obr. 1.



Obr. 2.

lebo z prvej formulácie vidíme nielen, že pomer strany a sinu protilahlého uhlu je stály, ale aj to, že tento pomer rovná sa priemeru kružnice opísanej. Možno z nej aj ďalej ťažiť. Ak $2r = 1$, je

$$a = \sin \alpha, b = \sin \beta, c = \sin \gamma,$$


inými slovami: Ak do kružnice s jednotkovým priemerom vpíšeme

Ľubovoľný trojuholník, jeho strany sú číselne rovné sinusom protiľahlých uhlov. Veta platí aj pre trojuholník tupouhlý, ak predpokladáme (obr. 2)


$$\sin(2R - \varphi) = \sin \varphi,$$

lebo tetiva $\overline{QR}$ leží jak proti uhlu φ tak aj proti uhlu $(2R - \varphi)$.

Tetiva v kružnici s jednotkovým priemerom vzrastá od 0 po 1, ak proti nej ležiaci uhol sa zväčšuje od 0 po 90° ; ak uhol ďalej rastie po 180° , tetiva sa znižuje od 1 po 0. Stretávame sa tu s inou možnosťou realizovania sinusu uhlov od 0 po 180° .



Obr. 3.



Obr. 4.

Keďže v kružnici s jednotkovým priemerom sú strany číselne priamo rovné sinusom protiľahlých uhlov, žiak názorne pochopí, že v kružnici s priemerom $2r$ krát väčším budú strany tiež $2r$ krát väčšie. Z obr. 3 možno priamo vyčítať vzťah:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = \frac{r}{\frac{1}{2}} = 2r.$$

Pre zaujímavosť uvádzam ešte obr. 4, z ktorého vzhľadom na známu vetu o súčine uhlopriečok v tetivovom štvoruholníku potvrdzuje sa pre ostré uhly známy vzťah:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

Pozn. red. O niečo pozdžej došiel redakcii článok prof. Fr. Hradeckého, v němž byly touž methodou odvozeny i některé další vzorce goniometrické platné pro ostré úhly. Redakce pro úsporu místa dala přednost kratšímu článku Krňanovu.