

Werk

Label: Article

Jahr: 1973

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311157X_0098|log79

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

K ZOBEZNĚNÍ POJMU PROJEKTOR

JAN HAVRDA, Praha

(Došlo dne 17. ledna 1972)

Úkolem článku je jisté zobecnění známého pojmu projektor na lineárním prostoru se skalárním součinem, přičemž množinou, na kterou se promítá, je zde neprázdná konvexní uzavřená množina. V článku jsou též uvedeny některé základní vlastnosti tohoto zobecněného projektoru.

Symbolem L budeme značit lineární prostor se skalárním součinem (\cdot, \cdot) , symbol $\|\cdot\|$ bude značit jím indukovanou normu. Velká písmena A, I, S apod. označují operátory definované na L s oborem hodnot v L ; přitom I značí identický operátor. Symbolem L_A apod. budeme označovat obor hodnot operátoru A .

1. Lemma. 1. Je-li A idempotentní operátor, pak množina L_A je rovna množině samodružných bodů operátoru A .

2. Je-li A spojitý idempotentní operátor, pak L_A je uzavřená množina.

Důkaz je zřejmý.

2. Věta. Bud A idempotentní operátor takový, že pro všechna $x_1, x_2 \in L$ platí

$$(1) \quad \|Ax_1 - Ax_2\|^2 \leq \operatorname{Re}(x_1 - x_2, Ax_1 - Ax_2).$$

Potom L_A je neprázdná konvexní uzavřená množina a pro každé $x_0 \in L$ při všech $z \in L_A$ platí

$$(2) \quad \|x_0 - Ax_0\| \leq \|x_0 - z\|.$$

Přitom Ax_0 je jediný bod množiny L_A , pro který při všech $z \in L_A$ platí nerovnost (2).

Důkaz. Z nerovnosti (1) vyplývá, že při všech $x_1, x_2 \in L$ platí $\|Ax_1 - Ax_2\| \leq \|x_1 - x_2\|$, operátor A je tedy spojitý a podle 2) lemmatu 1 je L_A uzavřená množina. Okolnost, že $L_A \neq \emptyset$ je zřejmá.

Z nerovnosti (1) a 1) lemmatu 1 dále plyne, že pro všechna $x_1 \in L$ a $z \in L_A$ platí $\|Ax_1 - z\|^2 \leq \operatorname{Re}(x_1 - z, Ax_1 - z)$ čili

$$(3) \quad \operatorname{Re}(z - Ax_1, x_1 - Ax_1) \leq 0.$$

Nyní dokážeme, že L_A je konvexní množina. Buď $z_1, z_2 \in L_A$, $\lambda_1 \geq 0$, $\lambda_2 \geq 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$. Označme $y = A(\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2)$, $\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 - y = v$. Podle (3) platí $\operatorname{Re}(z_1, v) \leq \operatorname{Re}(y, v)$, $\operatorname{Re}(z_2, v) \leq \operatorname{Re}(y, v)$, tedy též $\operatorname{Re}(\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2, v) \leq \operatorname{Re}(y, v)$ čili $\operatorname{Re}(y + v, v) \leq \operatorname{Re}(y, v)$, takže $\|v\|^2 \leq 0$. Odtud $v = 0$ a $\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 \in L_A$.

Buď $x_0 \in L$, $z \in L_A$. Potom $\|z - x_0\|^2 - \|Ax_0 - x_0\|^2 = \|z - Ax_0\|^2 - 2 \operatorname{Re}(z - Ax_0, x_0 - Ax_0) \geq 0$ v důsledku platnosti vztahu (3). Tedy platí (2). Jestliže pro $z_1 \in L_A$ platí $\|z_1 - x_0\| = \|Ax_0 - x_0\|$, pak $0 = \|z_1 - x_0\|^2 - \|Ax_0 - x_0\|^2 = \|z_1 - Ax_0\|^2 - 2 \operatorname{Re}(z_1 - Ax_0, x_0 - Ax_0) \geq 0$ opět v důsledku platnosti vztahu (3), tedy $\|z_1 - Ax_0\| = 0$. Věta je dokázána.

3. Označení. Systém všech operátorů splňujících předpoklady věty 2 označme \mathcal{A}_0 .

4. Důsledek. Buď $A \in \mathcal{A}_0$. Potom každý bod $x \in L$ lze vyjádřit ve tvaru

$$(4) \quad x = x_0 + y_0, \quad x_0 \in L_A, \quad y_0 \in L$$

tak, že pro všechna $z \in L_A$ platí

$$(5) \quad \operatorname{Re}(z - x_0, y_0) \leq 0.$$

Vyjádření bodu x ve tvaru (4) s vlastností (5) je jediné, přičemž $x_0 = Ax$.

Důkaz. Položíme-li $x_0 = Ax$, $y_0 = x - Ax$, platí (4) a (5) v důsledku platnosti nerovnosti (3). Zbývá tedy dokázat jen jednoznačnost. Kdyby navíc platilo $x = x_1 + y_1$, $x_1 \in L_A$, $y_1 \in L$, a kdyby při všech $z \in L_A$ bylo $\operatorname{Re}(z - x_1, y_1) \leq 0$, pak $x_1 - x_0 = y_0 - y_1$, $\operatorname{Re}(x_1 - x_0, y_0) \leq 0$, $\operatorname{Re}(x_0 - x_1, y_1) \leq 0$, tudíž $0 \geq \operatorname{Re}(x_1 - x_0, y_0 - y_1) = \operatorname{Re}(x_1 - x_0, x_1 - x_0) = \|x_1 - x_0\|^2$. Proto $x_1 = x_0$ a tedy též $y_0 = y_1$.

5. Lemma. Buď $A \in \mathcal{A}_0$.

1) Jestliže $x \in L$, $x = Ax + y$, $\lambda \geq 0$, potom $A(Ax + \lambda y) = Ax$.

2) Jestliže $x_1, x_2 \in L$, $x_1 = Ax_1 + y_1$, $x_2 = Ax_2 + y_2$, $\lambda_1 \geq 0$, $\lambda_2 \geq 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, pak existuje $x_3 \in L$ tak, že $Ax_3 = A(Ax_3 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)$.

Důkaz. 1) Jestliže $x = Ax + y$, podle nerovnosti (3) pro všechna $z \in L_A$ platí $\operatorname{Re}(z - Ax, y) \leq 0$, tedy při $\lambda \geq 0$ též $\operatorname{Re}(z - Ax, \lambda y) \leq 0$. Označíme-li $v = Ax + \lambda y$, podle důsledku 4 dostáváme $Ax = Av = A(Ax + \lambda y)$.

2) Jestliže $x_1 = Ax_1 + y_1$, $x_2 = Ax_2 + y_2$, pak při všech $z \in L_A$ platí $\operatorname{Re}(z - Ax_1, y_1) \leq 0$, $\operatorname{Re}(z - Ax_2, y_2) \leq 0$. Násobením prvek z těchto nerovností λ_1^2 a druhé λ_2^2 a sečtením dostaneme, že pro všechna $z \in L_A$ je $\operatorname{Re}(z - \lambda_1 Ax_1 - \lambda_2 Ax_2, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) \leq 0$. Podle věty 2 je $z_3 = \lambda_1 Ax_1 + \lambda_2 Ax_2 \in L_A$. Existuje tedy $x_3 \in L$ tak, že $z_3 = Ax_3$. Přitom při všech $z \in L_A$ platí $\operatorname{Re}(z - Ax_3, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) \leq 0$. Označíme-li $v = Ax_3 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$, vidíme, že podle důsledku 4 je $Ax_3 = Av = A(Ax_3 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)$.

6. Věta. Bud $A \in \mathcal{A}_0$, $S = I - A$. Potom L_S je konvexní kužel.

Důkaz. a) Bud $y \in L_S$, $\lambda \geqq 0$. Existuje $x \in L$ tak, že $y = Sx = x - Ax$. Podle 1) lemmatu 5 platí $\lambda y = Ax + \lambda y - Ax = Ax + \lambda y - A(Ax + \lambda y) = S(Ax + \lambda y)$, tedy $\lambda y \in L_S$.

b) Budte $y_1, y_2 \in L_S$, $\lambda_1 \geqq 0$, $\lambda_2 \geqq 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$. Existují $x_1, x_2 \in L$ tak, že $y_1 = Sx_1$, $y_2 = Sx_2$. Podle 2) lemmatu 5 existuje $x_3 \in L$ tak, že $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 = Ax_3 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 - A(Ax_3 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = S(Ax_3 + \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)$, tedy $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in L_S$. Odtud $y_1 + y_2 = 2(\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2) \in L_S$.

7. Věta. Bud $A \in \mathcal{A}_0$, $S = I - A$. Je-li množina L_A kompaktní, pak $L_S = L$.

Důkaz. Bud $y \in L$, $x_0 \in L_A$ a označme $A(x_0 + ny) = x_n$, $S(x_0 + ny) = y_n$. $n = 1, 2, \dots$ Na základě věty 2 při $n = 1, 2, \dots$ tedy platí $x_0 + ny = x_n + y_n$ a při všech $z \in L_A$ je $\operatorname{Re}(z - x_n, y_n) \leqq 0$. Poněvadž $x_n \in L_A$ při $n = 1, 2, \dots$, existuje vybraná posloupnost $\{x_{n_k}\}$, která má limitu $x^0 \in L_A$. Při $k = 1, 2, \dots$ platí

$$\frac{y_{n_k}}{n_k} = \frac{x_0 - x_{n_k}}{n_k} + y,$$

takže $\lim_k y_{n_k}/n_k = y$. Navíc při všech $z \in L_A$ platí $\operatorname{Re}(z - x_{n_k}, y_{n_k}/n_k) \leqq 0$ a přechodem k limitě při $k \rightarrow \infty$ dostaneme $\operatorname{Re}(z - x^0, y) \leqq 0$. Označíme-li $v = x^0 + y$ podle důsledku 4 je $Sv = y$, tedy $y \in L_S$.

8. Označení. Symbolem \mathcal{A}_1 označíme systém všech operátorů $A \in \mathcal{A}_0$, pro něž platí, že při všech $x \in L$ a všech $\lambda \geqq 0$ je $A\lambda x = \lambda Ax$.

9. Věta. Jestliže $A \in \mathcal{A}_1$, pak $S = I - A \in \mathcal{A}_1$.

Důkaz. Bud $A \in \mathcal{A}_1$, $S = I - A$. Podle důsledku 4 při $x \in L$, $x = Ax + Sx$ a při všech $z \in L_A$ je $\operatorname{Re}(z - Ax, Sx) \leqq 0$, tedy při všech $\lambda \geqq 0$ platí $0 \geqq \operatorname{Re}(\lambda Ax - Ax, Sx) = (\lambda - 1) \operatorname{Re}(Ax, Sx)$, takže $\operatorname{Re}(Ax, Sx) = 0$. Tudíž pro všechna $z \in L_A$ a všechna $y \in L_S$ máme

$$(6) \quad \operatorname{Re}(z, y) \leqq 0.$$

a) Bud $x \in L$, $x = Ax + Sx$, tedy $x - Ax = 0 + Sx$ a při všech $z \in L_A$ platí $\operatorname{Re}(z - 0, Sx) \leqq 0$. Podle důsledku 4 tudíž $A(x - Ax) = 0$ čili $AS = 0$. Nyní $S^2x = Sx - ASx = Sx$ při všech $x \in L$.

b) Pro $x_1, x_2 \in L$ je $x_1 = Ax_1 + Sx_1$, $x_2 = Ax_2 + Sx_2$ a podle nerovnosti (1) platí $(Ax_1 - Ax_2, Ax_1 - Ax_2) \leqq \operatorname{Re}(x_1 - x_2, Ax_1 - Ax_2)$ čili $0 \leqq \operatorname{Re}(Sx_1 - Sx_2, Ax_1 - Ax_2)$ čili $\|Sx_1 - Sx_2\|^2 \leqq \operatorname{Re}(x_1 - x_2, Sx_1 - Sx_2)$.

c) Bud $x \in L$, $\lambda \geqq 0$. Pak $S\lambda x = \lambda x - A\lambda x = \lambda(x - Ax) = \lambda Sx$.