

## Werk

**Titel:** Corrección a: condiciones suficientes para la existencia de soluciones debiles d...

**Autor:** Castro, Alfonso

**Jahr:** 1977

**PURL:** [https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?320387429\\_0011|log15](https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?320387429_0011|log15)

## Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)  
SUB Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen

✉ [info@digizeitschriften.de](mailto:info@digizeitschriften.de)

Revista Colombiana de Matemáticas  
Vol. XI (1977), págs 109 - 111

Corrección a:

CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA EXISTENCIA  
DE SOLUCIONES DEBILES DEL PROBLEMA  
DE FRONTERA:  $Lu(x) = g(u(x), x)$  ,  
si  $x \in \Omega$  ,  $u(x) = 0$  si  $x \in \partial\Omega$ .  
(Rev.Col.Mat. IX (1975), 173-187)

por

Alfonso CASTRO

El lema 2 de [1] es falso. Sucede que las suposiciones acerca de  $g$  no permiten aseverar que  $g(u)v\omega$  sea integrable en  $\Omega$  .

En cuanto al lema 1 consideramos pertinente observar que  $g(u)v$  es integrable en  $\Omega$  porque en virtud de (8) y (9)  $g$  satisface una condición de crecimiento del tipo

$$(c.1) \quad |g(u,x)| \leq A + B|u|$$

donde  $A$  y  $B$  son constantes independientes de  $(u, x)$ .

La validez del teorema 1 en [1] no se altera por la incorrección del lema 2. En efecto, el uso del lema 2 en la prueba del teorema 1 puede ser reemplazado por el siguiente argumento: de (8) y (9) se tiene

$$(c.2) \quad \langle \nabla J(x+y_1) - \nabla J(x+y_2), y_1 - y_2 \rangle \geq \|y_1 - y_2\|^2$$

donde  $k$  es una constante positiva independiente de  $(x, y_1, y_2) \in X \times Y \times Y$ . Como (c.2) implica que  $J_x(y) \rightarrow +\infty$  cuando  $\|y\| \rightarrow \infty$  y como  $J_x$  es estrictamente convexo entonces existe la función  $\Theta: X \rightarrow Y$  tal que

$$(c.3) \quad J_x(\Theta(x)) = \min_{y \in Y} J(x+y)$$

Finalmente, la caracterización variacional (c.3) implica la continuidad de  $\Theta$  y la diferenciabilidad de  $\tilde{J}$ . Luego el teorema 1 subsiste.

Si asumimos (8') y (9') es posible obtener la condición de crecimiento (c.1) y una relación dual a (c.2). Ahora bien, se puede probar que  $\Theta$  es continua con respecto a la convergencia débil y la prueba del teorema 1 sigue como se sugiere en [1].

También queremos anotar que la hipótesis (8) puede ser reemplazada por

$$\frac{g(u_1, x) - g(u_2, x)}{u_1 - u_2} \leq \gamma_1 < \lambda_{N+1}$$

$$(u_1, u_2, x) \in \mathbb{R}^2 \times \bar{\Omega}$$

sin necesidad de suponer la existencia de  $\frac{\partial E}{\partial u}$  .  
Cambio análogo se puede hacer con (8').

Los resultados de [1] con las aclaraciones  
de esta nota generalizan los resultados de [2] .

\*\*\*

#### REFERENCIAS

- [1] Castro, A. Condiciones suficientes para la existencia de soluciones débiles del problema de frontera (1)  $\{Lu(x) = g(u(x), x)$  si  $x \in \Omega$   
 $u(x) = 0$  si  $x \in \partial\Omega$  . Rev. Colombiana de Mat. IX (1975), 173-187.
- [2] Dolph, C.L. Nonlinear Integral equations of Hammerstein type. Trans. Amer. Math. Soc. 66 (1949) 289-307.

*Department of Mathematical Sciences  
University of Cincinnati  
Cincinnati, Ohio 45219, U.S.A.*

(Recibido en marzo de 1977).

