Werk

Titel: Begleitworte zu den "40 Blättern der Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000, aus...

Autor: Behrmann, Walter

Ort: Berlin

Jahr: 1911

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?391365657_1911|LOG_0186

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

info@digizeitschriften.de

Begleitworte
zu den „40 Blättern der Karte des Deutschen Reiches 1 : 100000, ausgewählt für Unterrichtszwecke,
herausgegeben von der Königlich Preußischen Landesaufnahme".

Von Dr. **Walter Behrmann** in Berlin.

(Schluß.)

Blatt 504: Cochem.

Blatt Cochem zeigt uns die von der Mosel und ihren Nebenflüssen in Mäandern durchschnittene Rumpffläche des Rheinischen Schiefergebirges nebst den jugendlichen Vulkanerscheinungen der Eifel.

Aus der gleichförmigen Rumpffläche, bestehend aus niederländischen, Südwest—Nordost streichenden, paläozoischen Gesteinen, ragen wegen ihrer Härte Quarzitrücken als Monadnocks heraus (Condelwald 477 m). In die Fläche eingesenkt ist Rotliegendes und heute als weicheres Material in der „Wittlicher Senke" ausgeräumt (Kinderbeuren bis Bengel, Südrand des Blattes). Die Mosel war als freimäandrierender Fluß auf der Rumpffläche angelegt. Bei der seit dem Miocän erfolgten Hebung des Schiefergebirges und dem gleichzeitigen Einschneiden des Rheins hat sie sich tiefer gelegt und jetzt an den eingesenkten Mäandern Prall- und Gleithänge in prächtiger Ausbildung erzeugt. Zwischen Pünderich und Bullay nähern sich die Prallhänge so weit, daß die Hochfläche zu einem Grat erniedrigt ist. Die Jugendlichkeit des Tieferlegens beweisen die scharfeingeschnittenen Nebenflüsse, welche die Hochfläche der Vor-Eifel noch nicht völlig zerstören konnten. Nur im Osten des Blattes ist bei größerer Taldichte eine weitgehendere Zertalung eingetreten, härtere Schichten wurden aus weicheren herausgearbeitet, so daß das Schichtstreichen an dem Verlauf der Rücken erkennbar wird. Während die kleinen Gehängeflüsse aber fast geradlinig zur Mosel fließen, haben alle längeren Nebenflüsse einen stark mäandrierenden Lauf, wenn auch mit kleineren Mäandern als die Mosel, ein Zeichen, daß sie nicht erst durch das Einschneiden der Mosel entstanden, sondern daß auch sie wie die Mosel auf der Rumpffläche angelegt sind. Die Alf durchkreuzte früher die Wittlicher Senke, wurde aber später durch einen Zufluß der Ueß in dem weichen Rotliegenden angezapft, so daß sie heute einen aus den verschiedensten Talstücken zusammen-

gesetzten gewundenen Lauf aufweist. Die jugendlichen Erdkrustenbewegungen des Emporhebens des ganzen Gebirges waren mit vulkanischen Eruptionen verbunden, die sich vornehmlich an die Linie Bad Bertrich bis Daun knüpfen. Das Pulver-Maar sowie die drei Dauner Maare sind Explosionsöffnungen, heute mit Wasser erfüllt, zeigen aber an den unveränderten Formen große Jugendlichkeit. Südlich Strohn ergoß sich vor so kurzer Vergangenheit in das schon eingeschnittene Alf-Bett Basaltlava, daß der Fluß sie noch nicht hat durchsägen können, unterhalb also eingeschnittene Formen der Erosion, oberhalb aber Akkumulation- und sanfte Talgehänge aufweist. Bei Ulmen befindet sich nördlich des noch vorhandenen Maares ein zweites größeres, das heute verlandet ist (Weiher).

Die Siedelungen liegen teils auf der Hochfläche, teils im Mosel-Tal (Weinbau). Die Bergabhänge und Seitentäler sind bewaldet und unbesiedelt. Die Verkehrswege suchen daher die Wasserscheiden auf mit kurzen Verbindungsstrecken zur Mosel. Die Haupteisenbahn kürzt die Mosel-Mäander in Tunneln ab und verläßt in der Wittlicher Senke den gewundenen Lauf des Flusses, dem nur Lokalbahnen folgen.

Blatt 532: Bamberg.

Blatt Bamberg führt uns an die Schichtstufe der Fränkischen Alb. Diese halbiert das Blatt: die Osthälfte wird eingenommen von der Höhe des Jura, der sich von 580 m im Westen bis 400 m im Osten senkt, die Westhälfte von dem tieferen Vorland mit dem weiten Talzuge der Regnitz und des Main (250—230 m).

Die geologische Zusammensetzung des Gebietes ist eine relativ einfache. Die nach Osten fallenden und Nord-Süd streichenden Schichten folgen sich konkordant aufeinander, und zwar wird der Westen bis zur Regnitz und im Haupts-Moor-Wald darüber hinaus vom Keuper eingenommen. Ihn überlagert Lias oder schwarzer Jura, westlich des Main und der Regnitz ist er nur an den höheren Punkten erhalten (Landsweide, Altenburg, Distelberger Wald, Mainberger Wald). Östlich wird er zusammenhängender und reicht im Norden bis zur Dorflinie Burggellern-Eggolsheim. Dann folgt eine schmale Zone Dogger oder brauner Jura, endlich mit dem zerfransten Steilabfall die Kalke des Malm oder weißen Jura, die in der Linie Steinfeld-Streifberg von Dolomit abgelöst werden. Im Folgenberg südlich Hohen-Pölz durchsetzt Basalt die Hochfläche. Dem Wechsel der tonigen, sandigen und kalkigen Ausbildung, der Härte und Durchlässigkeit der Schichten entspricht die mehr oder minder ausgeprägte Stufe, mit der sie enden. Vor den Stufen aber liegen die Zeugen größerer früherer Ausdehnung, Auslieger. Die erste unbedeutende Vorstufe wird im Haupts-Moor-Wald

(300—350 m) von den untersten Schichten des Lias zugleich mit den festen Sandsteinen des weißen Keuper (Rhät) gebildet, welche Gesteine auch die Höhen im Westen des Blattes bedingen. Über den darauf lagernden fruchtbaren Mergeln und Tonen des mittleren und oberen Lias wird die schmale Doggerstufe durch Eisensandsteinschichten bedingt. Sie ist in etwa 430 m Höhe nicht immer gut ausgeprägt (Schammelsberg bei Lohndorf, Schloßberg bei Geißfeld und der Auslieger des Senftenberges und Schießberges). Die etwa 550 m hohe, das Landschaftsbild beherrschende und am Gegensatz der waldlosen Fläche zu den bewaldeten Abhängen sofort erkennbare Malmstufe bildet die Höhe des Franken-Jura. Sie ist vielfach zerlappt und hat im Schloßberg bei Zeckendorf einen Auslieger. Die Durchlässigkeit der Malmschichten verusacht steilwandige, ziemlich breitsolige Täler, im Bereiche des Dolomit finden sich Karstformen mit großen Höhlen (bei Muggendorf beiderseits der Wiesent) und schroffe Felswände. Die Flüsse beginnen auf der Hochfläche mit wasserlosen Tälern, fließen dann zumeist in der Richtung des Streichens; kurze Verbindungsstücke, sowie Stirnflüsse der Schichtstufe führen zur Hauptsammelader vor der Stufe. Dieser fließen von Westen her auf den Schichtflächen parallele Flüsse entgegen. Das Tal des Main und der Regnitz hat eine ausgeglichene weite Talaue, die die Anlage des Main-Donau-Kanals (Ludwigs-Kanal) ermöglichte. Der Main wendet sich zwischen Hallstadt und Bamberg nach Westen und fließt im weiten Tal entgegen dem Fallen der Schichten durch die Keuperhöhen.

Dem Wechsel der Gesteine entspricht die Bodenausnutzung. Die waldlose, wasserarme Jura-Hochfläche mit ihren kleinen Dörfern steht im Gegensatz zu den mit Laubwald bedeckten Abhängen. In den wasserreichen Tälern, vornehmlich im breiten Main- und Regnitz-Tal, liegen größere Ortschaften in Form germanischer Haufendörfer. Ebenso ist die Fläche des Lias reicher besiedelt, während der Keuper und die anlagernden diluvialen Sande nur Nadelholz tragen. Die Siedelungen tragen deutsche Namen, nur im äußersten Norden einige slawische. In der weiten Talung liegt noch an der Regnitz die alte Bischofsstadt Bamberg, an einem Punkte, wo die natürliche, der Regnitz folgende Verkehrsstraße aus Süd-Deutschland sich am Main gabelt, um entweder mainabwärts nach Schweinfurt und Unter-Franken, oder mainaufwärts und dann am Thüringer Wald entlang oder ihn überschreitend nach Thüringen zu führen.

Blatt 558: Mannheim.

Blatt Mannheim führt uns in die nördliche Hälfte des Mittelrhein-Grabens, und zwar an seine Ostseite. Es wird daher die größere Hälfte des Blattes von den Aufschüttungen der Mittelrhein-Ebene eingenommen, über die sich im Osten die Höhen des Odenwaldes erheben.

Der Rand des Gebirges ist eine Bruchstufe, an der staffelförmig der Rhein-Graben absank. Eine Staffel der jugendlichen Stufe tritt deutlich von Handschuhsheim bis Nußloch als niedrigeres Niveau zur Erscheinung. Der Norden des Gebirges besteht vornehmlich aus Graniten des Variskischen Gebirges, dem zuerst in der Linie Dossenheim, Heiligkreuz-Steinach Buntsandstein auflagert, dann in der Linie Nußloch-Wiesenbach Muschelkalk, endlich zwischen Wiesloch und Meckesheim Keuper und ganz im Süden des Blattes bei Malschenberg abgesunkener Jura. Der Gesteins-Charakter prägt sich im Landschaftsbilde aus, große Taldichte, daher reife Formen im Granit. Der Buntsandstein, wie das erste Gebiet einer Waldzone, setzt mit einer fast verwischten Schichtstufe (Weiße Steine bis Adlerstein) ab, er hat, weil durchlässiger, geringere Taldichte. Im Muschelkalk und Keuper fehlt der Wald. Ackerbau nutzt die reiche Lößbedeckung aus. Sie verdeckt die Schichtstufe des oberen Muschelkalks (zwischen Mauer und Wiesenbach), die auch deswegen, gleich der des Keupers, überall schlecht heraustritt, weil die geologisch jüngeren Schichten bei der Muldenform der Lagerung in einem tieferen Niveau wie die älteren liegen. Dagegen sind die in dem Schichtfallen fließenden Flüsse, die sich in der Elsenz und dem Angelbach sammeln, gut ausgeprägt. Dies einfache Bild der Formen erhält eine Bereicherung durch das antezedente Durchbruchstal des Neckar, der sich tief eingeschnitten und seinerseits sich tributäre Gehängeflüsse erzeugt hat, die den aufgelagerten Buntsandstein zerschneiden. Der Neckar schneidet sich eigensinnig durch den hohen Odenwald (566 m), trotzdem südlich Mauer, am Anfang des Kraichgaus, Pässe von 224 m liegen. Er hat in älteren Zeiten einen großen Bogen von Kleingemünd (Alter Prallhang) nach Wiesenbach (Trockental) bis Mauer (Strecke heute durch Löß verschüttet) -Reilsheim bis Bammental (Prallhang) und Neckargemünd beschrieben, wo die Prallhänge sich verschnitten haben, der Neckar sich verkürzte und ein Umlaufberg stehen blieb.

In der Rhein-Ebene fallen die prächtigen Mäander des Rheins in die Augen, bei ihm haben häufige Flußverlegungen durch Seitenerosion stattgefunden, wie bei allen Tieflandsflüssen. Die alten Flußschlingen sind an den Wiesen zu erkennen. Auch die anderen Flüsse werden von verlassenen Mäandern begleitet, die je nach ihrer Wasserführung verschieden groß sind, klein am Kraich-Bach bei Hockenheim, größer am Neckar, der nach den eingesenkten Mäandern im Gebirge im Tiefland freie Mäander beschreibt (nördlich Ladenburg). Der heutige Rhein fließt im kanalisierten Bett. Die Rhein-Ebene trägt in den Lößgebieten zum großen Teil Ackerbau, in den Dünen und Schotterfeldern Kiefernwald.

Eine reiche Volksdichte, viele Städte mit alter Geschichte (Speyer als Brückenstadt an der römischen Rheinseite, Heidelberg am Austritt

des Neckar) und neuere Gründungen, verbunden durch viele Bahnen, charakterisieren das wichtige Durchgangsgebiet. Die Doppelstadt Mannheim (Baden)-Ludwigshafen (Bayerische Pfalz) hat ein quadratisches Straßennetz einer planvoll angelegten Siedelung und blüht als Endpunkt der größeren Rheinschiffahrt (Hafen) mit großer Industrie mächtig auf.

Blatt 568: Metz.

Blatt Metz zeigt einen Teil der lothringischen Schichtstufenlandschaft, die, entsprechend den Schichtstufen in Schwaben und Franken, an die gleichmäßige Lagerung des Jura geknüpft ist. Sowohl den Westen wie den Osten nimmt eine sich westwärts senkende Fläche ein; an der steilen, das Blatt halbierenden Stufe fällt die westliche mit etwa 150 m Höhenunterschied gegen die östliche ab.

Bei den flach nach Westen einfallenden Schichten rücken die an das Ausstreichen harter Schichten geknüpften Stufen weit auseinander, so daß nur eine auf das Gebiet des Blattes fällt. Die in Schwaben nur schwach ausgebildete Stufe des Eisenoolith im Braunen Jura (Dogger) beherrscht hier das Landschaftsbild. Die Osthälfte des Blattes wird also von Schichten des Lias, häufig mit einer Diluvialdecke, die Westhälfte von den überlagernden Schichten des Dogger eingenommen. Bemerkenswert ist die Unabhängigkeit der Flußläufe vom Stufenbau der Landschaft. Zwar fließt die Seille und unterhalb Metz die Mosel am Fuße der Dogger-Schichtstufe. Oberhalb Metz aber führt sie unabhängig vom Streichen durch den Dogger hindurch, wie auch die Orne im Norden die ganze Stufe entgegen dem Schichtfallen in eingesenkten Mäandern durchquert. Kurze Schichtflüsse führen zur Mosel mit steilen Wandungen, diese sind aber alle bestrebt, in die Richung des Streichens Nord-Süd umzubiegen. Es lösen sich dadurch steilwandige Partien als Auslieger los, so bei Arnaville und westlich Metz (St. Quentin). Der Eisenreichtum der oolithischen Sandsteine wird besonders bei Ars ausgebeutet. Die westlich mäßig durchtalte Hochfläche ist höher und wasserärmer als die östliche, daher nicht so fruchtbar. Die Höhe der Stufe ziert Wald, die Abhänge zum breiten Mosel-Tal tragen Weinbau.

Ein großes Interesse bietet das Blatt zur Verfolgung geschichtlicher Ereignisse. Römerstraßen im Westen und Norden, sowie römische Wasserleitungen (bei Ars) erinnern daran, daß wir uns im alten Kolonisationsgebiet der Römer befinden, denen Metz seine Gründung verdankt. Als Zwischenland zwischen Deutschland und Frankreich hat es eine bewegte Geschichte gehabt, deren letzte große Ereignisse auf dem Kartenbilde durch viele Soldatengräber bezeugt werden. Sie drängen sich um Colombey-

Nouilly (14. August), um Vionville (16. August), um Gravelotte-St. Privat (18. August), sowie nördlich bei Noisseville (1. September), Bellevue (7. Oktober 1870), durch welche Schlachten das Heer Bazaines in die Festung Metz hineingedrängt und dort festgehalten wurde. Die Sprachgrenze verläuft östlich und im Norden des Blattes, nur bei Metz ist eine deutsche Sprachinsel, die Reichsgrenze im Westen des Blattes.

Blatt 582: Zwiesel.

Blatt Zwiesel bietet die charakteristische Ausgestaltung und die höchsten Partien des Böhmer Waldes mit dem Kulminationspunkt des Arber (1457 m).

Der Böhmer Wald ist ein Gebirge mit großer Einförmigkeit der Gesteine; Granite und Gneise, im Norden des Blattes Glimmerschiefer und Hornblendeschiefer, streichen im wesentlichen in sudetischer Richtung von Südosten nach Nordwesten. In die gleiche Richtung fällt der Quarzzug des Pfahls (von Viechtach bis Patersdorf im Südwesten, auf dem Blatte wenig hervortretend), sowie die Längserstreckung der Bergrücken und die sie trennenden breiten Längstäler. Die Bergrücken haben milde, ausgereifte Formen, so der Zug des Kaitersberges bis zum Arber, der Hohe Bogen, das Künische Gebirge, der Fallenstein und Lackenberg u. s. w. Zu einer schärferen Rückenbildung kommt es nur am Osser, bedingt durch sehr widerständige Quarzglimmerschiefer. Im allgemeinen knüpfen sich die Rücken nicht an bestimmte Gesteine. Herrscht im Künischen Gebirge und der Lackenburg Glimmerschiefer, so hat man Hornblendeschiefer im Bereich des Hohen Bogen, aus Gneis besteht der Zug Kaitersberg-Arber, Gneis und Granit setzen das flache Plateau des Brunster Waldes zwischen Eisenstein und Seewiesen zusammen. Nur an den höchsten Partien des Waldgebirges kommen schroffe Formen vor, wo eiszeitliche Gletscher Kare herausmodelliert haben, an deren Boden heute oft Seen liegen (Großer und Kleiner Arber-See, Teufels- und Schwarzer See). Die Längstäler folgen gelegentlich, wie der weiße Regen Gesteinsgrenzen, aber im allgemeinen sind sie von der Gesteinsbeschaffenheit ebenso unabhängig wie die Rücken. Der Talzug Kötzting-Bodenmais-Zwieselberg, den verschiedene Flüsse entwässern, scheidet die höheren Partien des Böhmer Waldes von dem breiten Streifen weniger hohen Landes, in das der Schwarze Regen mit unregelmäßigen Mäandern tief eingeschnitten ist. Weiter gegen Südwesten erhebt sich der Bayerische Wald (Predigtstuhl, Südwestecke). — Man kann sich die Gesamtheit der Erscheinungen durch die Annahme erklären, daß eine Rumpffläche älterer Gesteine mit stellenweise auflagernden, weicheren mesozoischen Gesteinen, wie solche weiter westlich am Regen vorkommen,

verworfen worden ist, daß dann eine anhaltende Abtragung die Schollen abrundete und im Talzug Kötzting-Bodenmais-Zwieselberg eingesunkene mesozoische Gesteine ausräumte.

In der Senke zwischen Böhmischem und Bayerischem Wald finden sich Einzelsiedelungen. Hier wird auf dem Rodungsgebiet mäßiger Ackerbau betrieben. Ausgedehnte Forsten bedecken das Gebirge, aus denen nur die höchsten Gipfel kahl herausragen. Der Holzreichtum begünstigt Glasindustrie (Eisenstein); bei Bodenmais wird unbedeutender Bergbau betrieben. Der Lokalverkehr folgt den Längstälern, der Verkehr über das Gebirge sucht heute wie in allen Zeiten die Einsenkung bei Eisenstein zwischen den geschlossenen Kämmen des Künischen Gebirges und des Lackenberg auf, die die Reichsgrenze tragen. Diese steigt nur an der Paßstraße abwärts.

Blatt 590: Stuttgart

(südöstlich anstoßend Blatt 606: Göppingen).

Die nähere Umgebung der württembergischen Hauptstadt zeigt den Gegensatz zwischen der süddeutschen Muschelkalkplatte und den Keuperstufen.

Die erstere bildet nördlich von Stuttgart eine sehr flache Aufwölbung, welche sich in Nordostrichtung schräg über das Blatt hinwegzieht. Unter ihr tritt am äußersten Südwestrand bei Hausen der Buntsandstein noch eben zutage, bedeckt von unterem Muschelkalk (Wellenkalk). Über diesem erhebt sich der Hauptmuschelkalk, eine Schichtstufe bildend, die wir auf unserem Blatte vom Schallberg bis Kugelberg, bis Betzenbuckel (alle im Südwesten des Blattes) verfolgen können. Die höheren, über 400 m gelegenen Partien dieser Schichtstufe sind unfruchtbar und tragen Wald, wo aber in der Mitte des Blattes der Muschelkalk tiefer liegt, und wo er von diluvialem Lehm und Löß überdeckt wird, reichen Ackerbau. Umsäumt wird diese fruchtbare Gegend im Südosten, Osten (außerhalb des Blattes) und im Nordwesten von waldigen Höhen, die steil zur Tafel abbrechen, das ist die Schichtstufe des Keupersandsteins. Diese beginnt im Süden mit dem Kammerforst, erstreckt sich tief ausgelappt bis Fellbach, östlich Stuttgart, sie zieht quer über das Nachbarblatt Gmünd nach Norden und erreicht bei Groß-Bottwar die Nordostecke unseres Blattes, von wo wir sie, nach einer durch das breite Neckar-Tal bewirkten Unterbrechung, im Norden unseres Blattes bis zu dessen Nordwestecke verfolgen können. Hier gehören ihr die Höhen um Schützingen-Gündelbach an. Im Innern dieses Amphitheaters bezeugt der Zeugenberg des Hohenasperg, daß sich der Keuper einst über das ganze Muschelkalkgebiet hinweg erstreckte. Es ist also das Gebiet des Blattes eine einzige große Nische der Keuperstufe,

die ausgeräumt ist bis hinab zur Muschelkalkplatte, dem Strohgäu. Diese breite Nische wird quer vom Neckar durchflossen, der im Süden im breiten Tal aus der Keuperstufe heraustritt und den Muschelkalksattel in stattlichen Windungen durchschneidet, um sie im Norden in noch breiterem Tal wieder zu verlassen. Ihm fließt, im allgemeinen sich an die Längsachse der Aufsattelung haltend, von Westen her die Enz zu, gleichfalls im Muschelkalkgebiet stark mäandrierend (fast abgeschnittener Mäander bei Roßwag).

Die steilen Berggehänge tragen heute Weinbau (Stuttgart, Enz-Tal und an den Prallgehängen des Neckar-Tales), die Diluvialaufschüttungen reichen Ackerbau. Hier liegen vornehmlich die älteren Dörfer und kleineren Städte, während die älteste Stadt aus der Römerzeit, Cannstatt, an dem weiten Austritt des Neckars aus der Keuperstufe liegt. Hier das Stammschloß Württemberg. Das Gebiet der Karte bildet den Mittelpunkt des Königreichs, seine Hauptstadt, eine Schöpfung der Fürsten, liegt um das Schloß in lieblichem, abgeschlossenem Talkessel der Keuperstufe. Sie ist mit Cannstatt zusammengewachsen. Nördlich befindet sich die zweite Residenz Ludwigsburg, erst 1725 mit geradlinigem Straßennetz gegründet. Von hier führt die geradlinige Basis der Landesvermessung zum Schloß Solitude. Am Neckar der Geburtsort Schillers, Marbach. Die Eisenbahnen meiden die gewundenen Täler und führen auf der Muschelkalktafel, sie konvergieren gegen Stuttgart, können es aber nur in Tunneln erreichen.

Blatt 606: Göppingen

(nordwestlich anstoßend Blatt 590: Stuttgart).

Blatt Göppingen stellt, ebenso wie Blatt Bamberg, einen Teil der Jura-Stufe dar, welche Schwaben und Franken durchquert, und zwar jenes Stück der Schwäbischen Alb, das gewöhnlich Rauhe Alb genannt wird.

Die Höhen der Alb steigen, je weiter zum Schwarzwald, desto beträchtlicher an; sie erreichen in der Rauhen Alb 844 m, gegen 566 m auf Blatt Bamberg. Daher haben wir hier eine großartigere Ausgestaltung der wesensgleichen Landschaft. Auch hier bildet bei dem konkordanten, SSO-Einfallen der Schichten der am Nordrand auftretende Sandstein des Keupers die bewaldeten milden Höhen der ersten Schichtstufe, nach der das fruchtbare Gebiet des Lias sanfte, mit Feldern bebaute und reich besiedelte Auen bildet. Über diesen erhebt sich die bewaldete Vorstufe des Eisensandsteins des Braunen Jura (Dogger), von Linsenhofen über Dettingen-Unter-Teck, dann schmaler werdend über Eckwälden, Fuchseckhof, Grünenberg, um in den Höhenzügen nördlich Süssen, Donzdorf breiter anzuschwellen. Diese Stufe wird überragt von dem höheren Steilabfall der waldlosen Hochfläche der aus Malmkalk (Weißer Jura) bestehenden Rauhen Alb. Die Höhe der Alb ist nahezu eben, mit nur kleinen Wellen, sie ist aber keine Schicht-

fläche, sondern schneidet die verschiedenen, nach Südosten fallenden Schichten des Weißen Jura eben ab. Der Abfall ist im Westen in regelmäßiger Weise durch Stirnflüsse stark zerfranst. Im Osten hat einer dieser Stirnflüsse den Oberlauf eines der wenigen Täler angezapft, welche sich durch die Rauhe Alb zur Donau richteten (dem alten Tal folgt heute die Eisenbahn nach Ulm). Dadurch wurde ein alter stattlicher Nebenfluß des Tales, die Fils, dem Neckar zugeführt, sie hat bei Altenstadt (am Ostrand) ein Ablenkungsknie. Durch das rasche Einschneiden der Fils entstand eine besonders starke Zerfransung des Alb-Randes, die zur völligen Auflösung des Plateaus in einzelne vorgelagerte Auslieger geführt hat. Andere Zeugen einer früher weiteren Ausdehnung der Alb sind der Hohe Staufen und Stuifen am Nordrand.

Zu diesem durch die Schichtlagerung bedingten, reichen Relief treten noch formbildend viele kleine Vulkanausbrüche, die teilweise bei leicht verwitterndem Material Vertiefungen oder Nischen in der Schichtstufe bilden (noch zu erkennen an der Torfgrube und an der Nische nördlich Randeck, beides bei Ochsenwang), aber meist als Tuffberge mit Basaltkern herausgewittert sind (Jusiberg am Westrand, der Neuffen, Limburg, Aichelberg).

Die Siedelungen häufen sich vornehmlich im Gebiet des Lias, hier liegen auch an den Flüssen die größeren Städte mit rein quadratischem Straßennetz. Im Gebiete des Kalkes dagegen werden die tiefen, wasserreichen Täler bevorzugt. Die wenigen Siedelungen auf der kahlen Hochfläche sind auf künstliche Wasserzufuhr (Reservoire) angewiesen, da in dem durchlässigen, höhlenreichen Gestein (Falkensteiner, Gutenberger, Schertels-Höhle) alles Wasser sofort versiegt. Der Steilabfall, sowie die Auslieger sind gekrönt mit vielen Ruinen alter Burgen der edelsten deutschen Geschlechter.

Blatt 624: Freising

(südlich anstoßend Blatt 638: München).

Blatt Freising ist das erste der sechs Blätter (Freising, Landsberg, München, Weilheim, Murnau, Mittenwald), die, als ganzes zu betrachten, ausgewählt sind zur Charakteristik des Alpenvorlandes und der Glazialerscheinungen der Alpen. Blatt Freising umfaßt das tertiäre Hügelland außerhalb der eiszeitlichen Aufschüttungen, sowie mit dem südlichen Blatt München zusammen die Münchener „Schiefe Ebene".

Mit großer Deutlichkeit hebt sich das aus jungtertiären Sanden und Mergeln bestehende Hügelland heraus, in das die Schotterflächen der letzten Eiszeit (Würm-Eiszeit) eingesenkt sind. Sie bilden die schiefe Ebene von München (siehe Blatt München) und das von ihr abzweigende Tal der Amper.

Die schiefe Ebene von München ist entstanden durch Aufschüttung der dem Isar-Gletscher entströmenden Wasser, welche dabei seitwärts drängten, die Täler des tertiären Hügellandes abschnitten (bei Giggenhausen, Freising) und das Tal von Marzling köpften, so daß heute die Eisenbahn von Freising nach Landshut einem Trockental folgt. Auch das abzweigende Tal der Amper dürfte ein solches geköpftes Tal sein, in das dann die mit Schotter beladenen Wasser von Süden her eindringen konnten. Die Isar fließt zwischen sich oft verschiebenden Sandbänken im Niveau der schiefen Ebene, das Grundwasser tritt heraus und bildet Veranlassung zu Vermoorungen; rechts von ihr senkt sich das große Erdinger Moos auf dem Blatte von 477—453 m; vom Dachauer Moos, links von ihr, ist nur das Nordende mit ausgedehntem Torfstich zu sehen. Im tertiären Hügelland heben sich einige größere, versumpfte Täler (Ilm und Glonn) hervor die kleinen Täler zeigen eine auffallende Asymmetrie der Gehänge, das westliche Gehänge ist sanft, mit Löß und daher mit Feldern bedeckt, das östliche Gehänge ist steil, lößfrei und waldbedeckt. Wo Löß und Verwitterungslehm der tertiären Mergelunterlage auftritt, findet sich reicher Ackerbau, sonst Wald. Die vielen kleinen Siedelungen bleiben auf das Tertiärhügelland beschränkt, die Bevölkerungsdichte ist erheblich größer als auf der schiefen Ebene, deren Moorflächen neuerlich in Kultur genommen und kolonisiert werden (Hallberg-Moos).

Blatt 637: Landsberg i. B.

(östlich anstoßend Blatt 638: München, südlich Blatt 650: Weilheim).

Die vier übereinander liegenden Blätter Landsberg, Weilheim, Murnau, Mittenwald zeigen die Entwickelung des diluvialen Loisach-Gletschers, des größten Armes des Isar-Gletschers vom Hochgebirge bis zum Moränen-Vorland und die durch ihn bedingte Oberflächenform dieses Teiles der Alpen und des Vorlandes; Blatt Landsberg ist das nördlichste, es stellt also das Moränengebiet dieses Gletschers dar.

Die jüngste eiszeitliche Vergletscherung der Alpen hat auf unserem Blatte ein System von Moränenbögen hinterlassen, deren äußerster sich von Lengenfeld am Südrand über Schöffelding, Geltendorf, Wildenroth, Ober-Pfaffenhofen, Hadorf hinzieht, wo er rechtwinklig umbiegt und auf dem Nachbarblatt München als Umrandung des Kochel-See—Staffel-See-Gletscherarmes erscheint. Konzentrisch verlaufen meist niedrigere Bögen von Rückzugsstadien des Eises zu diesem ersten, zwischen sich Täler lassend (Windach-Tal). Im Osten des Ammer-Sees aber spalten sie sich, umlaufen teilweise den Wörth-See, teilweise den Ammer- und umbiegend den Pilsen See. Die Seen erfüllen durch Glazialerosion geschaffene Zungenbecken. Das

Nordende des Ammer-Sees ist vermoort, wie auch der Pilsen-See durch Vermoorung von ihm getrennt ist. Noch weiter nach Norden als die letzte Vergletscherung der Würm-Eiszeit reichte die zweitletzte, die der Riß-Eiszeit, deren Moränen, oberflächlich nicht so scharf ausgeprägt, die weite kuppige Landschaft außerhalb der Würm-Moräne bis zur Linie Landsberg, Beuerbach, Hochdorf einnehmen und am Nordrand des Blattes gerade an das Tertiärhügelland stoßen. Beiden Eiszeiten entsprechen Schotterfelder vor den Moränen, und zwar haben die Ströme der Würm-Eiszeit sowohl die Moränen wie die Schotterfelder der Riß-Eiszeit durchtalt. So ziehen sich Würm-Schotter von Wildenroth nach Maisach-Olching, sowie über Babenriedt, Mammendorf nach Maisach, indem sie eine Insel von Rißmoränen zwischen sich lassen und Vertiefungen der Rißmoränen-Landschaft abdämmen, die heute das Haspel-Moor erfüllt. Am Lech aber durchtalen die Würmschotter als Niederterrassenschotter des Lechfeldes die rißeiszeitlichen Hochterrassenschotter von Scheuring bis Unter-Bergen. Der Lech fließt verwildert auf den Würmschottern.

Wie in Nord-Deutschland, so ist auch hier das Moränengebiet ausgezeichnet durch den Wechsel an Fruchtbarkeit. Mischwald tauscht mit Nadelholz und Feldern. Die im Norden meist versumpften Schotterfelder sind wenig fruchtbar. Auf dem Lechfelde, wo 955 Otto I. die Ungarn schlug, liegt daher heute ein Truppenübungsplatz. Das Gelände bot der Anlage von Eisenbahnen keine Schwierigkeiten, gegen Osten konvergieren die Linien nach München, im Nordwesten gegen Augsburg.

Blatt 638: München

(nördlich anstoßend Blatt 624: Freising, westlich Blatt 637: Landsberg).

Die „Schiefe Ebene" von München, jenes für das Alpenvorland und das Verständnis eiszeitlicher Ablagerungen so wichtige Gebilde, umfaßt die Umgebung der bayerischen Hauptstadt.

In der Südwestecke des Blattes ist noch von Mühlthal bis Wangen die Endmoräne der letzten Würm-Vereisung zu erkennen, die, von Buchenwald gekrönt, bogenförmig nach Südosten verläuft. Hinter der Endmoräne ist die Vertiefung des Zungenbeckens, das vermoorte Nordende des Starnberger Sees, zu erkennen. Vor ihr lagern sich die ebenen Schotterfelder dieser Vereisung, die die ganze Münchener Schiefe Ebene erfüllen. Sie senken sich von 600 m bis 480 m auf Blatt München erst steiler, dann langsamer. Die Flüsse Isar und Würm fließen in den oberen Partien in sie eingeschnitten, in den unteren dagegen im Niveau der Fläche, hier verwildernd. Sie bilden den Grundwasserspiegel des durchlässigen Materials. Es sind daher die südlichen, mit Fichten bedeckten Riedelflächen trocken, hier versickern die Bäche (Hachinger Bach bei

Perlach), im Norden dagegen tritt das Grundwasser heraus, ausgedehnte Vermoorung mit vielen Bächen greift auf der nassen Ebene Platz (Dachauer Moos zwischen Würm und Amper u. s. w.). An der Grenze beider liegt ein Streifen Ackerland. Hier führen die Verkehrslinien quer über das Alpenvorland, hier liegt München. Die Münchener Schiefe Ebene unterscheidet sich dadurch von dem westlichen Alpenvorland, daß die Schotter der jüngsten Eiszeit sich über die der älteren häufen. Die den Resten der Rißmoräne der zweitletzten Vereisung (im Forstenrieder Park) vorgelagerten Hochterrassenschotter liegen also hier unter der Ebene. Nur bei München ragen letztere von Giesing bis Ismaning darüber auf. Im Südosten tritt bei Egmating schon die Würm- oder Jungmoräne des östlichen Inn-Gletschers auf, dem die Hochterrasse am Ostrande des Blattes entspricht.

Die Siedelungen nehmen den Gürtel zwischen der nassen und trockenen Ebene ein, sind aber in die Waldgebiete vorgedrungen, indem ihre Fluren rund um das geschlossene Dorf gerodet wurden (Hohenbrunn u. s. w.). München selbst ist als Hauptstadt zu charakterisieren, die es schon 1255, bald nach seiner Gründung wurde. Mit der Größe des Landes wuchs die Größe der Stadt. Der ovale Kern mit unruhigem Straßennetz zeigt die mittelalterliche Stadt, darum gruppiert sich die Erweiterung mit Beginn der Neuzeit, deren bis Beginn des 19. Jahrhunderts erhaltene Umwallung sich deutlich im Grundrisse ausspricht. Um sie herum ist seither das regelmäßige Straßennetz mit vielen Kunstbauten erwachsen. Neuerdings liegt Münchens Bedeutung in seiner Eigenschaft als Residenz- und Kunststadt, aber auch als Verkehrsstadt. Hier laufen von Norden her zwei Eisenbahnlinien in die über Rosenheim führende Brenner-Linie zusammen und schneiden sich mit der Linie Wien-Paris. Dazu gesellen sich zahlreiche Lokalbahnen.

Blatt 642: Gebweiler.

Blatt Gebweiler stellt den südlichsten Teil der Hoch-Vogesen mit ihrem höchsten Gipfel, dem Großen Belchen (1423 m), sowie den Abfall derselben zu der Mittelrheinischen Tiefebene dar.

Das vornehmlich aus Kohlensandstein und Granit, sowie aus Porphyr (nördlich Thann) bestehende, früher von mesozoischen Schichten bedeckte Grundgebirge wurde in der Tertiärzeit durch den Einbruch des Rhein-Grabens von dem Schwarzwalde getrennt. An dem Bruche sanken Teile des Grundgebirges mit der mesozoischen Decke in die Tiefe, die in Staffeln erhalten sind. Es sind diese auch heute noch orographisch deutlich zu erkennen, so die laubwaldgekrönte Buntsandsteinstaffel östlich Osenbach (am Nordrand) bis Gebweiler, der eine Jura-Staffel östlich Westhalten

vorlagert. Die tiefe und nahe Erosionsbasis der Rhein-Ebene bedingt eine starke Durchtalung des Gebirges. Überreste einer alten greisenhaften Oberfläche, von der die mesozoische Decke schon verschwunden war, sind nur noch in dem Gipfelniveau der beiden Hauptkämme zu erkennen. Der östliche Kamm, der nur bei dem Drehkopf etwas Plateaucharakter erhält, zieht sich vom Batteriekopf am Nordrand mit einer Abzweigung zum Langenfeldkopf bis zum Belchen und Molkenrain hin, wo er hoch über dem Rhein-Tal endet. Der Westkamm trägt die Reichsgrenze, an ihm liegt die Mosel-Quelle. Zwischen beiden Kämmen verläuft das tiefe Thur-Tal, dem das Lauch-Tal im Norden, das Doller-Tal im Süden an die Seite tritt. Die eiszeitliche Vergletscherung hat den meisten Talanfängen an den Kämmen Karformen aufgedrückt, die mit ihren Steilwänden gegen die flache Wölbung der Kämme absetzen. Besonders großartig war die Entwicklung des durch West-Exposition begünstigten Mosel-Gletschers. Im Thur-Tal schob sich, von beiden Seiten aus Karen gespeist, ein 14 km langer Gletscher bis Wesserling, im Doller-Tal ein 9 km langer bis Kirchberg vor, vom Großen Belchen (Karsee) reichte ein 5 km langer Gletscher bis Lautenbach. Eiszeitliche Schuttkegel schließen sich an die Ausgänge aller Täler, deren Flüsse von dem noch größeren Rhein-Schuttkegel nach Norden abgedrängt werden. Die Schottermassen tragen im Rhein-Tal ausgedehnte Wälder, die Lößgebiete Ackerbau, die verwilderten Flüsse begleiten Wiesen.

Der Mensch bewohnt nur die tieferen Regionen, die Siedelungen drängen sich in der Lößregion am Rande des Rhein-Tals, sowie in den weiten Tälern. Jeder Talausgang ist durch eine größere Siedelung ausgezeichnet. Am Ausgang der die Vogesen im Süden begrenzenden burgundischen Pforte (südlich des Blattes), zu der sich auf dem Blatte die Höhen erniedrigen, liegt die Hunderttausendstadt Mülhausen, eine regelmäßig gebaute Industriestadt. Der Verkehr folgt dem Rhein-Graben und dem Kranz der Siedelungen an seinem Rande. Nur Stichlinien führen in die drei Haupttäler, die naturgemäß nach dem Rhein-Tal gravitieren. Der geschlossene westliche Hauptkamm bietet eine natürliche Völkerscheide (Reichs- und Sprachengrenze) und wird nur von dem tiefeindringenden Thur-Tal aus in drei über 800 m hohen Pässen (Col du Bussang, Col du Ventron, Col du Bramont direkt nördlich des Blattes) schwer überwunden. Die tiefen Regionen tragen Ackerbau und Wald, das Rheintalgehänge Weinbau, dann folgt Wald bis zur Baumgrenze, über die die höchsten Gipfel hinausragen.

Blatt 644: Freiburg i. Br.

(östlich anstoßend Blatt 645: Tuttlingen).

Blatt Freiburg i. Br., das die Höhenpartien des südlichen Schwarzwaldes zur Darstellung bringt, erscheint durch die der Gradeinteilung

folgende Blattbegrenzung nicht sehr günstig geschnitten. Die Ostabflachung des Gebirges und die Höhenregionen sind gut ausgeprägt, der Westabfall zum Rhein-Graben, der tiefen Erosionsbasis aller Westtäler, ist nur in der Nordwestecke bei Freiburg zu erkennen und tritt nicht entsprechend seiner Großartigkeit und seiner morphologischen Bedeutung hervor. Der Hauptteil des Blattes wird eingenommen von den Gneisen und Graniten des Variskischen Grundgebirges, dem auch ein von Schönau bis Bernau West-Ost streichender karboner Sandsteinzug angehört. Im Osten aber lagern sich in der Linie Schollach, Neustadt, Grafenhausen die Trias mit einem dem Südwestdeutschen Gewölbe entsprechenden Ostfallen über das Grundgebirge, und zwar zuerst ausgedehnte Wälder tragender Buntsandstein, dann südöstlich Rötenbach waldloser Muschelkalk, dem auf dem Nachbarblatt Tuttlingen Keuper und Jura folgen. Die reliefschaffende Entwässerung schreitet vom jungen Rhein-Graben und dem tiefen und breiten Dreisam-Tal bei Freiburg rückwärts; soweit sie zurückgreift, besteht reicher Wechsel von Berg und Tal. Tiefe, im Unterlauf oft jugendliche Täler (Höllen-Tal) finden sich neben den höchsten Gipfeln. Diese bilden Reste eines Gipfelniveaus: Schauinsland bei Hofsgrund über Härnle zum Belchen 1350 m; es ist durch Erosion getrennt von den im Feldberg 1493 m sich treffenden Kämmen, die fast gleiche Höhen aufweisen, so der Kamm mit dem Hinterwaldkopf und Horneck, mit dem Totenmann, mit dem Stübenwasen, mit dem Grafenmatt bis zum Sengalenkopf und endlich dem Hochkopf, Schnepfhalde, Bötzberg. Die konsequente Ostentwässerung hat ruhigere Formen geschaffen. Sie schneidet sich bis auf den harten Granituntergrund in das Deckgebirge ein. Dieses ist aber in größeren Partien nur dort enthalten, wohin die rings um den Schwarzwald greifende Belebung der Erosion zum Rhein, die Folge des Einbruchs des Rhein-Grabens, noch nicht rückwärts gelangt ist. Ebenfalls finden wir auch hier nur, nördlich des Titi-Sees, Reste einer greisenhaften Landschaft. Zu diesen mannigfaltigen Formen tritt die Bereicherung, die durch die eiszeitliche Vergletscherung im einzelnen hervorgerufen ist. Die Talanfänge sämtlicher in der Höhenregion entspringenden Bäche tragen Karformen mit steilen Karwänden und flachen, teilweise noch Seen bergenden Boden (Feldsee), die glazial ausgearbeiteten Täler haben im Titi- und Schluch-See Moränen-Stauseen.

Das tiefzertalte Waldgebirge, das nur in den höchsten Partien über die Waldgrenze hinausragt, bietet dem Verkehr und der Besiedelung große Hindernisse. Als wichtiger Paß kommt vornehmlich der in Verlängerung des konsequenten Wutach-Gutach-Tales liegende Höllental-Paß in Frage, der die Breitnau-Steiger Landschaft und weiter das Donau-Gebiet mit dem volksreichen Dreisam-Tal und über Freiburg mit dem Rhein-Tal verbindet. In den tieferen Tälern finden sich geschlossene Ortschaften mit

reger Hausindustrie (Uhren) und Ackerwirtschaft, die in den höheren Regionen den Einzelhöfen mit Viehzucht weichen.

Blatt 645: Tuttlingen

(westlich anstoßend Blatt 644: Freiburg).

Viel gestaltet ist das Gebiet des Blattes Tuttlingen.

Im Westen die sanfte Ostabdachung des Schwarzwaldes, in der Mitte der Beginn der Schwäbischen Alb, im Südosten ein Stück Alpenvorland, das Gebiet des diluvialen Rhein-Gletschers. Das Interessanteste aber am Blatte ist die Geschichte der Entwässerung und die durch sie bedingten Oberflächenformen.

Als Fortsetzung des Ostabfalls des Schwarzwaldes, den das Nachbarblatt Freiburg i. Br. darstellt, erscheint im Nordwesten des Blattes die dünne, waldbedeckte Buntsandsteintafel, die in den Tälern bis zum Granit durchschnitten ist. Da die Schichten südöstlich einfallen, so folgen in dieser Richtung stets jüngere Schichten, die je nach wechselnder Härte und Durchlässigkeit Schichtstufen an ihrem Ausstreichen gebildet haben. Die Muschelkalkstufe verfolgen wir von Wolterdingen, Bräunlingen nach Löffingen, die Lettenkohle des Keupers bedingt die sumpfigen Gebiete östlich Donaueschingen, über die die Sandsteine derselben Formation eine Stufe mit sanftem Abfall bilden. Weiter folgt weicher Lias, über dem sich Brauner Jura (Dogger), besonders aber die Kalke des Weißen Jura (Malm) in imposanter Schichtstufe erheben, die sich von Öffingen über Geisingen, Fürstenberg, Eichberg, Buchberg zum Hohen Randen erstreckt. Jenseits des Randen-Bruches folgt in den Südostpartien tertiäre Nagelfluh. Die Entwässerung fand ursprünglich im Sinne der Abdachung konsequent, d. h. von Westen bzw. Nordwesten her statt; es ist dies noch heute die Richtung der Breg-Donau. Die im Streichen fließenden subsequenten Flüsse räumten die weicheren Schichten fort und zapften die konsequenten Flüsse an, so daß Trockentäler (zuweilen mit winzigen Bächen), Unterläufe der alten Flüsse, von Geisingen bis Tuttlingen den Jura in Denudationsdurchbrüchen durchqueren. Im Süden des Blattes aber wurde durch den Einbruch des Mittelrhein-Grabens die Erosionsbasis der Wutach tiefer gelegt, diese bekam größere Erosionskraft und zapfte einen Abdachungsfluß an, der noch zur Diluvialzeit im Wutach-Aitrach-Tal floß, verjüngte dadurch den Oberlauf, sowie alle Nebenflüsse des Systems, die heute tiefe, steile Täler besitzen, und ließ vom Blumberg bis Hausen einen breiten, vermoorten Taltorso zurück. Neuerdings wird die Donau, wie sie oberirdisch durch die Wutach einen Hauptquellarm verlor, wie sie in nicht zu ferner Zeit die Breg durch die kräftige Rückwärts-Erosion bei Hausen-Vor-Wald verlieren wird, so auch unterirdisch vom Rhein abgezapft. Der größte Teil des Donauwassers

versickert zwischen Immendingen und Tuttlingen (dicht unterhalb der Höhenzahl 654 der Karte) im durchlässigen Kalk, um 13 km weit in der Aach-Quelle (außerhalb des Blattes, hier im Südosten nur die Aach) hervorzutreten. So ist also die Steilheit der Formen im Südosten der Jugendlichkeit der Entwässerung zum Rhein zuzuschreiben, während im Nordosten die Erosion zur Donau vornehmlich durch die Durchlässigkeit des Gesteins bedingte steile Formen geschaffen hat. Endlich ragen vulkanische Durchbrüche von Phonolith und Basalt im Wartenberg, Hohenhöwen, Hohenstoffeln und Hohentwiel hoch heraus, durch ihre Härte die durchbrochenen Schichten vor der Abtragung schützend. Der Rhein-Gletscher der Alpen hatte in der Würm-Eiszeit etwa eine Randlage von Engen um den Hohenstoffeln herum bis zu den Höhen an der Biber, die Riß-Eiszeit reichte etwas weiter, ließ aber den Hohenhöwen außerhalb. Um die Zunge des Rhein-Gletschers herum flossen die Wasser der Gegend von Engen ins heutige Biber-Tal. Die Eiswirkung erkennen wir an den weiten, dem Jura sonst fremden Talungen.

Die Siedelungen meiden die bewaldeten Höhen des Jura; sie finden sich in den Tälern, vornehmlich aber in den fruchtbaren Gebieten des Lias und der eiszeitlichen Ablagerungen. Dem Verkehr schreiben die Täler die Richtung vor, die Bahn muß den großen Höhenunterschied der jungen Abzapfung in großen Kehren überwinden.

Blatt 650: Weilheim

(nördlich anstoßend Blatt 637: Landsberg, südlich Blatt 663: Murnau).

Blatt Weilheim bietet die südliche Fortsetzung des Blattes Landsberg. Alle Züge dieses Blattes werden hier weitergeführt. Wir sind also vornehmlich im Zungenbecken des Eiskuchens des Isar-Gletschers der Würm-Eiszeit, der sich in die Unterteile des Loisach- und des Kochelsee-Walchensee-Gletschers spaltet. Im Zungenbecken des vom Kochelsee-Walchensee kommenden Gletschers liegt der Würm-See, in dem des Loisach-Gletschers (die Gletscher werden nach den Alpenländern benannt, aus denen sie stammen) der Ammer-See. Beide werden von den Endmoränenkränzen umzogen, die den jeweiligen Rückzugsstadien der Gletscher entsprechen. Diese laufen daher an beiden Seiten des Ammer-Sees fast nordsüdlich (bei Andechs deutlich sichtbar) und scharen sich spitzwinklig mit denen um den Würm-See. Östlich Weilheim haben wir in den kleinen isolierten, nordwestlich gerichteten Hügeln eine typische Drumlin-Landschaft, wohl entstanden aus alten Endmoränen, über die die Würm-Eiszeit hinwegführte. Zwischen den Hügeln liegen Seen (so der seichte Oster-See mit seinen Inseln) oder schon vermoorte Partien. Das Endstadium der Würm-Eiszeit haben wir auf Blatt

Landsberg verfolgt. Die Endmoräne betritt bei Hagenheim im Westen das Blatt und führt bis Reichling, wo sie der Lech abschneidet. Im Westen legt sich vor ihn ein schmaler Streifen Endmoränen-Landschaft der Riß-Eiszeit bis zum Lech. Der Lech ist eingeschnitten in die Niederterrassenschotter der Würm-Eiszeit. Sie beginnen bei Kinsau an der westwärts ziehenden Endmoräne, bis zu der der kleinere Ammer-Gletscher reichte. Oberhalb hat der Lech bei Schongau einen Umlaufberg gebildet. Weiter östlich haben wir in Hohen-Peißenberg eine Molasseaufragung, das erste Anzeichen der Alpenauffaltung. Ein länger andauerndes Rückzugsstadium des Eises (Bühlstadium) hinterließ von Böbing (am Südrand) bis zum Peißenberg und um diesen herum bis Weilheim und südwärts bis Eberfing orographisch nur teilweise gut erkennbare Endmoränen. Das erodierende Eis hat den aus härterer Molasse bestehenden Guggenberg als Rippe stehen lassen. Bei Peiting sowohl wie bei Weilheim schließen sich an die Moränen dieses Stadiums nach Norden Schotterfelder, von letzterer Stadt bis zum Ammer-See reichend, den sie, wie jetzt die Ammer, zuschütteten. Die Flüsse in das tiefe Zungenbecken dieses Stadiums bis Weilheim haben wegen ihrer stärkeren Erosionskraft die Ammer von ihrem alten Nordsüdlauf über Peiting abgezapft, so daß sie bei Ramsau ein scharfes Abzapfungsknie bildet.

Die je weiter zu den Alpen desto spärlicher werdende Besiedelung gewinnt in den Einzelhöfen mit ihrer Wiesenwirtschaft, die in der waldreichen Moränenlandschaft zerstreut liegen, schon alpinen Typus. Dörfer befinden sich nur im Norden, sowie auf den Schotterfeldern, soweit diese nicht vermoort sind.

Blatt 663: Murnau

(nördlich anstoßend Blatt 650: Weilheim, südlich Blatt 672: Mittenwald).

Blatt Murnau bietet den nördlichen Saum der Bayerischen Alpen, und zwar vornehmlich das Talgebiet der Loisach und Ammer. Hier befindet sich also der Austritt der eiszeitlichen Gletscher aus dem Gebirge, die wir auf Blatt Weilheim und Landsberg im Vorland verfolgten.

Die südlichen Partien des Blattes nimmt die Voralpenzone mit ihren Keuperdolomiten ein, die öfters Karlingsformen zeigen. Ihr lagern in dem markanten Westostzuge nördlich Schloß Linderhof bis zum Kochel-See stark gestörte Kreide und Juraschichten vor. Daran schließen sich nördlich die Zone der sanft gerundeten Flyschberge, vom Hohen Trauchberg bis zum Kochel-See, und weiter im Vorland die Molasserücken, die besonders um den Staffel-See und Rieg-See eine prächtige Schichtmulde bilden. Diese aufgefalteten Schichtenkomplexe haben ihre heutige oberflächliche Ausgestaltung erhalten durch die Entwässerung und die dieser

folgende Glazialerosion, die innerhalb des Gebirges in den Tälern dirigiert außerhalb aber selektiv wirkte. Westöstlich verlaufen Längstäler, die sich dem Wechsel der einzelnen Gesteine anschließen, sie werden durch Quertäler verbunden, die in ihrer Richtung der Gesamtabdachung des Gebirges folgen. Letztere sind besonders weit, so das Ammer-Tal mit der verbindenden Längstalstrecke, so das Loisach-Tal mit seiner weiten Trichtermündung und der Quertalzug von Wallgau über den Walchen-See und Kochel-See. Namentlich das Loisach-Tal zeigt mit seinem flachen Boden, steilen Wänden den Typus eines übertieften Glazialtales. Kein Seitental mündet gleichsohlig, alle hängen (Esterberg-Tal, Eschen-Laine-Tal, Gießenbach-Tal). Härtere Gesteine bilden Sporne (bei Oberau, Eschenlohe). Der Taltrog mündet, wie auch die Nachbartäler, mit großem Ausgangstrichter. Hier setzt die selektive Erosion ein, Flyschrippen sind im Murnauer Moos erhalten geblieben, die ausgeräumten Partien vermoorten. Vornehmlich aber ist die Schichtmulde der Molasse herauspräpariert, während das weichere Innere ausgeräumt wurde, so daß es heute trotz großer Moränenauffüllung die Becken des Staffel- und Rieg-Sees birgt. Die Loisach biegt dem Rücken nach Osten aus und schüttet den Kochel-See zu. Die Ammer, fließt (siehe Blatt Weilheim) in das tiefe Zungenbecken des großen kräftigen Loisach-Gletschers, schafft sich jetzt, rückwärts erodierend, ein scharfes Tal in die Glazialaufschüttungen seines eigenen kleineren, daher weniger kräftigen Gletschers hinein. Die Erweiterung bei Ammergau entspricht einem Ruhestadium im Rückzug des Gletschers (Bühlstadium). Am Ostrand des Blattes ist in der Quertalung der 802 m hohe Walchen-See durch einen Felsriegel getrennt von dem Zungenbecken, in dem der nur 600 m hohe Kochel-See am Ausgangstrichter liegt. Die verwilderte Isar wendet sich nach Osten.

Die Einzelsiedelungen des Alpenvorlandes sind spärlich. In den Alpen selbst beschränken sich naturgemäß die Ortschaften auf die Täler, denen sich auch der Verkehr anpassen muß; im bewaldeten Gebirge gibt es nur Fußpfade und vereinzelte Hütten.

Blatt 667: Reichenhall.

Auf Blatt Reichenhall kommen die großen Kalkstöcke der Salzburger Kalkalpen zur Darstellung; sie nehmen den ganzen Süden und Westen ein und werden getrennt durch das tiefe und breite Lammer- und Salzach-Tal von dem niedrigeren Gebirge mit milderen Formen im Nordosten. Dieses letzte Gebirge wird zusammengesetzt aus Jurakalken, die auf weite Erstreckung völlig flach gelagert sind. Auf diesen Schichten ist, wie neuere Forschungen wahrscheinlich machen, der ganze Südwesten überschoben; er setzt sich zusammen aus Dolomit, dem Dachsteinkalk auflagert. Dieser

bildet die Kalkstöcke des kahlen Tennen- und Hagen-Gebirges und des Watzmann (2713 m), sowie die niedrigeren, bewaldeten des Untersberges und Lattengebirges. Die Oberfläche der kahlen Kalkplateaus ist durch die auflösende Wirkung des Regenwassers in unwegsame Karrenfelder verwandelt. Die Stöcke gruppieren sich um das tiefe Becken von Berchtesgaden, das durch das enge Tal der Ache zum Salzach-Tal entwässert wird, durch die Pässe des Hallturmes und von Schwarzbachwacht mit dem Saalach-Tal im Nordwesten verbunden ist. In dasselbe münden hängend Trogtäler, die ihre Formen der Einwirkung eiszeitlicher Gletscher verdanken. Das Wimbach-Tal endet an der Wimbachgriesalm mit prächtigem Trogschluß; sein Boden ist vermuhrt, der Riegel am Ausgang wird in einer Klamm durchsägt. Der König-See erfüllt ein steilwandiges Trogtal mit Trogschluß an der Fischunkelalm, ein Bergsturz hat den Obersee abgedämmt, ein Schuttkegel bei St. Bartholomä schnürt den See ein. Das zur Salzach führende Blüntau-Tal zeigt den Stufenbau eines Glazialtales, der Bach bildet Wasserfälle. Das Salzach-Tal selbst ist ebenfalls ein weites Trogtal. Die Salzach hat am Engpaß Lueg einen Riegel durchsägt und unterhalb das übertiefte, weite Tal aufgeschüttet. In den Karen der Gipfelregionen liegt heute noch am Watzmann ein kleiner Gletscher, am Hochkalter in geschützter Lage das tief unter der Schneegrenze liegende Blau-Eis.

Das Salzach-Tal ist ein seit alters benutztes Durchgangstal quer zum Gebirge, dem heute die Eisenbahn folgt. Sie durchsetzt den Riegel am Paß Lueg im Tunnel, während die alte Straße entlang der Salzach führt. Im weiten Tale häufen sich die Siedelungen. Hier beuteten schon die Römer den Salzreichtum (Hallein) des Untergrundes aus und gründeten Orte wie Grödig, Vigann. An das Auftreten des Salzes knüpfen sich die Solbäder Reichenhall und Berchtesgaden. Abgeschlossen vom Durchgangsverkehr liegt Berchtesgaden, ein Fremdenort in lieblichen Wiesen gelegen, dessen Bewohner Holzarbeiten verfertigen. Außerhalb der Täler finden sich nur Einzelsiedelungen der Almenwirtschaft.

Blatt 669: Oltingen.

Blatt Oltingen stellt den morphologisch wichtigsten Teil des Falten-Jura dar, diesen Typus eines Faltengebirges mit völlig intakten Falten (im Gegensatz zu den abgeschnittenen Falten auf Blatt Hameln).

Im Norden fällt das Südende des Rhein-Grabens noch eben in das Bereich des Blattes. An dasselbe schließen sich südlich die flach lagernden Schichten der Jura-Tafel. Je weiter nach Süden aber, um so stärker werden die Schichten in Falten geworfen. Zuerst ist die Kette des Blauen Berges noch niedrig, dann schwellen sie höher und höher an. An der Grenzzone des Tafel- und Falten-Jura tritt im Osten zwischen Bretzwil und Eptingen

Trias zutage. Im Südosten aber endet das hohe Faltengebirge steil gegen das Alpenvorland, gegen die von der Aare durchflossene Schotterfläche des Aar-Gletschers der Würm-Eiszeit. Im Westen des Blattes sind die Falten in der tektonisch einfachsten Form der Gewölbe erhalten, zwischen die sich breite Synklinaltäler (Comben) mit eingefalteten Tertiärschichten schieben. Auf die hohe Weißensteinkette (1395 m, Südrand), die nach Osten ausklingt, folgt das Synklinaltal von Welschenrohr bis Matzendorf, dann die Graitery bis Probstbergkette, das Tal von Münster (Moutier) und das Gulden-Tal, die Raimeux-Kette, das Tal von Delsberg (Delemont). Alle Antiklinalen, einfache Gewölbe, bestehen aus hartem Malmkalk (Weißer Jura). Nach Nordosten drängen die Ketten zusammen, gehen von Nordosten in reines Oststreichen über, die Synklinaltäler verschwinden, Antiklinaltäler mit schroffen, ausstreichenden Kalkmauern treten an die Stelle (Gebiet des oberen Lüssel-Tales), die das Gebirge weniger übersichtlich machen. Die Entwässerung des Falten-Jura findet durch Quertäler statt, die in Klusen (nördlich und südlich Moutier, bei Önsingen, Mümlisvil u. s. w.), zirkusartigen Ausräumungen des weichen Kernes bei hartem Gewölbe, die Ketten durchbrechen. Sie sind antezedent angelegt; in den Längstälern fließen ihnen Längsflüsse zu. Im Plateau-Jura hat im Nordosten die Ergolz tief erodiert, der Malmkalk (700 m) ist als Stufe erhalten geblieben (westlich Nuglar-Büren), unter ihm bildet der Hauptrogenstein des Schwarzen Jura die Randhöhen am Fluß (550 m).

Die Quertäler haben das Gebirge schon frühzeitig erschlossen, auch heute sucht sie der die einzelnen Tertiärbecken verbindende Verkehr auf. Diese tragen vornehmlich die Besiedelung auf reichen Wiesengründen. Die Sprachgrenze umgeht daher diese Synklinaltäler und hält sich zickzackförmig an die Höhen zwischen ihnen, sie weist das Gebiet von Delemont und Moutier der französischen Sprache zu. Auf den Höhen finden sich nur Einzelsiedelungen der Almenwirtschaft. Nur ein kleiner Teil des Blattes gehört zum Deutschen Reiche.

Blatt 672: Mittenwald

(nördlich anstoßend Blatt 663: Murnau).

Blatt Mittenwald umfaßt die wichtigsten Ketten der Bayerischen Kalkalpen mit dem höchsten Gipfel des Deutschen Reiches, der Zugspitze (2963 m). Bietet Blatt Murnau die Voralpenzone, so haben wir hier im südlich anstoßenden Blatt die Hochalpenzone der Kalkalpen, die am Inn-Tal gegen die Zentralalpen grenzen.

Klotzig heben sich die aus Wettersteinkalk bestehenden Ketten des Mieminger-, Wetterstein- und Karwendel-Gebirges, sowie die Solstein-Kette heraus. Der Hauptdolomit des Keupers im Gais-Tal und um

Seefeld, sowie nördlich Mittenwald und westlich der Linie Lermoos-Garmisch zeigt ruhigere Formen, ebenso die Partnachschichten in der Linie Eibsee-Barmsee (am Nordrand). Südlich des Inn setzen Gneise und Glimmerschiefer das zentralalpine Gebirge zusammen. Nordsüdlich verlaufende Quertäler, so vornehmlich das mittlere Isar-Tal und das obere Loisach-Tal, vereinigen sich mit ausgesprochenen Längstälern, wie das Gais-Tal und der Talzug am Nordrand. Dadurch ist das Gebirge restförmig gegliedert. Die einzelnen Ketten sind isoliert. Durch Kare sind sie beiderseits zerfressen und in Grate verwandelt (fiederförmiger Karlingsgrat des Mieminger Gebirges). Wo das diluviale Eis aber die Berge überschritt, treten an Stelle der Karlingsformen Rundlinge (so um Seefeld). Die heute an der Zugspitze noch vorhandene Vergletscherung (Schneegrenze 2900 m) ist nur ein spärlicher Rest der eiszeitlichen. Aus der Firnmulde des Platt schob sich der Gletscher über Stufen ins Tal, es trogförmig ausarbeitend. Aus allen Karen der Kalkalpen vereinigen sich in den Tälern die Eisströme, die durch den Seefelder Paß (Transfluenz-Paß) Zufluß von zentralalpinem, im Inn-Tal abwärtsfließendem und am Kalkgebirge getautem Eis bekamen. Das Blatt stellt also einen Teil des Nährgebietes der eiszeitlichen Gletscherströme dar, die wir auf Blatt Murnau, Weilheim und Landshut verfolgten. Die Seitentäler hängen über dem Haupttal, der Riegel wird vom Bach in jugendlichen Klammen durchsägt (bei Mittenwald die Leutaschklamm, bei Partenkirchen die Partnachklamm u. s. w.). In den Stufentälern und Karen liegen Seen (am Grünstein im Mieminger Gebirge). Die übersteilen Wände neigen zur Bergsturzbildung, die teilweise beträchtliche Größen annehmen. Der Eib-See ist durch einen Riesenbergsturz, der von der Nordseite der Zugspitze abging, abgedämmt, auf dem Fernpaß liegt ein anderes Bergsturzrevier mit Seen. Das stark übertiefte Inn-Tal, auf dessen aufgeschüttetem Talboden heute der Inn hin und her pendelt, wird von einer breiten eiszeitlichen Terrasse (etwa 830 m) begleitet.

Von den Pässen des Gebirges haben nur die in der Verlängerung der Quertäler liegenden Bedeutung bekommen, die das Vorland mit der natürlichen Verkehrslinie des Inn-Längstales und den Pässen der Zentral-Alpen verbinden. Besonders zur Zeit der Blüte von Augsburg und Venedig entwickelte sich am Fuße des Fernpasses Garmisch-Partenkirchen, am Ende des Seefelder Passes Mittenwald; sie haben heute an Bedeutung verloren. An diesen Paßstraßen und im Inn-Tal liegen die Ortschaften, im Gebirge nur Einzelsiedelungen und über der hohen Baumgrenze Almenhütten. Die Reichsgrenze schmiegt sich den Karlingsgraten an und überspringt an Engen, die die natürlichen Scheiden des vor- und inneralpinen Einflusses bilden, die Täler.

Verzeichnis von Karten des Deutschen Reiches 1:100000 mit bemerkenswerten morphologischen und siedelungskundlichen Einzelheiten.

Watten:
5 Hvidding
36 Föhr
110 Cuxhaven
140 Norden

Hallige:
5 Hvidding
36 Föhr

Marsch:
56 Husum
110 Cuxhaven
203 Bunde

Föhrden:
13 Apenrade
23 Flensburg
58 Kiel

Bodden:
42 Sagard
62 Barth
64 Bergen
121 Swinemünde

Kliff:
42 Sagard
64 Bergen

Nehrung:
3 Memel
8 Kinten
15 Sarkau
42 Sagard
47 Hela
62 Barth
64 Bergen
72 Frauenberg

Küstenhaken:
41 Wiek a. Rügen
64 Bergen

Ausgleichküste:
26 Ossecken
39 Kappeln
43 Lanzig
44 Stolpmünde

Delta:
8 Kinten
16 Rositten
71 Tiegenort
187 Stettin

Dünen:
Küsten-
3 Memel
5 Hvidding
8 Kinten
15 Sarkau
26 Ossecken
47 Hela
62 Barth
71 Tiegenort
121 Swinemünde
140 Norden
Inland-
249 Filehne
274 Birnbaum
299 Tirschtiegel
394 Niesky

Moor:
3 Memel
8 Kinten
101 Elbing
204 Leer
231 Haren
638 München

Vulkangebirge:
383 Arolsen
461 Grünberg i. Hess.

463 Geisa
489 Hildburghausen
494 Wiesenthal
630 Colmar

Maare:
482 Mayen
504 Cochem

Einbruchsbecken:
383 Coblenz

Bruchstufe:
336 Goslar
474 Frankenstein
494 Wiesenthal
544 Worms
642 Gebweiler

Graben:
360 Göttingen

Flexur:
413 Naumburg a. d. Saale

Faltung:
662 Füssen
663 Murnau
668 Pfirt
669 Oltingen

Schichtkämme:
284 Lübbecke
310 Hameln
311 Hildesheim
337 Halberstadt
473 Friedland i. Schl.

Schichtstufe:
532 Bamberg
568 Metz
575 Hall
606 Göppingen
619 Reutlingen
633 Sigmaringen

Auslieger:
590 Stuttgart
606 Göppingen
619 Reutlingen

Zeugenberge:
444 Königstein
469 Annaberg

Abdachungs-Entwässerung:
443 Dippoldiswalde
461 Grünberg i. Hess.
469 Annaberg

Quellen:
332 Gütersloh
620 Etzingen
638 München

Talterrassen:
163 Neuenburg
413 Naumburg a. d. Saale
673 Vereinsalpe
649 Kaufbeuren

Altwasser:
218 Gartz a. O.
325 Schrimm
616 Schlettstadt
630 Colmar i. E.

Mäander:
freie
353 Wesel
558 Mannheim
eingesenkte
466 Rudolstadt
504 Cochem

Talmäander:
45 Lauenburg i. Pomm.

Umlaufberg:
359 Uslar
524 Berncastel
558 Mannheim
559 Moosbach
594 Eichstätt

Trockental:
594 Eichstätt

Flußabzapfung:
437 Gotha

645 Tuttlingen
650 Weilheim

Talwasserscheide:
46 Neustadt i. Westpr.
633 Sigmaringen

Unterfähige Flüsse:
45 Lauenburg i. Pomm.
46 Neustadt i. Westpr.
87 Ribnitz

Rumpffläche:
336 Goslar
416 Döbeln
431 Waldbroel
444 Königstein
505 Boppard

Härtling:
336 Goslar
524 Berncastel

Ausräumung:
466 Rnudolstadt
523 Trier
590 Stuttgart

Aufwärtswandern der Erosion:
361 Nordhausen
504 Cochem
505 Boppart
617 Offenburg
657 Waldshut

Durchbruchstal:
483 Coblenz
558 Mannheim
579 Beilngries
614 Passau
642 Gebweiler
668 Pfirt
669 Oltingen

Cañon:
444 Königstein
575 Hall
579 Beilengries

Karst:
532 Bamberg
667 Reichenhall
674 Steinernes Meer

Gletscher:
672 Mittenwald
674 Steinernes Meer

Kare:
447 Hirschberg i. Schl.
629 Markirch
642 Gebweiler
644 Freiburg i. Br.
671 Hinterstein
672 Mittenwald
673 Vereinsalpe

Trogtal:
663 Murnau
664 Tegernsee
667 Reichenhall

Rippen:
662 Füssen
663 Murnau

Grundmoränenlandschaft:
58 Kiel
83 Eutin
105 Rastenburg

Sölle:
184 Neu-Strelitz
185 Woldegk
217 Schwedt

Drumlins:
650 Weilheim
659 Konstanz

Zungenbecken:
637 Landsberg i. Bayern
653 Traunstein

Endmoräne:
118 Teterow
254 Freienwalde
637 Landsberg i. Bayern
653 Traunstein