

Werk

Label: Zeitschriftenheft

Ort: Berlin

Jahr: 1914

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?391365657_1914|LOG_0150

Kontakt/Contact

[Digizeitschriften e.V.](#)
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

ZEITSCHRIFT DER GESELLSCHAFT FÜR ERDKUNDE ZU BERLIN

1914



No. 6

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES VORSTANDES VON DR. ALFRED MERZ.

INHALT.

	Seite	Seite
Vorträge und Abhandlungen.		Literarische Besprechungen 487
Dr. Karl Oestreich: Himalaya-Studien	417	G. Amtrup: Report on the Danmark Expedition to the north-east coast of Greenland 1906—1908.
Quaas: Zur deutschen Landeskunde. (VII. Eifelstudien)	452	— Karl Baedeker: Indien. — Joaquim Bensaude: L'Astronomie nautique au Portugal à l'époque des grandes découvertes. — Emil Deckert: Nordamerika. — Martin Hartmann: Reisebriefe aus Syrien. — Th. Herzog: „Vom Urwald zu den Gletschern der Cordillere“. — J. Scott Keltie and O. J. R. Howarth: History of Geography. — Em. Kayser: Lehrbuch der geologischen Formationskunde. — A. Philippon: Das Mittelmeergebiet. — Felix Speiser: Südsee, Urwald, Kannibalen. — Dr. Hans Spethmann: Studien zur Ozeanographie der südwestlichen Ostsee I. — Das Arbeitsgebiet des Kaiserlichen Statistischen Amts. — Oskar Kende: Handbuch der geographischen Wissenschaft.
Georg Schweinfurth: Gustav Nachtigal	469	
Kleine Mitteilungen	473	Eingänge für die Bibliothek und Anzeigen 500
Der Darß und Zingst. — Die Erforschung des Siachengletschers im Karakoram durch die Workman-Expedition 1911/12. — Das Erdbebengebiet des nördlichen Tianschan. — Bildung einer vulkanischen Insel im Westpazifischen Ozean. — Niederländische Forschungen in der Insulinde. — Die Wirkung der Erosion an der Verwerfungslinie von San Franzisko. — Ergebnisse von J. Bowmans Expedition in die Zentral-Anden 1913. — Das patagonische Inlandeis. — Die neue Hauptstadt von Australien. — Staatsgrenzen und Stromgebiete. — Der XIX. Deutsche Geographentag. — Wechsel im Generalsekretariate der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien.		Verhandlungen der Gesellschaft.
		Allgemeine Sitzung vom 13. Juni 1914 503
		Berichtigungen 504

BERLIN

ERNST SIEGFRIED MITTLER UND SOHN
KÖNIGLICHE HOFBUCHHANDLUNG
KOCHSTRASSE 68—71.

Preis des Jahrgangs 15 M.

Einzelpreis der Nummer 3 M.

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Haus der Gesellschaft: Wilhelmstraße 23.

Gestiftet am 20. April 1828. — Korporationsrechte erhalten am 24. Mai 1839.

Vorstand für das Jahr 1914.

Vorsitzender	Herr Hellmann.
Stellvertretende Vorsitzende	{ „ Penck.
Generalsekretär	{ „ v. Beseler.
Schriftführer	{ „ G. Kollm.
Schatzmeister	{ „ G. Wegener.
	{ „ O. Baschin.
	{ „ Behre.

Beirat der Gesellschaft.

Die Herren: v. Auwers, v. Bertrab, Brauer, Conwentz, Engler, P. D. Fischer, Gleim, Grapow, Helmert, Jannasch, Kronfeld, v. Luschan, Schjerning, K. von den Steinen, Struve.

Ausschuss der Karl Ritter-Stiftung.

Die Herren: Hellmann, Penck, Behre; Engler, Güssfeldt, K. von den Steinen.

Verwaltung der Bücher- und Kartensammlung.

Bibliothekar Herr Kollm.
Assistent Frl. Rentner.

Schriftleitung der Zeitschrift.

Dr. Alfred Merz.

Registrator der Gesellschaft: Herr H. Rutkowski.

Aufnahmebedingungen.

Zur Aufnahme in der Gesellschaft als ordentliches Mitglied ist der Vorschlag durch drei Mitglieder erforderlich. Jedes ansässige ordentliche Mitglied zahlt einen jährlichen Beitrag von mindestens 30 Mark in halbjährlichen Raten pränumerando, sowie ein einmaliges Eintrittsgeld von 15 Mark, jedes auswärtige Mitglied einen jährlichen Beitrag von 15 Mark.

Veröffentlichungen der Gesellschaft.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Jahrgang 1914. Jedes Mitglied erhält die Zeitschrift unentgeltlich zugesandt.

Abhandlungen, Vorträge, Original-Mitteilungen und literarische Besprechungen für die Zeitschrift werden mit 60 M für den Druckbogen, Original-Karten nach Übereinkunft honoriert. 50 Sonderabzüge werden kostenfrei geliefert. — Berichte von Reisenden sind willkommen, insofern sie nicht gleichzeitig an anderer Stelle veröffentlicht werden. Die Verfasser sind für den Inhalt ihrer Artikel allein verantwortlich.

Die Gesellschaft behält sich das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung u. Verbreitung der in der Zeitschrift abgedruckten Abhandlungen, Vorträge u. s. w. vor.

Abdruck und Referate aus den „Kleinen Mitteilungen“ sind mit Quellenangabe gestattet.

Bisherige periodische Veröffentlichungen: *Monatsberichte* 1839—1853, (14 Bde.); *Zeitschrift für allgemeine Erdkunde* 1853—1865 (25 Bde.); *Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde* seit 1866; *Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde* 1873—1901 (28 Bde.) — *Bibliotheca Geographica* (seit 1891, jährlich 1 Bd.).

Sitzungen im Jahre 1914.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Oktbr.	Novbr	Desbr.
Allgem. Sitzungen	8.	7.	7.	4.	2.	18.	4.	10.	7.	5.
Fach-Sitzungen	19.	28.	28.	20.	18.	—	—	26.	28.	14.

Die Bibliotheks- und Lesezimmer der Gesellschaft (Wilhelmstr. 23) sind mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich von 9 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends geöffnet. Die Stunden zur Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten sind von 9—12 und 4—7 Uhr.

Sämtliche Sendungen für die Gesellschaft sind unter Weglassung jeder persönlichen Adresse oder sonstigen Bezeichnung zu richten an die „Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, SW. 48, Wilhelmstr. 23“.

Himalaya-Studien.

Von Prof. Dr. **Karl Oestreich**, Utrecht.

Die Erforschung des Himalaya, so unvollständig sie auch noch ist, hat vor der Erforschung anderer Hochgebirge das voraus, daß sie von einer kleinen Anzahl nahe miteinander verbundener Einrichtungen unternommen wird. Man kann sagen: wie der Himalaya als Einheit empfunden wird, so werden auch die Ergebnisse seiner Erforschung ausgetauscht, und zu allen Zeiten haben die beteiligten Staatseinrichtungen, der Great Trigonometrical Survey und der Geological Survey, es verstanden, die Ergebnisse ihrer das ganze Gebirge betreffenden Untersuchungen und Arbeiten zu einem Gesamtbilde des Gebirges zu verallgemeinern. Die geographische Welt hat davon nur Vorteile gehabt, immer war es möglich, einen Überblick über den Stand der Erkenntnis zu erlangen, so daß die freiwillige Mitarbeit von Außenstehenden am richtigen Punkte einsetzen konnte, und die Größe der Probleme verhinderte ein zu schnelles Sichverlieren in die Detailarbeit, was im Sinne eines Erfassens der Eigenart des Himalaya als des machtvollsten Gebirges der Erde nur wünschenswert war.

So ist bei der Durchforschung dieses Gebirges, wie bei keinem andern, stets Beschreibung mit Beobachtung und Theorie, also Geographie mit Geologie und Geophysik zusammen gegangen, und so sehr auch hier unser Wissen Stückwerk ist, es darf uns mit Genugtuung erfüllen, daß gerade am Beispiel des höchsten Gebirges der Erde die Bemühungen, zur Einsicht in die Gesetze der Gebirgsbildung zu gelangen, ihre schönsten Früchte erlangt haben.

Diesem stets wach gebliebenen Interesse für die Erkenntnis der Gesamterscheinung des Gebirges ist es auch zu verdanken, daß von Zeit zu Zeit eine Gesamtdarstellung des Gebirges unternommen wurde, die das bis dahin gesicherte geologische Wissen im Zusammenhang mit der neu erworbenen Einsicht in die Gliederung des Gebirges darstellen soll. Die

beiden ersten Male ist dieser Versuch von Geologen unternommen worden, 1879 von H. B. Medlicott und W. T. Blanford und 1894 von R. T. Oldham. 1907/08 wurde dieser Versuch von dem Cheftopographen S. G. Burrard und dem Chefgeologen H. H. Hayden gemeinschaftlich wiederholt; es sollte, da nun weitere Kreise, vor allem die Alpinisten, in die Erforschung des Gebirges einzugreifen sich anschickten, das bisher erreichte überblickt und eine Basis für künftige Entdecker- und Forscherarbeit hergestellt werden. Besonders die auf den Topographen entfallenden Abschnitte dieses Werkes sind geeignet, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln; denn zum ersten Male wird hier das Interesse des Topologen, wenn ich diesen vom General Berthaut geprägten Ausdruck gebrauchen darf, nicht von der Kammgliederung des Gebirges allein gefesselt, sondern die Erscheinung der Gipfel, der Wasserscheiden, der Stromnetze wird mit der gleichen Gründlichkeit und vielfach ebenso neuartig wie abschließend behandelt. Und doch, viele Arbeit bleibt noch zu tun, manche Einzelheit auch in der letzten Zusammenfassung ist überholt. Nur einen Durchschnitt durch den gegenwärtigen Stand der Erforschung können solche Zusammenfassungen, auch die hier folgende, geben.

1. Ausdehnung und Gliederung des Himalaya.

Der Name der Schneekette, die sich über niedrigere Vorberge hin aus der indogangetischen Ebene erhebt, ist von der Wissenschaft auf die ganze Hochgebirgsanschwellung übertragen worden, die das tibetische Hochland (im weitesten Sinne genommen) im Süden begrenzt. Die nach Süden konvexe Bogenform sowie die nach Süden gerichtete Überfaltung hat in dem Himalaya ein durch tangentiellen Schub von Norden her entstandenes Faltengebirge sehen gelehrt, und zwar eine in der Tertiärzeit eingetretene Auffaltung der bereits durch die Bildung der paläozoischen Altiden verengten Thetys-Geosynklinale. Diese Bogenform ist von dem Faltengebirge, das man nur in geologischem Sinne ein junges Faltengebirge nennen darf, auf das heutige Hochgebirge vererbt worden, das seine Existenz gewaltigen, in jüngerer Zeit eingetretenen Hebungen verdanken dürfte¹⁾.

Das Wesen dieses Hochgebirges beruht auf der Existenz einer oder mehrerer, teilweise vergletschelter Hochgipfelketten. Die „main axis“ des Himalaya wird vom Bramaputra bis zum Indus gezeichnet; aber wie ihr Ostende unbekannt ist, hat man auch eine westliche Fortsetzung oder auch nur die westliche Endigung bisher nicht gefunden. Burrard²⁾ spricht sich ausführlich darüber aus, daß man jenseits des Indus, also zwischen diesem

¹⁾ Oestreich, Betrachtungen über die Hochgebirgsnatur des Himalaya. Verh. XVI. Deutsch. Geogr.-Tags. Nürnberg 1907, S. 44–50.

²⁾ Burrard-Hayden, S. 79 ff.

und dem Kabulzufluß Kunar umsonst nach einer granitischen Kette in der Fortsetzung der Hauptachse des Himalaya gesucht habe, und zitiert bei dieser Gelegenheit die treffende Charakteristik, die ein militärischer Beobachter, Colonel Tanner, in den 70er Jahren von dieser Gegend gab, als von einem Gewirr von scharfgefisteten Rücken, deren Gipfel alle von der gleichen Höhe und dem gleichen Aussehen seien, so daß auch die trigonometrische Aufnahme nicht mehr als zwei bis drei Gipfel in der Wasserscheide festlegen konnte. Auf 6400 m schlägt Tanner die Höhe der Gipfel rechts und links der Indusschlucht an, und eine demnach bis zu 6000 m Meereshöhe gehobene Peneplain wurde daher vom Verfasser als die Urform der Oberfläche in der Region der westlichen Endigung des Himalayahauptkamms bezeichnet¹⁾. In welcher Weise sich diese Peneplain zu der nur 200 km entfernten Ebene senkt, ob mit einer gewaltigen Verbiegung oder mit einem Bruch, ist unbekannt, und auch nur wenig ist bekannt von dem wundervollen Härtling Nanga Parbat, der sich als der Markstein und als der einzige die 8000-m-Linie überschreitende Gipfel des westlichen Himalaya (im engeren Sinne) über die zerschnittene Peneplain erhebt.

Er dürfte wohl dem Monadnocktypus entsprechen und eines der großartigsten Beispiele dieses Formtypus darstellen. Seine isolierte Lage — er gehört nicht einmal einem Kamm an, und daß man die Hochgipfelkette bis zu ihm zieht, ist ein Fehler — würde also dem isolierten Auftreten seines Gesteins entsprechen und seiner Umgehung durch die Adern der Entwässerung.

Das Fehlen einer westlichen Fortsetzung der Hauptachse wird uns nach dem Gesagten nicht mehr wundern: der Himalaya hatte im Westen den ganzen Zyklus durchlaufen, während im Osten und in der Mitte nur reife Zerschneidung eingetreten war. Jedenfalls wird durch solche Betrachtungsweise die Hauptachse ihres Charakters als des unmittelbaren Ausdrucks der orotektonischen Wirkungen entkleidet, und auch die Gliederungsversuche, zu deren Behandlung nunmehr übergegangen werden soll, können nur als Gliederungsversuche des Kartenbildes gelten, nicht als Rekonstruk-

¹⁾ Oestreich, Die Täler des nordwestlichen Himalaya. Erg. Heft 155 zu *Pet. Mittlgn.* S. 63. (Weiterhin zitiert als „Täler des Himalaya“).

Ein vorzügliches Bild einer hochoberflächigen und reif zerschnittenen, nur noch in schmalen, glazial ausgestalteten Kämmen erhaltenen Peneplain gibt das Bild unten auf Tafel bei S. 340 in F. de Filippi, *Karakoram and Western Himalaya 1909* (London 1912) wieder. Es handelt sich um den Blick vom Skoro Paß (ca. 5000 m) über den Einschnitt der Skoro Nalla, das Schigartal und das Becken von Skardu weg nach der Peneplain der Déusi (Deosai). Vielleicht erscheint ganz links in der Ferne auch noch Nanga Parbat. Es handelt sich also um die nordöstliche Fortsetzung derselben Peneplain, die — allerdings in sehr zerstörtem Zustande — bis in das Herz des Hochgebirges von Baltistan hineingreift.

tion der orotektonischen Leitlinien des Gebirges. Die langen Kammlinien, die z. B. auch Godwin Austen zog, und zu deren Feststellung er so viele Mühe verwandte, sind, wenn man das so ausdrücken darf, zufällige Ergebnisse der Erosion, es sind wahrscheinlich subsequeute Wasserscheiden; ursprüngliche Antiklinalen sind keine festgestellt, weil nicht mehr festzustellen.

Trotzdem ist es von Interesse, zu sehen, wie das Gebirge sich gliedert, wie die Hochgipfel angeordnet, aus welchen und wie struierten Gesteinen die Ketten aufgebaut sind. Die erste eingehende Gliederung des Gebirges ist von Godwin Austen¹⁾ versucht worden. Für ihn war die „granitoid axis“ leitend für die mountain chain, worunter er ausdrücklich nicht eine Kette von Gipfeln, sondern eine, wie er meinte, selbständige und geschlossene Aufragung verstand.

Er schied die große Gebirgsmasse im Nordwesten in fünf Hauptglieder:

die Hauptachse: den Kwenlun,
den Transhimalaya, der sich in folgende Ketten gliedert: Karakoram, Mustak, Schayok-Kette, Ladak-Kette,
den Himalaya, der sich in die Ketten von Stok, Rukschu, Baralasa, Zanskar, Süd-Tschinab-Kette gliedert,
den Outer (oder Lower) Himalaya,
den Subhimalaya (Siwalik).

Zur Kritik dieser Gliederung ist zu sagen, daß eine Unterabteilung, wie die Süd-Tschinab-Kette, sich in der Art, wie sie Godwin Austen zeichnete, nicht findet; nördlich von Kaschmir besteht sie nicht. Wohl ragt dort Haramuk (5150 m) über die reif zerschnittene Peneplain von Nordkaschmir 1600 m hoch auf, ähnlich wie weiter im Osten Kolahoi (oder Gwaschbrari, 5437 m), aber was sie überragen, ist eben eine, wenn auch reif zerschnittene Peneplain. Sie sind nicht durch einen Gebirgskamm verbunden, die Erosion des Sind und der Erin Nallah mit ihren unzähligen Nebenflüßchen und -bächen haben die zu 3500 m erhobene Verebnungsfläche aufgeteilt, von einer „Kette“, die sich von der dahinter gelegenen Hauptkette (Zanskar) abheben würde, ist hier keine Rede²⁾.

Die Karte, Blatt 28 von „The Indian Atlas“, gibt diese Verhältnisse nicht wieder; sie leidet an dem von Burrard³⁾ an der Hand zweier Kärtchen

¹⁾ H. H. Godwin Austen, The President's address. Geogr. Sect. Brit. Assoc. Southport. (Proc. Roy. Geogr. Soc. New Series, Bd. V, 1883, S. 610—25. — Derselbe, The mountain systems of the Himalayas and neighbouring ranges of India. Ebenda Bd. VI, S. 83—87, mit Karte.

²⁾ Oestreich, Täler des Himalaya. S. 16 f.

³⁾ Burrard-Hayden a. a. O. Chart XI und S. 57 ff.

sehr wirksam ins Licht gerückten fehlerhaften Eigenart dieses Kartenwerkes, die Wasserscheiden in übertriebener Weise herauszuarbeiten, so daß es nirgends Ketten und nirgends Flächen gibt, sondern nur Raupen und Tausendfüße und dazwischen Flußgebiete.

Ferner fordert die Bezeichnung der Unterabteilungen des Transhimalaya als verschiedener main und subsidiary axis zum Widerspruch heraus: von der Ladak-Kette bis zur Karakorum-Kette handelt es sich um eine nur durch verjüngte, also tief eingeschnittene Längstäler gegliederte kristallinische Masse, von besonderen Erhebungsachsen kann man nicht reden. Es erübrigt sich also auch, auf die Bemühungen und Raisonsnements einzugehen, die Godwin Austen zur Annahme bestimmter Fortsetzungen dieser „Achsen“ nach Osten leiteten, dergestalt, daß die Schayok-Kette bis zum Kailas, die Ladak-Kette bis zum Gurla weiterstreichend gedacht wurde.

Oldham¹⁾ unterschied zehn Jahre später außer dem Subhimalaya vier Gebirgszüge („ranges“):

Mustak oder Karakoram, Ladak-Kette, Zanskar, Lower Himalaya (Pir Pandschal und Dhaoladhar).

Hierbei wird zum erstenmal von einer Kette, nämlich von der Zanskar, ausdrücklich bemerkt, daß sie ihre Existenz der Lage als Wasserscheide zwischen Indus und Tschinab (Chenab) verdanke, daß sie also ein „Restling“ ist, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, und nicht das Ergebnis einer besonderen Hebung.

Burrard²⁾ zerlegt in dem neuesten Gliederungsversuch die ganze Gebirgsmasse nach einem topographischen Prinzip in

die Karakoram Range, in der er die Fortsetzung des Hindukusch erblickt,

die Ketten des Südlichen Tibet: Kailas-Kette, Ladak-Kette, Zanskar-Kette,

die Ketten des Himalaya: die große Himalaya-Kette, the Lesser Himalaya, die Siwaliks.

Doch bemerkt er, daß in den einzelnen Sektoren des Himalaya, dem Pendschab-, dem Kumaon-, dem Nepal- und dem Assam-Himalaya, die Verknüpfung der einzelnen Glieder eine verschiedenartige sei; in Kumaon fehlen die Siwaliks und die Ketten des Lesser Himalaya als ausgesprochene „Ketten“, und in Sikkim, wo der Assam- und der Kumaon-Himalaya aneinandergrenzen, fehlen beide vordersten Glieder des Himalaya überhaupt.

Was die große Himalaya-Kette anlangt, so zeigt sie nach Burrard

¹⁾ Oldham, A manual of the geology of India. Calcutta 1893. S. 460 f.

²⁾ Burrard-Hayden. Abschnitt 14 ff.

mehrere Male die Erscheinung der Bifurkation: zuerst am Daulaghiri, dann beim Einschnitt des Karnali-Flusses, wo die Zanskar-Kette (mit Kamet, 7755 m und Leo Pargial, 6770 m) abzweigt; ferner am Einschnitt des östlichen Ganges-Quellflusses Alaknanda, wo als südlicher Arm der Dhaoladhar, und am Satledsch (Sutlej), wo der Pir Pandschal loszweigt. So stehen auch für den Topographen die Ketten alle in Zusammenhang, und kann er in den Ketten nicht mehr eben so viele Erhebungsachsen erblicken. Sonderbarerweise dringt aber doch stets wieder die Anschauung von den lang hinstreichenden Falten der Erdoberfläche durch, die in den heutigen Gebirgskämmen zutage liegend gedacht werden!

Es erübrigt also, genauer den neuesten Gliederungsversuch zu besprechen und es sei nur noch darauf hingewiesen, daß die charakteristischste Linie der Himalayagliederung, die main axis oder Great Himalayan Range, also die große Schneegipfelkette, nur bei den Gliederungen diese Rolle spielt, die vom mittleren oder östlichen Himalaya ausgehen, daß sie aber in den Gliederungen, die den bestbekanntesten, also den nordwestlichen Himalaya, zum Ausgangspunkt nehmen, überhaupt nicht namentlich erwähnt wird: so bei Godwin Austen und Oldham. Es ist auch schwer, im Westen irgend eine Kette zu finden, die man nach ihrer Höhe und vor allem ihrer beherrschenden Höhe als Äquivalent und zugleich als streichende Fortsetzung der Hauptkette des Ostens ansehen könnte.

2. Die Gipfel.

In äußerst wirkungsvoller Weise eröffnet Burrard die Reihe seiner Karten und Diagramme mit der Abbildung einer trigonometrischen Flachlandstation, von der aus mehr als 150 km Entfernung die dem Kumaon-Himalaya angehörigen Hochgipfel Badrinath (7068 m), Kedarnath (6940 m) und Bandar Puntsch (6315 m) anvisiert und gemessen worden sind.

Nächst der Gebirgsgliederung, ja noch mehr als diese, haben die Gipfel des Himalaya die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Über die Gliederung kann man streiten, streitet man, wie wir gesehen, noch heute. Die Gipfel aber sind unzweifelhaft da, und sie sind die machtvollsten Erscheinungen im Bilde des Gebirges. Nirgends wieder auf so kurzer Strecke treten, bald eng gedrängt, bald in größeren Abständen, Gipfel in solcher Menge und von so überragender Höhe auf: die Tabelle XVII von Burrard gibt allein für den eigentlichen Himalaya 40 Gipfel mit über 7315 m (24 000') an. Dazu kommen im nordwestlichen Hinterland der Hauptkette noch 31 Gipfel. Und die Gipfel sind nicht aufgesetzt wie die Hochgipfel der Anden und des Kaukasus, sondern gehören dem Grundgebirge an. Was bedeuten die Gipfel? Diese Frage stellt sich auch Burrard, und die Tatsache, daß die Gipfel überall aus Granit bestehen, der aber die Achsen des

Gebirges überhaupt zusammensetzt, legt ihm den Schluß nahe, daß nicht gerade der einzelne Gipfel, oder besser die Gipfelgruppe, ein eigenes Erhebungszentrum bildet, daß aber wohl die breiten domförmigen Granitmassen hier und da stärker gehoben wurden als ihre Umgebung, und daß dann die Erosion die heutigen Gipfel schuf. Wir können uns mit dieser Erklärung noch nicht zufrieden geben, für uns ist auch der Gipfel nur eine aus dem früheren Zyklus vererbte Form, der Gipfel von heute ist der Häutling von früher. Aber die Erforschung des Gebirges ist noch zu wenig vorgeschritten, als daß wir über die morphologische Geschichte auch nur eines der Gipfel unterrichtet wären.

Trotzdem ist die Betrachtung der Gipfel, wie sie Burrard¹⁾ bringt, von hohem Interesse. Er bringt sie in Tabellen und Karten, in fünf Größenklassen angeordnet, und untersucht, wie sich die verschiedenen Größenklassen nach der Zahl der ihnen zugehörigen Gipfelindividuen verhalten. Dabei ergibt sich im ganzen ein Ansteigen der Individuenzahl von der ersten bis zur fünften Klasse.

1. Klasse	über 8839 (29 000')	1
2. „	8534—8839 (28 000—29 000)	2
3. „	8230—8534 (27 000—28 000)	2
4. „	7925—8230 (26 000—27 000)	11
5. „	7620—7925 (25 000—26 000)	32
6. „	7315—7620 (24 000—25 000)	27
7. „	7010—7315 (23 000—24 000)	62
8. „	6705—7010 (22 000—23 000)	146

In der sechsten Klasse findet also eine Abnahme statt, während man eine gleichmäßige Zunahme erwarten sollte. Burrard frug sich daher, was die Ursache einer solchen Abnahme, gewissermaßen eines Ausfalls von Gipfeln der Höhenklasse 7315—7620 sein könne. Eine Berechnung der zu erwartenden Gipfelhäufigkeit auf Grund der Wahrscheinlichkeitsrechnung unter Annahme einer Anzahl von elf Gipfeln in der vierten und einem Gipfel in der ersten Klasse ergab jedoch, daß nicht sowohl die sechste Klasse zu wenige, sondern daß die fünfte Klasse (7620—7925) zu viele Individuen aufweist: daß also in einer bestimmten Höhe eine größere Anzahl von Gipfeln vor der Zerstörung bewahrt geblieben sein müsse, als bei gleichmäßiger Abtragung zu erwarten sein sollte.

Die Burrardsche Grundanschauung ist die von der einzyklischen Entwicklung, die aber für den Himalaya nicht zutrifft. Der gleichmäßigen Erniedrigung, die zur Konstanz der Gipfelhöhe führt, steht die polyzyklische Entwicklung der Gebirge entgegen, die es verhindert, daß die Abnahme

¹⁾ Burrard-Hayden, Abschn. 1—7 sind: „The high peaks of Asia“ überschrieben.

des Areals mit der Höhe in einem gleichmäßigen Fortschreiten stattfindet. In bestimmter Höhe oder in bestimmten Höhen, eben den gehobenen Rumpfflächen entsprechend, befinden sich größere Areale, als einer gleichmäßigen Abnahme der Flächenareale mit der Höhe entsprechen würde, und wenn die Aufragungen dieser Peneplains, die Härtlinge der älteren Zyklen also, nach wieder belebter Erosion den neuen Wasserscheiden einverleibt werden, wird ihre Härtlingnatur undeutlich, sie werden zu Aufragungen über dem mittleren Kammniveau, zu Gipfeln. Es ist die Frage nach der Zahl und Höhe der Hochgebirgsgipfel also zugleich eine Frage nach der Entwicklung des Hochgebirges, und wenn wir uns auch mit der von Burrards Seite stammenden Erklärung nicht einverstanden erblären können, so ist es doch eine angenehme Pflicht, auf den Nutzen hinzuweisen, den wir aus seiner großzügigen Betrachtung der Gipfel gezogen haben. Nachdem eine morphologische Grundanschauung des Gebirges gewonnen ist, wird es nunmehr Zeit, sich dem Problem der Gipfel zuzuwenden, das uns im Himalaya wie nirgends in seiner ganzen Größe entgegentritt. Schließen wir diese Bemerkungen mit dem Hinweis auf Burrards Tabelle XX, in der berechnet ist, daß vom rechten Indusufer aus am Abhang des Nanga Parbat eine Vertikaldifferenz von 7000 m überblickt wird. Nirgends auf der Erde kann das Auge des Menschen sich mit einem Blicke in solchem Maße über die Wirkung von erodierenden und hebenden Kräften überzeugen, ein Eindruck wohl ohnegleichen!

3. Zur Geologie des Himalaya.

Nur langsam schreitet die geologische Erforschung des Himalaya fort. Die neue Übersichtskarte von Hayden¹⁾ zeigt gegenüber der 20 Jahre früher ausgearbeiteten Karte von Oldham im Manual²⁾ nicht so viele Fortschritte, als man entsprechend der immer schneller fortschreitenden touristischen Erschließung des Hochgebirges erwarten sollte. Noch immer bildet die große Hauptkette des Himalaya eine „weiße“ Zone, noch immer sind wir nicht darüber orientiert, wie der Hauptkamm geologisch zusammengesetzt ist, wie sich in räumlicher Verbreitung Granitintrusion zu den umgebenden kristallinen Schiefen verhält, ob man überhaupt von einem langgestreckten Granitkerne reden darf, oder ob größere Partien kristallinischer Gesteine Granitkerne umgeben.

Festgestellt ist nur, und zwar durch C. A. Mc Mahon³⁾, daß der von Stoliczka seinerzeit so genannte Zentralgneis, in dem man gewohnt war, das älteste Gestein des Himalaya zu sehen, in der Tat ein Granit ist, der

¹⁾ Burrard-Hayden, Plate L.

²⁾ Manual of the geology of India. 2. Aufl., 1904.

³⁾ Siehe Burrard-Hayden, S. 44 und 219.

wahrscheinlich zur Zeit der Hauptfaltung, am Schluß der Eozänzeit, in die Schichtserie eindrang. Wahrscheinlich ist der kristallinische Charakter der Schiefer in der Umgebung dieses „Zentralgneis“ genannten geblättern Granits („gneissose granite“ oder „foliated granite“) eben die Folge der Intrusion, also Kontaktwirkung auf das umgebende Gestein. Echter Granit kommt vor allem als Biotitgranit vor, und dieser scheint die meisten Hochgipfel zusammenzusetzen. Da er den Gneisgranit in Adern durchsetzt, scheint er eine noch jüngere Intrusion darzustellen. Auf die übrigen Granitarten braucht hier nicht eingegangen zu werden, zumal die petrographischen Beobachtungen sonst noch ziemlich zusammenhanglos sind. Aber jedenfalls hat sich ergeben, daß das Gestein der Gipfel und Kämmen nicht das Urgestein, sondern ein Begleitgestein der Auffaltung ist. Wenn sich so einerseits die Geschichte des Gebirges vereinfacht und die Annahme eines älteren, paläozoischen Himalaya, wie ihn Griesbach¹⁾ zu erkennen meinte, unnötig wird, so wird andererseits ein kräftiger Hinweis auf die gewaltigen Hebungen geliefert, die vor sich gegangen sein müssen, da alte Intrusionen, die doch in einer gewissen Tiefe gelegen haben müssen, nun bis über 8000 m hoch erhoben sind, und ebenso auf die gewaltige Erosion, die jene Intrusionen freigelegt hat. Die jungen Hebungen, die wir zur Erklärung der Hydrographie des Gebirges anzunehmen gezwungen waren, verlieren somit viel von dem Verblüffenden, das ihnen anfänglich anhaftet.

Immer noch besteht aber die geologische Gliederung zu recht, die den Himalaya in die drei faziell, tektonisch und zum Teil auch historisch verschiedenen Zonen gliedert: den Subhimalaya, die Himalayazone, die Tibetische Zone²⁾. Der Subhimalaya, die sog. Siwalikzone, grenzt an das ältere Gebirge mit der großen Randverwerfung (main boundary fault). Längs dieser, oder längs der als „main boundary fault“ bezeichneten Verwerfungsserie sind die Gesteine der Himalayazone über die Gesteine des Subhimalaya hinaufgeschoben. Diese Randverwerfung gilt seit Medlicott zugleich als ursprüngliche Verbreitungsgrenze der Tertiärgesteine, die die Siwalikzone zum größten Teile aufbauen. Diese Anschauung stammt aus einer Zeit, in der man von dem Ausmaß der Horizontalverschiebungen innerhalb der Faltengebirge noch keine Vorstellung hatte. In wieweit die Formationsgrenze ursprüngliche Verbreitungsgrenze ist, und in wieweit Überschiebungsgrenze einer Decke, muß erst ausgemacht werden. Die Deckscholle von Garhwal am oberen Ganges, wo intrusiver Granit und kristallinische Gesteine mit einer Unterlage von ? mesozoischen (Tal-Formation) und Nummulitenschichten wurzellos auf der Tertiärzone ruhen³⁾, ist vielleicht nur

¹⁾ Siehe Oestreich, Täler des Himalaya. S. 2 f.

²⁾ Oldham im Manual, 2. Aufl., 464. Hayden in Burrard-Hayden, S. 207.

³⁾ Sueß, Antlitz der Erde. III, 1., S. 354 f., nach Middlemiss, Physical geology of West British Garhwal. Rec. Geol. Surv. of India, vol. XX, S. 30 ff, mit 2 Karten.

erst das einzige festgestellte Beispiel einer weiter verbreiteten Erscheinung. Vielleicht entspricht die ganze mittlere „Himalaya“-Zone einer von Norden her überfalteten Decke. Unter dem Einfluß dieser Wandlung der Anschauungen wird auch die Vorstellung vom jugendlichen Alter der Siwalikzone eine Modifikation erfahren müssen. Die junge Auffaltung, die diese Zone an den älteren Himalaya herangefaltet hat, betraf alsdann nur die jüngsten Bestandteile des Subhimalaya, die oberen Siwalikschichten, von denen ja auch früher schon bekannt war, daß sie stellenweise die große Randverwerfung überdecken, also jünger sind als diese¹⁾.

Die kristallinen Gesteine der Himalayazone selbst werden außer dem bereits erwähnten sogenannten Zentralgneis, recte geblätterttem Granit, und dem andern Graniten, als archaische Gesteine gedeutet, und die geschichteten, aber sämtlich fossillosen Gesteine, wie z. B. die früher mit dem Talchir-Tillit identifizierten Blaini boulder slates der Gegend von Simla gelten als algonkisch²⁾. So ist denn ein ganz prinzipieller Unterschied zwischen den archaischen und algonkischen Gesteinen der Himalayazone und der vom Kambrium bis ins Tertiär reichenden, durch Fossilien erhärteten vollständigen Serie der Tibetischen Zone festgestellt, ein Gegensatz, der wiederum an Deckenbau und fazielle Verschiedenheit der einzelnen Gebirgsglieder denken läßt. Die Himalaya-Granite wären dann Intrusionen in der archaisch-algonkischen Grundlage einer Decke, die später zur Hauptachse des Gebirges geworden wäre.

Die tibetische Zone ist die fossilreiche Zone und der Gürtel mit der vollständigen Serie, auf dem eigentlichen Boden der Thetys. Eine ungeheure Mächtigkeit von Sedimenten vom Kambrium bis zum Eozän wurde hier abgelagert und im Tertiär gefaltet. Dabei kam Überfaltung vor: die Deckschollen des südlichen Hundes, deren Bedeutung durch E. Sueß³⁾ ins rechte Licht gerückt worden ist, zeigen auf den Falten der jurassischen Spiti Shales und des kretazischen Giumal-Sandsteins und des Flysches Schollen aus Gesteinen vom Perm bis zur Kreide in gänzlich anderer Fazies und ohne tektonischen Verband mit ihrer Unterlage.

Mehr läßt sich in diesem Stadium der Erforschung noch nicht sagen. Der Geschichtsschreiber kann nur hinweisen auf die möglichen Resultate späterer Studien, die hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Von wirklichen Fortschritten der geologischen Erkundung ist u. a. auf die während der Lhasa-Expedition von 1904 angestellten Beobachtungen von H. H. Hayden⁴⁾ hinzuweisen, die für die Gegend nördlich des Haupt-

¹⁾ Siehe Oldham, *Manual*, 2. Aufl., S. 468.

²⁾ Siehe Hayden in Burrard-Hayden, S. 225 ff.

³⁾ *Antlitz der Erde*, II¹, S. 351 ff.

⁴⁾ Hayden, *The geology of the provinces of Tsang and Ü in Central Tibet. Mem. Geol. Surv. Ind. XXXVI, Part. 2. (Calcutta 1907).*

kammes im östlichen Himalaya eine ausgedehnte Ausbreitung gefalteter Juraschichten ergeben haben. Die Schnelligkeit der Bereisung hinderte, darüber Klarheit zu gewinnen, ob es sich um eine Faltung an Ort und Stelle oder um Fältelungen innerhalb einer Decke handelt. Außer Kreide und Tertiär ist in dieser bis Lhasa erkundeten Juraausbreitung nur noch intrusiver Granit festgestellt worden.

Nächst der Stratigraphie und Tektonik des Gebirges hat sich das Interesse begreiflicherweise besonders der Geologie der Gipfel zugewandt. Hayden widmet ihr einen Abschnitt des oft angeführten Werkes¹⁾. Die Tatsache, daß die Gesteine der Gipfelmasse, soweit bis jetzt bekannt, Gneis und wahrscheinlich intrusiver Granit sind, legt ihm nahe, einen Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung aus Granit und der Gipfelnatur zu vermuten. Zunächst denkt er wohl an die größere Widerständigkeit des Granits, die diese Gipfel habe herauspräparieren und erhalten lassen. Doch verwirft er diese Auffassung wieder, da der Fuß der Gipfelmasse aus dem gleichen Gestein bestehe, wie die Gipfel selber, und hält besondere Hebungen der später zu Gipfeln gewordenen Partien für möglich, die er aber sofort zu einem verschieden hohen Hinaufdringen des in den Gebirgskörper intrudierenden Granits abschwächt.

Hiermit scheint Hayden jedoch selbst wieder zu der anfänglichen Auffassung zurückzukehren; denn alsdann ist es doch der Vorgang der Abtragung, der die Gipfel als solche hat hervortreten lassen. Denn die Granitstöcke mußten erst der schützenden Sedimentdecke beraubt werden, um als „Gipfel“ hervortreten zu können. Auch die Tatsache der gleichen Zusammensetzung von Gipfel und Sockel, wenn sie wirklich die Regel sein sollte, ist nicht verwunderlich; denn die Abtragungsvorgänge gehen weiter und legen den Sockel der Gipfel bloß, und dieser gehört derselben Intrusionsmasse an wie der Gipfel. Die ganze Erscheinung der Granitgipfel und -sockel erklärt sich mühelos unter der Annahme, daß die Gipfel in einem früheren Zyklus als Härtlinge über das eingebnete Gebirge hervorragten, und eben weil sie die Scheitel von intrusiven Massen bildeten. Die Granitsockel mögen damals noch nicht erschlossen gewesen sein, oder sie lagen im Basisniveau der Erosion. Im neuen Zyklus aber, der die Gipfel selbst in große Höhe erhob, präparierten die abtragenden Vorgänge auch tiefere Partien der Granitstöcke, eben diese Sockel, heraus, wiederum als Folge der großen Widerständigkeit des Gesteins.

Aber die Regel, daß die großen Gipfel aus Granit bestehen, ist nicht ohne Ausnahme. Betrachtet man Bilder des Götterbergs Kailas (6714 m),

¹⁾ Burrard-Hayden, Abschn. 7.

der sich mehr als 2000 m hoch über die über 4400 m hoch gelegene Ebene der Seen Manasarowar und Rakas Tal erhebt, so scheint er aus geschichtetem Sedimentgestein zu bestehen¹⁾. Besser als über die anderen Hochgipfelregionen sind wir aber über den Mustagh unterrichtet; und gerade hier haben die allerdings nicht ad hoc unternommenen Studien und Expeditionen der letzten Jahre neue Tatsachen gefördert.

Seit Godwin Austen²⁾ und Lydekker³⁾ weiß man, daß in das sogenannte „Gneissmassiv von Ladakh-Baltistan“ Einlagerungen von Schichten der paläo-mesozoischen Gesteinsserie vorkommen. In dem früher als immer unbedeckt gedachten „Grundgebirgsmassiv“ war eine Einlagerung jüngerer Gesteine festgestellt worden, die, bei Schigar beginnend, zuerst eine kurze Strecke nach Nordost streicht, dann aber in die Hauptrichtung des Gebirges, also die südost-nordwestliche, einschwenkt. Die Mächtigkeit dieser vermutlich zum Karbon und zur Trias gehörigen Schichtserie wird von Lydekker auf 1500 m geschätzt. Zum Teil sind die Gesteine metamorphosiert, zum Teil in frischem Zustand. Fossilien wurden, außer einer unbestimmbaren Rhynchonella und Stielgliedern von Crinoiden, diese aber in einem wahren Entrochusmarmor, nicht gefunden. Auch der Skoro-Paß gehört dieser Zone an, und bei Askole überschreitet sie den Braldu. Über die Tektonik dieses Gebietes ist natürlich noch kein sicheres Urteil möglich. Lydekker spricht von einer synklinalen Einfaltung der Sedimente in dem Gneis. Da wir aber in diesem Gneis vielleicht einen, nur veränderten, intrusiven Granit zu sehen haben, verfällt diese Erklärung, die einen viel einfacheren Gebirgsbau voraussetzt, als er der heutigen Kenntnis vom Himalaya und den ähnlichen Stauungsgürteln der Erde entspricht. Es ist also heute noch nichts weiter möglich, als der Verbreitung der Sedimente in dieser Zone nachzugehen. Die Conwaysche Expedition brachte dann neue Kunde, die erste geologische Kunde aus der Gegend der Riesengletscher⁴⁾. Es stellte sich heraus, daß der Hispar⁵⁾, der Biato und der untere Teil des Baltoro in Gneis und Granit gebettet sind; daher die Zacken- und Zahnform vieler Gipfel dieser Region. Die Gesteine im südlichen Teil der oberen Region des Baltoro er-

¹⁾ C. A. Sherring, *Western Tibet and The British Borderland*. London 1906. Titelfeld.

²⁾ *Quart. Journ. Geol. Soc.* XX, 387.

³⁾ R. Lydekker, *The geology of the Káshmir and Chamba Territories, and the British District of Khágán*. *Mem. Geol. Surv. Ind.* XXII, 1883, S. 186 ff.

⁴⁾ T. G. Bonney and Miss C. A. Raisin, *Notes on Mr. W. M. Conway's collection of rock specimens from the Karakoram-Himalayas*. In: W. M. Conway, *Climbing and exploration in the Karakoram-Himalayas*. *Maps and Scientific Reports*. (London 1894).

⁵⁾ S. auch A. Roccati in Appendix II zu Workman, *The call of snowy Hispar*. (London 1910).

wiesen sich aber als mehr oder weniger metamorphosierte Sedimente: kalkige Quarzschiefer, dunkle Glimmerschiefer, feinkörnige Gneise, Dolomite, kristallinische und brecciöse Kalke. Es ergab sich, daß Golden Throne, das 7190 m Höhe erreichende Massiv über dem oberen Ende des südlichen Hauptarmes des Baltoro, aus metamorphen Sedimenten besteht: Kalksandstein, Schiefersandstein, Kalk, Dolomit, Phyllit und Tonschiefer.

Diese Ergebnisse hat die neueste Expedition, die des Herzogs der Abruzzen, bestätigt. Die Untersuchung der Aufsammlungen durch V. Novarese¹⁾ hat die fraglichen Gesteine als kieselige Anagenite, die bei feiner werdendem Korn in Sericitschiefer übergehen, bestimmt und die Kalkbreccien mit tektonischen Breccien verglichen. Ferner hat sich ergeben, daß — außer dem äußersten Norden — die ganze Ostseite des oberen Baltoro mit ihren drei Riesengipfeln: Broad Peak (8270 m), Gascherbrum mit Hidden Peak (8068 m) und Golden Throne (7190 m) dieser Sedimentformation angehört. In der Tat sind hier die Gipfelformen, wie schon die Conwaysche Expedition feststellte, viel sanfter, es handelt sich um breite Massive, wie schon aus der von der Expedition vorgenommenen Namensgebung der Gipfel kenntlich wird, die ja eine unwillkürliche Reaktion auf den äußeren Eindruck darstellt. Umsomehr fällt neben diesen breiten, domförmigen Hoherhebungen die spitze Pyramide des gewaltigen K 2 auf, der, wenn auch aus geschichtetem Gestein, so doch sicherlich aus Gneis besteht und nicht zu der paläo-mesozoischen Einlagerung gehört.

Die bergsteigerischen Expeditionen der letzten Zeit haben also das geologische Ergebnis in bezug auf die „Einlagerungen“ in das Gneis- und Granitgebirge stark vermehrt. Auch die sedimentäre Zone des Schigar und Braldu setzt sich nach Nordwesten eine Strecke weit fort, wie die Beobachtungen des Verfassers am Tsochocho darzutun scheinen.

Das Tsochocho-Gletschertal²⁾ ist an seinem untern Ende in Granatphyllit gebettet. Dieser steht an der Talbiegung bei Bisil und am Ansatz der rechten (aktiven) Seitenmoräne des Gletschers an. Das Streichen war bei der letzten Stelle ein ost-westliches, mit Fall unter 80° nach S. Diese Phyllite bilden den Wandabfall der rechten Talseite und ebenso die untere Partie der linken Seitenwand, wenigstens oberhalb der Mündung des Seitengletschers²⁾ Kilburi Gang; bis dahin ist nämlich die Wand mit Moräne verkleidet. Bei Raring Tsocho war der Schichtfall 35° nach N zu NNW. Darüber folgte weißes und gelbes Gestein, das ich nach den vielen in der Randschlucht liegenden Marmortrümmern für Kalk und Dolomit hielt. In der Tat gelangt man entsprechend dem Ansteigen der Gletscheroberfläche in die Höhe der Marmore, die in der Gegend des „3. Seitengletschers links“ in der Verschneidung von Gletscher und Gehänge anstehen.

¹⁾ V. Novarese, Geological results of the Karakoram expedition of H. R. H. the Duke of the Abruzzi. In: F. de Filippi, Karakoram and Western Himalaya 1909. (London 1912), S. 429—444, mit Nachschrift von R. D. Oldham.

²⁾ Vgl. dazu die Karte des Tsochohogletschers. Zeitschr. f. Gletscherk. VI, Tafel I.

Es handelt sich auch hier, wie im Falle des oberen Baltoro, um die Einlagerung oder Auflagerung einer mächtigen Sedimentärzone. Jeder Blick von der rechten Tal-seite lehrt das: man befindet sich in der Gneis- (oder Granit-)zone, die zu mächtigen felsigen, firnbedeckten Gebirgsblocks aufgelöst ist. Im Hintergrund des „2. Seitengletschers links“ ragt wieder das Gneis- und Granitgebirge zu einer Unmenge gewaltiger Zähne und Hörner auf, jedes für sich ein Matterhorn. Zwischen dieser Zone und dem Gneis der rechten Talseite liegen die sanft gewellten Formen der Sedimentärzone, deren Schichten von der Gletscherseite in den Berg fallen, so daß der Abhang, vor allem der zwischen Sgaribirrai Gang und „3. Seitengletscher“ wie bunt gebändert aussieht.

Ein Profil durch diese Schichten studierte ich auf der Tschochseite des Grates zwischen oberem Tschocho und „1. Seitengletscher links“. Es waren von oben nach unten Phyllite, schwach glänzend, mit Quarzlagen; schiefrige Grauwacke, sie geht über in das typische Hauptgestein des ganzen Wandabfalls: dünnblättrige bis stenglig brechende, schwarze, glänzende Schiefer mit Pyritkristallen. Etwas härter und rostfarbig rot verwittert sind die Bänke unmittelbar über der Zone des weißen, feinkörnigen Kieselgesteins. Das Gestein ist eigentümlich mürbe, zerfällt zu Grus. Es folgen wieder die schwarzen Schiefer. Nach unten wechselt die Farbe etwas, es kommen hellere Schiefer; dann graue Schiefer mit gestreckten, linsenförmigen Partien. Aus was die Gratschneide selbst bestand, konnte nicht festgestellt werden, da sie mit einer mächtigen Eishaube bedeckt ist, die nach dem „1. Seitengletscher“ in gewaltiger Wächte überhängt. Der Schichtfall war 20° gegen NO, gegen den Berg zurück.

Der Sbadik-Gletscher, der hauptsächlichste Seitengletscher der rechten Tal-seite, wiederum liegt in dem Bereich der Gneise, die mir im großen und ganzen ebenso nach NO einzufallen schienen wie die Schichten des Deckgebirges der gegenüberliegenden Talseite. Eine eigentümliche Form auf der rechten Seite ist der Bergsporn von Sbadik. Von einer wunderschönen, zu 6946 m aufragenden, in leuchtendstem Firn prangenden Eisnadel (Peak 4 der Indus-Nagar-Wasserscheide¹⁾) zweigt sich, in nordöstlicher Richtung in den Gletscher vorspringend, der Bergsporn von Sbadik los, den rechten Flügel der Verengung des Gletscherbettes am Ende der Firnregion bildend, die ich „Gletschertor von Sbadik“ genannt habe. In diesem Bergsporn ist ein dunkler Schiefer dem Gneis auf- oder vielmehr eingelagert, mit Streichen von OSO nach WNW und Einfallen unter 60° nach SSW. Vielleicht bedeutet dieser Schiefer ein Übergreifen der metamorphen Zone auf die rechte Gletscherseite. Eigentümlicherweise findet sich eine genaue Parallele zu diesem Vorkommen am oberen Baltoro. Auch hier greift bei der trichterförmigen Verengung des Gletscherbettes, dort wo die großen Quellarme des Gletschers zusammenströmen, die metamorphe Zone nach W hinüber, wie sich aus den Aufsammlungen während Conways Besteigung seines Crystal Peak²⁾ ergab.

Die vorstehenden Beobachtungen legen nahe, einen Zusammenhang der Gletschergestalt mit der geologischen Lage anzunehmen. Nicht etwa daß die Gletscher oder die ihnen vorausgegangenen Täler in einer Art von Anpassung in den nachgiebigen Gesteinszonen Platz genommen hätten, wohl aber hat die Erosion in den nach anderen Rücksichten angelegten

¹⁾ So bei Workman, *Ice-bound heights of the Mustagh* (London 1908).

²⁾ Nicht mit dem Crystal Peak der Expedition von 1909 identisch.

Tälern einen je nach dem Gesteinscharakter verschiedenen Grad von Arbeit geleistet: Dem geschlossenen Hispargletscher, dem Biafo, dem unteren Baltoro, die im Urgestein, richtiger im Bereich des intrusiven Granits, liegen, als regelmäßigen, geradegerichteten, mäßig zerlappten Gletschertalstrecken, stehen gegenüber der obere Baltoro und die linke Talseite des mittleren und oberen Tschocho (siehe besonders den „2. Seitengletscher links“!). Diese Gletschertalstrecken sind viel mehr ausgestaltet, viel weiter nach der Reife entwickelt, und gerade diese stark zerlappten Gletscherregionen entsprechen den Einlagerungen der Sedimentärserie. Wenn man nun berücksichtigt, daß auch in der Moräne des Kero Luma¹⁾ die metamorphen Gesteine festgestellt sind, und daß das System dieses Gletschers nicht den gerade gerichteten Verlauf der großen Hauptgletscher zeigt, so wird man berechtigt sein, die metamorphe Zone von Schigar-Braldu über die Zone der zerlappten Gletscher Altscho Ri und Kero Luma weg an den mittleren Tschocho heran zu zeichnen.

4. Die Massenverteilung im Himalaya.

Die Geologie ist die Wissenschaft der Beobachtung, sie beobachtet und erforscht das Material des aufragenden Gebirges, und die beobachteten Tatsachen lassen Schlüsse auf die Art und Weise des gebirgsbildenden Vorganges zu. Daß im Himalaya Überfaltung nach dem Süden eingetreten ist, war lange bekannt, und es war nur folgerichtig, daß E. Sueß den Himalaya als die südlichste der nach Süden gerichteten Gebirgswellen auffaßte, die von dem Scheitel Asiens her das zentralasiatische Land in Falten legten. Die ostindische Halbinsel ist für Sueß der Widerstand leistende Horst, wider den die Faltenwellen von Norden her aufbrandeten.

Doch ist im Falle des Himalaya dieses Aufbranden nicht so deutlich, wie z. B. beim Schweizer Jura, dessen Wellen sich im Norden auf das starre Tafelland auflegen. Zwischen Himalaya und Halbinsel, zwischen Faltenland und Vorland ist die indogangetische Ebene eingeschaltet, eine Synklinale von der Art der „Vortiefen“, die nach Sueß das Absinken des Vorlands oder eines Vorlandstreifens unter das Faltengebirge bedeuten. Es ist nicht ganz deutlich; wieso es bei dem gewaltsamen Aufpressen einer sich faltenden Masse auf ein starres Widerlager zur Bildung einer Lücke kommen kann; auch spricht Sueß von der indogangetischen Vortiefe nur wenig und nur ganz in beschreibenden, nicht in erklärenden Worten. Burrard kritisiert daher die Anwendung der Sueßschen Erklärung der Faltengebirge auf den Himalaya im allgemeinen, und auch wir meinen, daß starres Vorland und nachgiebige Vortiefe sich ausschließen. Ob dagegen die geophysikalische

¹⁾ T. G. Bonney and Miss C. A. Raisin, a. a. O., S. 62.

Betrachtung die Probleme löst, läßt sich noch nicht absehen. Jedenfalls lehrt sie uns Tatsachen in der Massenverteilung im Gebirge und in dessen Vorland erkennen, an denen der Gebirgsforscher nicht vorbeigehen darf.

Es trifft sich wohl sehr glücklich, daß bei Gelegenheit der Darstellung der Ergebnisse neuerer geophysikalischer Untersuchungen S. G. Burrard¹⁾, der Leiter des Trigonometrical Survey of India, es unternommen hat, auch einen Überblick über die Geschichte der geophysikalischen Beobachtungen am Himalaya zu geben, so daß der Referent in der angenehmen Lage ist, die den Fachleuten wohlbekannten Tatsachen noch einmal einem weiteren Kreise vorführen zu können.

Bekanntlich wird durch die Anziehung seitlich wirkender Massen, wie z. B. von Gebirgen, die Lotlinie abgelenkt, so daß das astronomische Zenit weiter vom Gebirge wegrückt, als das geodätische Zenit. Nun fand bei Vermessungsarbeiten in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts Sir George Everest, daß bei Kalia, 64 km vom Gebirgsfuß, 192 km von der Hochgipfelkette in der Ebene gelegen, die Ablenkung nur 7" betrug, während Pratt (1852) für diesen Punkt einen normalen Wert von 27" berechnete. Pratt entwickelte daraufhin seine Theorie von der Kompensation der Gebirge: Der in der Gebirgsauftragung angezeigte Massenüberschuß ist im Himalaya irgendwie kompensiert und übt daher nicht die ablenkende Wirkung aus, die man erwarten sollte. Die Fortführung der Triangulierungsarbeiten nach dem Gebirge hin ergab jedoch, daß der Himalaya nicht, oder nicht vollständig kompensiert ist. So zeigten die Stationen des Subhimalaya:

Dehra Dun (88 km nördlich Kalia) 37", Radschpur 47", Sili-guri 23".

Im „Outer Himalaya“, also weiter gegen das Gebirge hinein, waren die Ablenkungen noch größer:

Kurseong 51", Tonglu 42", Birond 44", Mussooree 37".

Da das Gebirge also nicht als kompensiert gelten kann, mußte der geringe Grad von Ablenkung in Kalia erklärt werden. Dieser kann nun sehr wohl die Folge einer von Süden her wirkenden Massenanhäufung sein; und so spricht Burrard von einer „unsichtbaren Zone von außerordentlicher Dichte“, die in 240 km Abstand vom Gebirgsfuß, zwischen 22 und 24° nördlicher Breite, die indogangetische Ebene unterlagert.

Die Frage nach der Verteilung der Massen im Gebirge wurde durch die seit 1903 ausgeführten Pendelbeobachtungen neu beleuchtet, die ja die Anziehung durch die im Vertikalprofil liegenden Massen angeben. Dabei erwies sich für die Stationen im Gebirge und am Fuß des Gebirges das Vorhandensein beträchtlicher Massendefekte. So zeigt

¹⁾ Burrard-Hayden, a. a. O., S. 51 ff. Burrard, On the origin of the Himalaya Mountains. Survey of India. Professional Paper No. 12. (Calcutta 1912.)

Kurseong	(1350 m) — 1097 m	Siliguri	(118 m) — 1170 m
Dardschiling	(2123 m) — 1240 m	Dehra Dun	(683 m) — 1048 m
Sandakphu	(3585 m) — 1274 m	Kalka	(671 m) — 727 m
Mussooree	(2130 m) — 975 m	Pathankot	(332 m) — 1541 m
Simla	(2147 m) — 1030 m		

Auch die Stationen in der Zone zwischen 32 und 48 km Abstand vom Gebirgsfuß zeigen noch Defekte:

Dschalpaiguri (85 m) — 823 m; Ludhiana (254 m) — 77 m.

Während in größerem Abstand (128—192 km) Massenüberschuß besteht:

Kisnapur (34 m) + 305 m; Mian Mir (215 m) + 52 m;

Ferozepur (197 m) + 69 m.

Also auch die Pendelbeobachtungen scheinen zu beweisen, daß unter der indogangetischen Ebene eine Zone größerer Dichte verborgen liegt.

Da somit in einem Querschnitt von verhältnismäßig geringer Länge starke Massendefekte und wiederum beträchtliche Massenüberschüsse festgestellt sind, ist es von Interesse, Burrards Berechnungen und Überlegungen an einem bestimmten Beispiel zu studieren. Es sei der im Meridian von Dardschiling gelegene Querschnitt Kurseong—Siliguri—Dschalpaiguri [Jalpaiguri]—Tschenduria [Chanduria] gewählt.

Die beobachteten Ablenkungen, die sich durch Abziehen der geodätischen Werte für Länge und Breite von den astronomischen Werten ergeben, sind für die Gebirgsstrecke kleiner, als sie sein würden, wenn keine Kompensation bestände, aber sie sind größer, als sie sich unter der Voraussetzung isostatischer Kompensation der Terrainformen ergeben würden. Oder, was dasselbe bedeutet, sie sind kleiner als die „topographischen“, aber größer als die „Hayfordschen“ Ablenkungen. Es bleibt ein „unerklärter Betrag von Ablenkung“ für die Stationen im Gebirge und unmittelbar am Gebirgsfuß übrig.

	Meeres- höhe	Abstand von Kurseong	Topo- graphi- sche Ab- lenkung	Hayford- sche Ab- lenkung	Beob- achtete Ab- lenkung	Un- erklärter Betrag von Ab- lenkung
Kurseong	1350 m	—	— 71"	— 23"	— 46"	— 23"
Siliguri	122 m	19,2 km	— 52"	— 12"	— 18"	— 6"
Dschalpaiguri	85 m	40,0 km	— 45"	— 8"	— 1"	+ 7"
Tschanduria	49 m	120,0 km	— 31"	— 2"	+ 9"	+ 11"

Die „unerklärten Beträge von Ablenkung“, d. h. von südwärts gerichteter Zenitverschiebung, stellen das Symptom eines trotz alledem bestehenden nicht kompensierten Überschusses an Masse dar: der Massen-

defekt bleibt in Kurseong mit 1097 m um 253 m gegen die Erhebung über das Meeresniveau zurück. Es gibt also tatsächlich ein der Faltung verdanktes Plus von Masse, dessen ablenkende Wirkung allerdings nur einem Bruchteil der theoretisch geforderten „topographischen“ Ablenkung entspricht. Aber die beobachtete Ablenkung nimmt gegen den Gebirgsfuß und nach der Ebene zu schneller ab, als die Abnahme des Gebirgsreliefs das erwarten läßt; die Massenverhältnisse entsprechen den Reliefverhältnissen nicht, sind unabhängig von ihnen. Die im Vergleich mit der theoretischen Abnahme der topographischen Ablenkung so schnelle Abnahme der beobachteten Ablenkung scheint einem schnell anwachsenden Massendefekt zu entsprechen, der gerade im Gebirgsabfall eingeschaltet ist und gegen Süden unter der Ebene wieder ausklingt.

Diesen Massendefekt kann nach Burrards Meinung die Sueßsche Anschauung von der Genesis des Himalaya nicht erklären: Überfaltung nach Süden muß Zunahme der Dichte bewirken, nicht aber ein Manko an Masse zur Folge haben. Der Wert der Ablenkung müßte unter dieser Voraussetzung gleich der topographischen Ablenkung vermehrt durch die Ablenkung infolge des in dem Begriff „Vortiefe“ ausgedrückten Massendefektes unter der indogangetischen Ebene sein. Aber das Umgekehrte ist der Fall: die beobachteten Ablenkungen an den Stationen der Außenzonen des Himalaya sind bedeutend kleiner als die topographischen Ablenkungswerte.

Nun wäre der Fall denkbar, daß die Vortiefe selbst die schnelle Abnahme der beobachteten Ablenkung bedingen würde. Darum sucht Burrard rechnerisch zu einer Vorstellung von den Maßen einer indogangetischen „Vortiefe“ zu gelangen, die imstande wäre, die beobachtete schnelle Abnahme der ablenkenden Wirkung des benachbarten Gebirges zu bewirken. Der Abnahme der beobachteten Ablenkungen von Kurseong bis Tschanduria würde danach eine Synklinale von 112—128 km Länge und 9,6 km Tiefe unter Tschanduria, 3,2 km Tiefe unter Siliguri bei einer Sedimentfüllung mit Material von der Dichte 1,9 entsprechen, während für die Dichte der Gesteinsumrandung ein Betrag von 2,7 angenommen wird.

Doch mit solchen Tiefenwerten glaubt Burrard noch nicht auskommen zu können: die Tiefe der Synklinale wird noch größer, weil in 9,6 km Tiefe der Druck wahrscheinlich die Dichte vermehrt, und ferner sei die Dichte der Gesteine der Siwalikzone nur 2,2, was allein schon die Tiefe der Synklinale auf 25,6 km anwachsen läßt! Eine solche Mächtigkeit der indogangetischen Sedimentfüllung ist schwer vorstellbar, und außerdem wäre eine solche Geosynklinale unkomponiert, während der Himalaya, wie wir sahen, zum großen Teil komponiert ist.

Da die „Vortiefe“, um die beobachteten Erscheinungen erklären zu können, unmögliche Dimensionen haben müßte, verlegt Burrard die Ur-

sache der schnellen Abnahme der Ablenkung in den Untergrund des Gebirgsabfalls selber. Es ist das gewiß nichts anderes als die durch Sterneck und Helmert festgestellte Existenz von Massendefekten im Untergrunde der Gebirge, die wir schematisch mit der fortschreitenden Ausgleichung der Faltung nach der Tiefe zu wiederzugeben pflegen. Burrard jedoch nimmt eine subkrustale Spalte an, die in ostwestlicher Richtung, und zwar von Süden nach Norden, aufriß, so daß die dünne Sedimentdecke hineinstürzte und sich in nach Süden überliegende Falten warf. Die Überfaltung nach Süden sei also nicht eine Folge der großen Runzelung Asiens, sondern eine Folge des Zurückbleibens der Sedimentdecke auf der nach Norden gerückten Nordflanke einer Spalte. Das Aufreißen dieser Spalte denkt sich Burrard nicht als einmaliges Ereignis, sondern als einen fortgesetzten Vorgang, so daß sich die Spalte erweitert, womit die Erscheinung der Fortpflanzung der Faltung vom Alttertiär bis ins Pliozän erklärt wäre, ja die modernen Erdbeben in der Randregion des Himalaya würden die Äußerungen tektonischer Bewegungen an dieser Randspalte vorstellen.

So einfach er erscheint, so birgt der Bau des Himalaya doch noch große Rätsel. Die starke Überfaltung in der Randzone, das Fehlen einer Zone des Austönens bei dem Mangel eines stauenden Widerlagers erheischen eine Erklärung, und ebenso ist das „unterirdische Gebirge“ in der indogangetischen Ebene für uns noch schwer verständlich. So kann auf der einen Seite die Sueßsche Vorstellung vom schrumpfenden Kern und der runzelnden Decke die Lösung nicht bringen; auf der anderen Seite aber fällt Burrards Anschauung von einer nach Norden zu stattfindenden Zerrung zu sehr aus dem Rahmen der geologischen Erfahrung, als daß wir in ihr mehr sehen könnten, als einen Versuch, einige geophysikalische Erscheinungen der Erdkruste in der Himalayaregion physikalisch einwandfrei zu deuten.

5. Die Erkundung der Gletscherregion.

Dem kleinen Stabe von Gelehrten, dem die geologische Aufnahme von Britisch-Indien anvertraut ist, sind der Aufgaben zu viele gestellt, als daß von dieser Seite her eine Darstellung der Gletscherwelt des Himalaya in nächster Zeit zu erwarten wäre. Weite Teile der Hochregion sind dazu noch den Europäern verschlossen, so Nepal mit den Gletschern des Mount Everest-Massivs; in andere Teile ist die Grundlage aller wissenschaftlichen Arbeit, die trigonometrische Aufnahme, noch nicht gelangt. Auch in den aufgenommenen Gebieten sind die Gletscher nur sehr unvollkommen bekannt; datieren doch die Kartengrundlagen für unsere heutige Kenntnis zum Teil aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ferner ist die Geländezeichnung in der Gletscherregion meist hypothetisch, und im

besten Falle stark schematisiert. Bei den ungeheuren Anstrengungen, die der kartierende Offizier im Himalaya zu überstehen hatte, bei den Schwierigkeiten, die die großen Entfernungen, die Trägerfrage, die Kürze der Reisezeit verursachen, ist das nicht zu verwundern. So wird es noch lange Zeit dauern, bis wir alle Gletscher kennen, und gar nicht abzusehen ist es, bis wir erst einmal einen Gletscherkatalog besitzen werden, in dem Lage, Länge, Meereshöhe und Gestalt der einzelnen Gletscher vermerkt sein werden. Erst wenige Gletscher haben durch häufigen Besuch und durch an ihnen geleistete Forscherarbeit in unserer Vorstellungswelt Gestalt gewonnen, die anderen werden, als unwichtig, auf den Übersichtskarten weggelassen; so verzeichnet z. B. eine mir vorliegende Karte von E. G. Ravenstein¹⁾, obwohl sie eine sehr deutliche Signatur für „Gletscher“ anwendet, nur neun Gletscher, und zwar nur im Mustagh-Karakoram, auf diese Weise die Vorstellung erweckend, als sei das Gletscherphänomen auf diesen Gebirgstheil beschränkt. Den ersten Versuch einer Aufzählung der bestbekanntesten Gletscher machten (1907!) Burrard und Hayden²⁾, die aber nur 57 Gletscher aufzählen, und von diesen nur den Namen — wenn ein solcher existiert oder bekannt ist (bei fünf fehlt er!) —, Länge und entwässernden Fluß anführen. Für den Nepal-Himalaya wissen sie keine Daten beizubringen. So kann es auch uns nicht beikommen, eine Darstellung der Vergletscherung des Himalaya geben zu wollen. Nur ein paar Leitlinien seien hier gezogen, wie sie sich als Folge eifriger Beschäftigung mit dem wenigen, was bekannt ist, dem Referenten ergeben haben³⁾.

Die in dem Burrard-Haydenschen Katalogisierungsversuch enthaltenen Angaben zeigen, daß man, wie ja zu erwarten, in diesem Stadium der Erforschung die Aufmerksamkeit fast allein den großen Talgletschern zugewandt hat; auch die Karten, wie vor allem die Blätter des Indian Atlas, verzeichnen lediglich diese. Das wirkliche Bild der Vergletscherung aber läßt uns die Talgletscher nur als einen Teil des vergletscherten Areals erscheinen. Die verfirnten Hänge, die verfirnten Massive verdienen dieselbe Signatur, wie die eiserfüllten Täler, und wenn man eine vergletscherte Hochgebirgslandschaft studiert und betrachtet, so ist der Talgletscher schließlich nichts anderes als der Abfluß dieser Eismassen, und zwar auch nur der Abfluß nach einer Seite. Viel zu sehr sind wir gewöhnt, dem Gletscher von seiner Stirn her zu nahen, die Vorgänge an seiner Zunge

¹⁾ A map of the Indian Empire including Ceylon and the Strait Settlements, 1 : 5 000 000. London u. Liverpool (George Philip and Son).

²⁾ Burrard-Hayden, Abschnitt 29: The Glaciers of High Asia.

³⁾ Als Ergänzung zu dem hier Folgenden möge der Leser die den Himalaya angehenden Abschnitte in Charles Rabot, *Revue de Glaciologie* No. 3 (Mittlgn. Naturf. Ges. Freiburg-Schweiz, Bd. V, 1909) heranziehen.

zu studieren. Wir führen die Gletscher auf nach den Flußgebieten, welchen sie angehören, als ob uns der einseitig hydrologische Standpunkt allein angehe. Als ob nicht die Vergletscherung des ganzen Gebirgsmassives, Einzelberges oder Gebirgskammes an sich schon unser Interesse fesselte.

Das Wesen der Vergletscherung eines Gebirges wird bestimmt durch die Höhe der Schneelinie und durch die Gestalt, also durch das Entwicklungsstadium des Gebirges. Dieses Stadium bedingt die größere oder kleinere Ausdehnung der über die Schneegrenze aufragenden Fläche, es bedingt die Größe der Firnmulden und bedingt dadurch auch die Länge der Talgletscher; denn diese Länge bedeutet nichts anderes, als das Verhältnis zwischen Schneelieferung und Schneeschmelze. Ist die Schneelieferung sehr bedeutend und bestehen große Schneereservoirs, die ungeheure Schneemassen in den Gletscher herabschieben, so ist die Länge des Gletschers eine bedeutende. Es handelt sich hier meist um die in den Längstälern gelegenen Gletscher; denn diese fließen aus einer großen Zahl von quergerichteten Ursprungsgletschern zusammen und haben bisweilen ein großes Schneereservoir an ihrem Ursprung, wie z. B. der Biafo in dem sog. Snow lake¹⁾. Gewöhnlich liegt das Gletscherende in beträchtlicher Meereshöhe, da das Gefälle der Längstäler ein verhältnismäßig geringes ist, so daß die Schmelzung, orographisch betrachtet, früher stattfindet, als bei den kürzeren quergerichteten Gletschern. Es kommt im Himalaya häufig vor, daß viele Kilometer unterhalb der Endigung des Hauptgletschers ein Seitengletscher noch nahe ans Haupttal herantritt, dessen Endigung alsdann bedeutend tiefer liegt, als die des Hauptgletschers. So endigt der Hispar-Gletscher in 3300 m, während noch 60 km weiter abwärts der Minapin-Gletscher, ein kurzer Quertalgletscher, sicherlich tiefer als in 2400 m endigt²⁾.

Erst über wenige Gebirgsgruppen sind wir in bezug auf ihre Vergletscherung dergestalt orientiert, daß wir uns auf Grund von genauerer Aufnahme und Kartierung ein Bild vom Ganzen, von der Gliederung der Gebirgsrippen, von Verlauf, Lage, Länge der Talgletscher, von der Größe der Firnmulden, von der Ausdehnung der Verfirnung der Gehänge machen können. Vorbildlich dafür ist die Aufnahme des Gletschergebiets des Kandschindschanga durch D. W. Freshfield und E. J. Garwood³⁾. Die Karte

¹⁾ Zuerst entdeckt von W. M. Conway, *Climbing and exploration in the Karakoram-Himalayas*. (London 1894), 378 ff.

²⁾ *Preliminary survey of certain glaciers in the North-West Himalaya*. By officers of the geological Survey of India. (S. u.!)

³⁾ Douglas W. Freshfield, *The glaciers of Kangchenjunga*. *Geogr. Journ.* XIX, 453—472, mit Diskussion 472—475. E. J. Garwood, *Notes on a map of „the glaciers of Kangchenjunga“*, with remarks of the physical features of the district. *Ebenda*, XX, 13—24, mit der Karte. D. W. Freshfield, *Round Kangchenjunga*.

in 1 : 125 000, von letzterem entworfen, zeigt die durch glaziale Erosion zu einem Karling mit ganz dünnen Graten ausgestaltete, gewaltige Massenschwellung, in die vier große Gletscherbecken eingreifen, in deren Peripherie noch andere Gletschersysteme eingemeißelt sind. Die Vergletscherung dieser Gruppe ist eine radialstrahlige, d. h. sie ist abgesetzt von der Vergletscherung der Umgebung und strahlt von einem Zentrum aus. Die Schneegrenze liegt nach J. D. Hooker¹⁾ an den südlichen Abhängen des Kandschindschanga-Massivs bei 4900, während sie in Obersikkim, also bei den Hochgipfeln am Oberlauf des Tista, bis etwa 5800 m hinaufgerückt ist; Freshfield gibt nur beiläufig einmal an, daß die dauernde Schneebedeckung von 5500—5800 m²⁾ an beginne. Doch wurden von der Expedition darüber keine Beobachtungen angestellt. Auch die von Freshfield gegebene Zusammenfassung³⁾ über die Vergletscherung der Gruppe ist sehr knapp gehalten. Die längsten Gletscher der Gruppe sind der östliche, der Zemu-gletscher mit 28 oder 23⁴⁾ km, und der westliche, der Kandschindschanga-gletscher, mit 24 oder 21⁴⁾ km Länge, und der erstere soll mit einem Ende in ca. 3950 m der tiefste Talgletscher in Sikkim sein. Weiter wird von der Lawinenglättung der steilen Hänge, von der auffälligen Modellierung der oberen Gletscherpartien in Eispeiler und von der starken Schuttbedeckung der Zungen berichtet. Die Hauptsache aber ist, wie gesagt, die in der Garwoodschen Karte niedergelegte Orientierung über Gebirgs- und Gletschergliederung dieses mit seiner östlichen Abdachung dem Gebiet des Tista (zum Bramaputra), mit der westlichen aber dem des Kosi (zum Ganges) zugehörigen Massivs.

Im Westen folgt, von den breit ausladenden Ursprungstälern des Kosi gefaßt, die Gruppe des Mount Everest (8840 m) und Makalu (8469 m), von der bis jetzt nur Weitblicke aus etwa 130 km Entfernung gewonnen sind, so von K. Boeck⁵⁾ und auf Freshfields Kandschindschanga-Expedition⁶⁾ von V. Sella. Jenseits eines reif zerschnittenen, aber ursprünglich wohl fast ebenen Berglandes, das durch tiefe Quertäler gegliedert wird, erhebt sich

A narrative of mountain travel and exploration. London 1903, mit der Karte, einer Karte mit geol. Eintragungen und verschiedenen Anhängen, darunter: E. J. Garwood. The geological structure and physical features of Sikkim (mit Literatur).

¹⁾ J. D. Hooker, Himalayan Journals (The Minerva Library of famous Books). London, New York, Melbourne 1891, S. 555 u. 379.

²⁾ Geogr. Journ. XIX, 466. „Round Kangchenjunga“, S. 123.

³⁾ Round Kangchenjunga, S. 233—236.

⁴⁾ Burrard-Hayden, S. 195.

⁵⁾ K. Boeck, Indische Gletscherfahrten. Stuttgart u. Leipzig 1900. Tafel bei S. 304.

⁶⁾ Freshfield, Round Kangchenjunga, 199 ff., Taf. bei 202 und Appendix D (abgedruckt aus Geogr. Journal März 1893). Über die Lage zu dem hydrographischen Netz orientiert Burrard-Hayden, Chart XXVIII.

hochthronend das vergletscherte Massiv, von dessen Gipfeln Makalu¹⁾ durch das gewaltige Kar auffällt, das seinen Gipfel im Osten geradezu aushöhlt, vielleicht das größte Beispiel eines Kars überhaupt; während Mount Everest oder Tschomokankar²⁾, wie er nach Tschandra Das in Tibet genannt wird, von Osten mehr als eine gewaltige Schneemauer erscheint. Von der Gliederung des Massivs und der Anordnung seiner Gletscher haben wir noch keine Kunde. Auch aus Tibet, von wo Mount Everest zur Zeit der Lhasa-Expedition von dem Lager zu Kampa Dschong aus erblickt wurde, war nichts zu sehen, als der überragende, gänzlich isolierte Mount Everest.

Gut unterrichtet sind wir über die Vergletscherung des zentralen Himalaya von Kumaon und Garhwal, also des Gebirges am Ursprung des Ganges, das im 7816 m hohen Nanda Devi kulminiert. Es sind hier, wie auf Chart XI (unten) bei Burrard-Hayden zu sehen, mindestens zwei Kammlinien ausgeprägt, deren vordere eben Nanda Devi mit seinen Trabanten, deren nördlichere den fast gleich hohen Kamet (7755 m) enthält. Die Schneegrenze liegt, wie C. Diener³⁾ auf Grund von Stracheys und eigenen Beobachtungen festgestellt hat, jedesmal auf der Nordabdachung tiefer als am Südhang, hebt sich aber im Ganzen von der südlicheren (oder westlicheren) zur nördlicheren (oder östlicheren) Kammlinie und darüber hinaus. So liegt sie nach Strachey an den Südhängen des Nanda Devi-Massivs in 4750 m, an den West- (Nordwest-?) Hängen in 4690 m, im Kamet-Kamm in der Gegend des Uthadura-Passes nach Diener an der Südwestseite in 5400 bis 5500 m, an der Nordostseite in 5300—5350 m. Auf den nach Nordosten zu folgenden Bergen stellte Diener fest, daß die Schneegrenze im Südwesten etwa in 5850 m, am Nordosthang aber in 5640 m liegt. In der nördlich des Satledsch gelegenen Kailas-Kette aber liegt die Schneegrenze nicht unter 6100 m. So ist hier das Ansteigen der Schneelinie in einem regelrechten Profile von Westen nach Osten wie in einem Idealbilde beobachtet, und die Tatsache des Ansteigens verrät schon, daß nach Osten zu eine Verarmung des Gletscherphänomens zu erwarten ist, d. h. daß auch in bedeutender Meereshöhe nicht mehr alle Täler und Flächen vom Eise erfüllt sind. In der Tat ergeben die Abbildungen bei Griesbach⁴⁾ und Diener⁵⁾ den Ein-

¹⁾ S. „The Nepal peaks from Sandakphu“, Taf. bei S. 358, Freshfield a. a. O., s. auch Burrard-Hayden, S. 9.

²⁾ Freshfield a. a. O., S. 200 ff.

³⁾ C. Diener, Schneegrenze und Gletscher im Central-Himalaya. D. Rundsch. Geogr. Stat. XVI, 4. Heft.

⁴⁾ C. L. Griesbach, Geology of the Central-Himalayas. Mem. Geol. Surv. Ind. XXIII.

⁵⁾ C. Diener, Mitteilungen über eine Reise im Central-Himalaya. Z. D. Oe. A. V. 1895, 269 ff.

druck der verarmten Vergletscherung, bzw. der Annäherung an tibetische Verhältnisse. Stark vergletschert ist jedoch die Gruppe des Nanda Devi, aber dieser Gipfel ist nicht in dem Maße die einzige Kulmination der Gruppe, wie z. B. der Kandschindschanga. Nanda Devi scheint von den zwei, je 19 km langen Ursprungsarmen des zum Rishi Ganga (Nebenfluß des Dhaul Ganga) gehenden namenlosen Gletschers¹⁾ fast vollständig umfaßt zu sein, so daß sein südöstlicher Nachbar, Nanda Kot (6867 m) den wahren Knoten der Gruppe darstellt, von dem nach Westen der vergletscherte Grat des Trisul und nach Norden der Grat zu dem gleichfalls ein Gletscherzentrum darstellenden, etwa 7000 m hohen²⁾ Szurdzekund abzweigt. Gerade der bekannteste und seiner Länge nach den erwähnten Nanda Devi-Gletschern gleichkommende Eisstrom, der Milam-Gletscher, fließt vom Szurdzekund ab und erfüllt die östlich des Nanda Devi-Massivs hinziehende tiefe Furche des oberen Gori-Tals. Der Gegensatz dieses tief eingeschnittenen Gletschertales mit dem in der Höhe thronenden vergletscherten Gebirge und dessen Gipfeln tritt auf dem Titelbilde von Boecks mehrfach angeführtem Reisewerke schön hervor. Der von Diener³⁾ gegebenen Schilderung nach ähnelt der Milam-Gletscher durch seine Länge, seine Lage in schmalem, langgestrecktem Tale, durch die regelmäßige Anordnung seiner Nebengletscher, durch seine geringe Zerspaltung wie große Schuttbedeckung, den großen Talgletschern des Mustagh. Sein Ende liegt bei 3456 m. In ähnlicher Höhe liegen die Enden der übrigen Gletscher⁴⁾.

Wir nähern uns in unserem Überblick nunmehr dem nordwestlichen Himalaya. Starke Vergletscherung zeigt sich hier überall, allerdings weniger nach der Größe der verfirnten Region oder nach der Länge der Talgletscher, aber sie ist ausgezeichnet durch eine ungeheure Anzahl kurzer quergerichteter Gletscher, mit denen die schmalen Kammlinien besetzt sind. Vom nordwestlichen Himalaya selbst liegt uns eine Art Übersichtskarte der Vergletscherung vor in der Kartenbeilage zu Drews Standardwerk „The Jummoo and Kashmir Territories“⁵⁾. Hier sind auf einer Karte in etwas über 1 : 1 000 000 die Talgletscher und hochgelegenen Firnbecken mit einer besonderen Farbe (grün) eingetragen. Aber noch wichtiger und origineller ist die „Snow map“, in etwa 1 : 2 000 000, in der mit besonderen

¹⁾ Burrard-Hayden, S. 195, führt sie getrennt auf, während die Karte in Boeck, Indische Gletscherfahrten, sie die zwei Ursprungsarme eines Gletschers sein läßt.

²⁾ Diener, Z. D. Oe. A. V. 1895. 283.

³⁾ D. Rundsch. Geogr. Stat. a. a. O.

⁴⁾ Heim, Gletscherkunde, 423 f.

⁵⁾ F. Drew, The Jummoo and Kashmir Territories. A geographical account. London 1875.

Farbentönen die Gebiete ohne Schneefall, das Gebiet mit weniger als drei Monate wählender, mit drei oder mehr Monate wählender und mit ewiger Schnee- und Eisdecke eingezeichnet sind, soweit das Gebiet zur Zeit der Abfassung des Buches (70 er Jahre des vergangenen Jahrhunderts) dem Maharadscha von Kaschmir unterworfen war, also mit Ausschluß von Hunza und Nagar. Hier ist der Versuch gemacht, alles über die Schneelinie aufragende oder von Gletschereis bedeckte Land innerhalb eines größeren Gebietes kartographisch darzustellen. Zu diesem Versuch ist allerdings zu bemerken, daß im Gegensatz zu der gewöhnlichen Kartendarstellung, z. B. auf den Blättern des Indian Atlas, wo ein Minimalmaß der Vergletscherung zur Darstellung gelangt, hier ein einigermaßen übertriebenes Bild der Vergletscherung geboten wird, wie der Autor selbst zu bemerken scheint. Seine Methode bestand darin, außer dem Beobachteten verfirntes Terrain nach Gutdünken dort einzuzichnen, wo die Anwesenheit von Gletschern auf die Existenz eines Reservoirs von ewigem Schnee schließen läßt. Wenn also auch hie und da, z. B. im Kamm zwischen Astortal und Indus, das vergletscherte Areal zu groß angegeben sein dürfte, so entsteht doch im großen und ganzen ein brauchbares Bild, das geeignet sein kann, eine Vorstellung von der Größe des wirklich unter dem Regime des ewigen Schnees stehenden Areals zu geben. Im begleitenden Text¹⁾ gibt Drew Angaben über die Höhe der Schneegrenze in dem Gebiet. Und zwar erscheint die vorderste Kette, Pir Pandschäl, unter der Schneegrenze zu bleiben, obwohl sie Höhen von bis zu 4400 m enthält. Sie ist gletscherfrei²⁾. 5000 m nimmt Drew als Höhe der Schneelinie in dieser Zone an, wozu, wie er bemerkt, die Erscheinungen in der südöstlichen Fortsetzung, in Tschamba, stimmen, wie auch in Kaghan, nordwestlich von Kaschmir, Berge von 5100 m bereits Gletscher tragen. Die unter dem Namen „Zanskar-Kette“ gehende Hauptachse des Gebirges, eine breite Massenanschwellung von Urgebirge und von Gletscherterrain, hat gleichfalls ihre Schneegrenze in etwa 5000 m. Die Kette zwischen Indus und Schayok mit ihrer streichenden Fortsetzung, dem Gebirge zwischen Astor und Indus, zeigt im Nordwesten immer noch die Schneelinie in 5100 m, aber diese steigt gegen Südosten zu an und liegt in der Gegend von Leh bei Südexposition in 5800, bei Nordexposition 300 m tiefer. Für das Mustagh-Karakoram-Gebirge gibt Drew sehr allgemein 18 000', also etwa 5500 m, an mit Ansteigen auf 6000 m im Südosten, in der Gegend von Nubra. Die Schlagintweits³⁾ verzeichnen für die Karakoram-Kette, und zwar im westlichen Teile, 5650 m für Nord- und 5950 m für Südexpo-

¹⁾ S. 481 ff.

²⁾ E. Neve, *Beyond the Pir Panjal*. London 1912, S. 22 ff.

³⁾ H. von Schlagintweit, *Reisen in Indien und Hochasien*. IV. Bd. Jena 1880, S. 522.

sition. So ist hier ein zweites Schneelinienprofil bekannt, das zum Unterschied von dem des Himalaya von Kumaon nur ein geringes Ansteigen nach Norden aufweist; ferner nimmt hier die Vergletscherung von Süden nach Norden zu und die stärkste Vergletscherung findet in der nördlichsten Zone statt.

Im nordwestlichen Himalaya treten neue Typen der Vergletscherung auf; auch ist hier die Vergletscherung, aber allerdings auch vorherrschend in der innersten Zone, dem Mustagh (Karakoram), dank der unermüdlichen Arbeit des Bergsteigerpaares Workman und anderer am besten bekannt. Die erste Hoherhebung des Hauptkammes ist die Nun Kun-Gruppe, die sich um drei Hochgipfel von 7146 m (Nun oder Ser), 7080 m (Kun oder Mer) und 71000 oder 6952 m¹⁾ (dem von Workmans erstiegenen und benannte Pinnacle Peak) gruppiert. Gewöhnlich, nämlich beim Anblick von Süden und Südwesten her, werden nur Ser und Mer wahrgenommen. Deshalb wird das Gebirge nach ihnen benannt, und Drew²⁾ bereits gab eine Skizze beider Berge, wie sie vom Margan-Paß (östlich Islamabad in Kaschmir) aus erscheinen und erwähnt, daß sie, weithin sichtbar, ihre Umgebung um 1000 m überragen. In einem durch wunderbare Photographien erläuterten Reiseberichte³⁾ geben Dr. und Frau Fanny Bullock Workman ihre Beobachtungen in der Gletscherregion dieser Gruppe wieder. Die Karte in 1 : 150 000 verzeichnet die nach allen Seiten niederziehenden, besonders in den nördlichen Quadranten stark entwickelten Gletscherströme. Von diesen seien der von Workmans in seiner ganzen, 16 km betragenden Länge erkundete Schafatgletscher und der aus zwei Armen entstehende Ganrigletscher erwähnt, der nach 13,5 km langem Laufe in etwa 3500 m vom Surufluß abgeschnitten wird⁴⁾. Blatt 45 des Indian Atlas, aus den 60er Jahren, läßt den Gletscher in einiger Entfernung vom Flusse endigen. Aus der Workmanschen Beschreibung geht aber hervor, daß heute ein Ablösen längs der Spaltenflächen und ein Forttreiben kleiner Eisberge im Suru stattfindet. Die auffälligste Form der Gruppe ist aber das Nun Kun-Plateau, eine das Dach des Gebirges darstellende, fast ebene und vom Firn fast vollständig ausgeglichene Fläche von 5,4 km Länge in NO—SW, und 2,4 km in NW—SO-Richtung⁵⁾. Von Nordosten fällt es nach Südwesten von 6580 auf 6165 m. Sieben Gipfel ragen an seinen Rändern auf, steil und schroff, um noch steiler nach außen abzufallen. Dazwischen gehen die Gletscher

¹⁾ A. Neve in *Geogr. Journal* XXXVIII, 355.

²⁾ Drew, a. a. O., 198 f.

³⁾ F. Bullock Workman and W. H. Workman, *Peaks and Glaciers of Nun Kun*. London 1909.

⁴⁾ Ebenda, S. 103 f., Tafel. Ferner: A. Neve a. a. O., Tafel bei 353.

⁵⁾ Ebenda, 66 ff. 2 ff. 1 Tafeln.

hinab, Ganri nach Norden, Schafat nach Nordosten und Fariabadgletscher nach Süden. Nur die Schneekoppe im Riesengebirge, wie sie sich vom Koppenplan erhebt, kann als Parallele herangezogen werden, wenn man Kleines mit Großem vergleichen darf. Das Betrachten der Bilder des Workmanschen Buches gehört zu den größten Genüssen, die sich dem Morphologen wie dem Alpinisten bieten. Welche Perspektiven gewährt das Betrachten dieses hochehobenen Überrestes einer uralten Landoberfläche dem Morphologen! Welches Erstaunen das Betrachten von Tafeln wie bei 68 und 102 dem Alpinisten! Der Gegensatz zwischen den Felsnadeln, die hunderte von Metern aufragen, und der plateauartigen Beschaffenheit des Kammes ist ganz eigenartig und scheint sich nicht auf das sogenannte Nun Kun-Plateau zu beschränken, sondern sich auch im westlichen Teil der Gruppe, im Firnfeld des Barmalgletschers wiederzufinden. Infolge des Plateaucharakters ihrer Firnregion scheinen die Gletscher dieser Gruppe, wenn man vom Schafatgletscher absieht, nicht so allgemein die sonst bei den Himalayagletschern stets angetroffene Schuttbedeckung zu tragen.

Weiter im Westen verliert der Hauptkamm seine Höhe und schließlich überhaupt seinen Kammcharakter. Die Vergletscherung ist unbedeutend, da die Gipfel nicht viel über die in 5000 m gelegene Schneegrenze aufragen¹⁾. Der bekannteste der Gletscher der Sodschi La-Gegend, der — aber noch nicht untersuchte — Mechuhoigletscher, endigt in 3300 m²⁾. Weiterhin setzt die Vergletscherung fast vollständig aus, da der Kamm durch die 3000—4000 m hohe Déusi[Deosai]-Peneplain vertreten wird, über die sich erst fern im Westen wieder ein gewaltiges, vergletschertes Massiv, der noch wenig bekannte Nanga Parbat, erhebt³⁾. 8120 m ist die Höhe des Gipfels; doch strahlen von ihm nach allen Seiten Gipfelgrate aus, die noch eine Anzahl anderer Hochgipfel von Höhen zwischen 6000 und 7000 m und darüber tragen. So erscheint auch dieses Massiv zu gewaltigen Karen ausgehöhlt zu sein, in denen breit entwickelte Gletscher liegen⁴⁾. Eine von Südwesten nach Nordosten ziehende Hauptgratlinie scheint die südöstlichen von den nordwestlichen Talgletschergebieten zu scheiden. Im Südosten streben ein Gletscher von Südwesten und einer aus Nordosten einander entgegen. Letzterer ist der bekannte Tarschinggletscher, der in etwa 2865 m endigt und, von Zeit zu Zeit in das Rupäletal vorstoßend, dieses vollständig sperrt, so daß der Gletscherabfluß des südwestlichen Gletschers

¹⁾ Oestreich, Täler des Himalaya. 48.

²⁾ Drew a. a. O., 198. Abb. s. bei Oestreich a. a. O., Taf. 12.

³⁾ Drew 194 und 399 ff.

⁴⁾ Siehe Blatt 27 A SE des Indian Atlas mit der von Drew auf dessen Karte (Beilage zu dem zitierten Werke) angebrachten Verbesserung. S. Drew, Anm. S. 399. Über die Vergletscherung des westlichen Abhangs sind wir ohne genauere Nachricht.

gezwungen ist, in einem Tunnel unter dem Eise des Tarsching herauszufließen. Wenn nun der Tunnel irgendwie verstopft wird, steigt der Fluß, bildet einen See, bis dieser das Eis überschreitet, und nun kommt es zu einer Katastrophe, die sich bis weit in das Haupttal, das Tal des Astorflusses, fühlbar macht. In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, und wieder in 1909 fanden solche Ausbrüche statt, deren Auftreten alsdann den Vorstoßperioden des Gletschers entsprechen würde¹⁾. Als Länge der Gletscher des Nanga Parbat oder wie er in der Sprache Dardistans heißt, Diamir, finde ich bei Burrard-Hayden 11,2 km, und zwar für einen der Gletscher der westlichen Abdachung, angegeben. Doch gibt die Karte größere Werte. Charakteristisch für die Gletscher des Nanga Parbat ist, daß sie nicht vom Gipfelmassiv ausstrahlen, sondern, im Südosten wenigstens, konvergieren: „Konvergierende Vergletscherung“. Über die Gletscher der westlichen Abdachung ist wenig bekannt: ein breit verzweigtes Gletschersystem verzeichnet die Karte im nördlichen Teile.

Von dem Gebiet stärkster Vergletscherung im Himalaya, vom Mustagh (Karakoram), liegt außer der alten Karte: *The Territories of the Maharaja of Jummoo and Kashmir* in etwa 1 : 1 000 000, der Beilage zu Drews Buch, keine brauchbare Kartendarstellung vor. Und auch diese verzeichnet nur die Talgletscher, und diese nach dem Stande der Erforschung in 1875. Es fehlen hier vollständig die Gletscher am Nordabfall des Mustagh, über die allerdings auch heute nur wenige Nachrichten vorliegen. Younghusband²⁾ hat auf seinem berühmten Zug über den Mustaghpaß einen der Gletscher der Nordabdachung, den Sarpo Laggo-Gletscher, exploriert; sein Kärtchen gibt ihm 24 km Länge. Er gehört dem Gebiete des Yarkandzuflusses Schaksgam oder Oprang³⁾ an, dessen Oberlaufgebiet der später gleichfalls von Younghusband explorierte Urdokgletscher bildet. Eine etwas abweichende Darstellung dieser Gletschergegend gibt Br. Hassenstein auf Blatt 1 der Kartenbeilage zu Sven Hedins „Geogr.-wissenschaftl. Ergebnissen meiner Reisen in Zentralasien 1894—1897“⁴⁾. Man sieht, wie jenseits der Haupterhebung, die durch K₂ bezeichnet ist, die Vergletscherung schnell aufhört, daß aber auch noch im Gebiet des oberen Oprangflusses die für den Mustagh-Karakoram bezeichnende Längsvergletscherung ausgeprägt ist. Im übrigen zeigt die starke Schematisierung auf dieser Karte, wie wenig noch bekannt ist.

¹⁾ A. Neve, *Journeys in the Himalayas and some factors of Himalayan erosion* Geogr. Journ. XXXVIII, 350.

²⁾ F. E. Younghusband, *A journey across Central Asia, from Manchuria and Peking to Kashmir, over the Mustagh Pass.* Proc. Roy. Geogr. Soc. (N. S.) X, 485—514—518. Ferner: *The Heart of a Continent.* London 1896.

³⁾ Karte zu T. G. Longstaff, *Glacier exploration in the eastern Karakoram.* Geogr. Journ. XXXV (1910), 622 ff.

⁴⁾ Ergänzungsheft 131 zu Pet. Mittlgn.

Die ganze Vergletscherung des Mustagh-Himalaya wurde vom Verfasser kürzlich gekennzeichnet als die Vergletscherung einer reif zertalten und dann hochoberhobenen Gebirgspartie. Die große Erhebung hat das tiefe Einschneiden der Täler bedingt; es traf sich, daß in dem gehobenen Rindestück lange, im orographischen Streichen gedehnte Längstäler die herrschende Talform waren. Mit den in reifer Weise zertalten Gehängen, der starken Taldichte in den Gehängen dieser Längstäler war die Möglichkeit einer starken Firnansammlung in den oberen Partien dieser Längstäler gegeben. Die überragende Höhe des Gebirges und der reichliche Niederschlag taten das Übrige, und so wurden die drei bis vier Längstäler, die auf die ganze Länge des Gebirges in jedem Querschnitt auftreten, zu den gewaltigsten Bahnen des Eisabflusses, die es auf der Erde gibt, wenn man von den Polarregionen absieht, und den einen Riesengletscher des Tian Schan, den etwa 75 km langen Inyltschekgletscher¹⁾ ausnimmt. Im übrigen kann man die Vergletscherung des Mustagh mit der des Khan Tengri nicht vergleichen. Die Vergletscherung des Khan Tengri ist, wie die des Kandschindschanga, eine radialstrahlige Massivvergletscherung; im Mustagh dagegen spielt Gipfel und Kamm geringe Rolle, es ist hier ein lang ausge dehntes, breites Gebirge im Firn verhüllt, und ein ganzes Talsystem ist im Eis ertrunken. Die Gletscher strahlen nicht von Zentren aus, die Hochgipfel liegen seitlich, und nicht stets an den hervorragenden Stellen der Gletscherbeckenumrandung.

Am oberen Ende der Gletscher liegt nicht stets der beherrschende Gipfel oder eine Schulter im Gehänge dieses, sondern eine breite und verhältnismäßig tiefe Eisscheide, und jenseits dieser wird die Gletscherhohlform durch ein in entgegengesetztem Sinne geneigtes, gleichfalls vergletschertes Tal fortgesetzt. Das Großrelief ist also hier präglazial, während bei der radialen Vergletscherung das Großrelief, die Zerschneidung der Flanken des Einzelgipfels, eben das Werk der Gletscher gewesen ist. Als „Mustagh-Typus“ der Vergletscherung²⁾ wurde diese Vergletscherung eines durch langgestreckte parallele Talzüge gegliederten Gebirgslandes bezeichnet. Es fehlen die Firnflächen, die wir von unseren Hochalpen kennen, von den Berner wie von den Walliser Alpen; das ganze Gebirge ist gewissermaßen aufgeteilt, steile Firnhänge und Jocherniedrigungen sind die Schneelieferer für diese Gletscher, und wo einmal eine größere Firnsammelmulde vorkommt, da liegt sie in einem Tale. Es sei hier an die von Conway Snow lake benannte, in etwa 5000 m gelegene ertrunkene Tallandschaft im Oberlauf

¹⁾ Merzbacher, Der Tian Schan oder das Himmelsgebirge. Z. D. Oe. A. V. 1906, S. 141. Ferner: Pet. Mittlgn., Erg.-Heft 149. Friederichsen, Die heutige Vergletscherung des Khan-Tengri-Massivs usw. Z. Gl. II, 253.

²⁾ Oestreich, Der Tschochogletscher in Baltistan. Z. Gl. VI, S. 3.

des Biafogletschers erinnert¹⁾). Die ungeheure Ausdehnung dieser und ähnlicher Firnansammlungen wie des Hisparpasses oder des „Concordiabassins“ an der Gabelung des oberen Baltoro sind nur den ungeheuren Schneemassen zu verdanken, die sich hier aufhäufen: die Täler sind hoch hinauf mit Eis erfüllt, bis zu einer Höhe, in der auch der Talquerschnitt bereits eine ansehnliche Breite besitzt. Man betrachte Bilder, wie die Tafel bei S. 394 in Conways Buch oder die Karte bei Workman, und man wird sich die leider nicht zu beantwortende Frage vorlegen, wie tief hier die Eislage hinabreicht, welches die Gestalt des Felsuntergrundes dieser Täler unter der Eisbedeckung der Riesengletscher sein mag.

Die großen Längsgletscher empfangen eine bei der großen Taldichte sehr bedeutende Zahl von Seitengletschern, die jeder für sich wieder einen echten Talgletscher vorstellen, manche münden gleichsohlig, manche mit einer Stufe, bisweilen auch endigt das Eis des Nebengletschers kurz vor der Vereinigung mit dem Hauptgletscher.

Dies Gebiet stärkster Vergletscherung ist über dreieinhalb Längsgrade und über zwei Breitengrade ausgedehnt; es erstreckt sich etwa 380 km lang und 50 km breit vom Hunzafluß im Nordwesten bis zur Querstrecke des oberen Schayok im Südosten. Hier beginnt mit dem kontinentalen Witterungsregime die trockene, gletscherarme Region Tibets, während im Nordwesten die geringere Höhe und die Quergliederung des Hindukuskamms das Gletscherphänomen schnell verarmen läßt. Es versteht sich, daß über diese große Fläche hin Wärmegang, Niederschlagsverhältnisse und dadurch auch die Höhe der Schneegrenze große Verschiedenheit zeigen. Über Wärme- und Niederschlagsverhältnisse der Hochregion sind wir aber nicht orientiert, da nur während vier Monaten diese Gegenden zugänglich sind. Auch die Schätzungen über die Höhenlage der Firngrenze oder klimatischen Schneegrenze sind ungenau, da außer den Fixpunkten der trigonometrischen Aufnahme, und das sind nur Gipfel, aber keine Tal- oder Gehängestationen, keine verlässlichen oder wenigstens gesicherten Höhenzahlen bekannt sind. So ist für die Schneegrenze in der Literatur bisher immer noch der seinerzeit von den Schlagintweits geschätzte Betrag maßgebend gewesen. Und zwar wird hier für die „Karakoram-Kette in Tibet und Turkistan“ 19 000' = 5820 m angegeben, ausdrücklich für das Gebirge von 28 bis 36° nördlicher Breite²⁾. Allerdings wird in einer Anmerkung

¹⁾ W. M. Conway, *Climbing and Exploration in the Karakoram Himalayas*. London 1894, 382 ff. F. B. and W. H. Workman, *In the ice world of Himalaya*. London 1901, 119 ff. und Karte.

²⁾ H. von Schlagintweit-Sakūnlūnski, *Reisen in Indien und Hochasien*, IV (Jena 1880), S. 522. Diesen Wert hat Machatschek (*Gletscherkunde*, Samml. Göschen) übernommen. Heim (*Gletscherkunde*, S. 426) gibt 5600–5900, außer dem

angeführt, daß in Baltistan, also dem westlichsten Abschnitt des in Rede stehenden Gebietes, die Schneegrenze rasch sinke, was wohl bedeuten soll: unter den als Mittel angegebenen Wert. Für den Mustagh, also den westlichsten Teil des Hochgebirges, dürfen wir also wohl eine tiefere Lage der Schneegrenze erwarten, zumal für das eigentliche Kaschmir eine solche in 5000¹⁾ und für den Hindukusch eine solche in 4500 m²⁾ angegeben wird.

Die Festsetzung der Schneegrenze, zumal in so wenig bekanntem Gebiet, begegnet großen Schwierigkeiten. Nord- und Südexposition sind zu berücksichtigen; ferner das allgemeine Ansteigen der Schneelinie von dem feuchten Südabhang des Gebirges zu der trockenen Nordabdachung. Diese Verhältnisse ließen sich bereits bei der Behandlung der Vergletscherung von Kumaon zu dem für das Gebirgs ganze gültigen Gesetze zusammenfassen: daß die Schneelinie von Süden nach Norden von Kette zu Kette ansteigt, daß aber innerhalb ein und derselben Kette sie bei Südexposition höher liegt, als bei nördlicher. Ferner ist bei diesen notgedrungenenweise auf kurzen Expeditionsvorstößen gewonnenen Daten zu berücksichtigen, wie auch in der Workmanschen Diskussion der Schneegrenze³⁾ mit Recht hervorgehoben wird, daß je nach dem Niederschlagsreichtum des Jahres, je nach der Jahreszeit und je nach der Schneemenge des Vorjahres die Höhenzahl schwankt. Am leichtesten sollte die Schneegrenze hier mit Hilfe der Bestimmung der Firnlinie festzulegen sein, also in der Gestalt der auf den Gletschern zu beobachtenden Grenzlinie zwischen Nähr- und Zehrgebiet. Die großen Talgletscher, die sich etwa in Ostwestrichtung erstrecken, bieten sich von selbst zu diesem Zweck dar. Für die westliche Region haben Dr. Workman und der Verfasser dieses die Schneegrenze zu nicht höher denn 5000 m angesetzt⁴⁾. Das gilt für die Gletscherregion des Tschocho Luma. Die jüngsten Untersuchungen des nördlich des Tschocho gelegenen Hispar⁵⁾ und am Baltorogletscher⁶⁾ haben keine neuen Daten

Westen, wo die Schneegrenze noch tiefer herabgeht, Heß (Gletscherkunde, S. 95) 5300—5600.

¹⁾ Siehe oben.

²⁾ Nach Schlagintweit a. a. O.: 13 000' (= 3960 m) bei 35½° nördlicher Breite an den Oxusquellen.

³⁾ F. B. und W. H. Workman, *Ice bound Heights of the Mustag*. London 1908, S. 192 f.

⁴⁾ Dr. W. H. und F. Bullock Workman, *Ice-bound heights*. S. 192 f und 278. Für eine Kuppe am obern Tschocho wurde Aug. 1902 die Schneebedeckung am Südabhang von 5300, am Nordabhang von 4875 m an festgestellt. Im Juli war ein Gipfel in 5364 m noch schneefrei. Dagegen wird für 1903 die Schneelinie zu 16 000' = 4875 m festgesetzt. — Oestreich, *Der Tschochogletscher in Baltistan*. Z. Gl. VI, S. 4.

⁵⁾ C. Calciati and M. Koncsa in F. B. and W. H. Workman, *The call of snowy Hispar*. S. 266.

⁶⁾ F. de Filippi, *Karakoram and Western Himalaya 1909*. London 1912, S. 302.

geliefert. Daß der niedrige Wert für die Schneehöhe aber nur für den Westen des Mustagh gilt, geht schon daraus hervor, daß der an der südöstlichen Begrenzung der Gletscherregion gelegene Karakorampaß mit 5650 m unter der Schneegrenze bleibt, die von Schlagintweit für die Nordseite als in 80, für die Südseite als in 330 m höher liegend angenommen wird¹⁾. Für Oberladakh mögen diese Ziffern immerhin ihre Gültigkeit haben, obwohl neuere Mitteilungen nicht vorliegen.

Im allgemeinen nimmt in diesem vom Schayok bis zum Hunzafluß reichenden Hochgebirgsstreifen die Vergletscherung von Südosten nach Nordwesten zu; während im Südosten es sich um vergletscherte Bergkämme mit weniger entwickelten Talgletschern handelt, wächst nach Nordwesten zu mit der Längsentwicklung zugleich die Gletscherdichte, bis in der Gegend der Schigar-Oberläufe die nordwest- und die südostgerichteten Gletscher sich häufen. Allerdings ist gerade in jüngster Zeit auch im südöstlichen Teile des Mustagh ein Riesengletscher festgestellt worden, der an Länge sogar die anderen allesamt übertrifft, der Siachen- oder Saitschargletscher im Oberlauf des Nubraflusses. Die großen Talgletscher nehmen die obersten Partien der großen Flußtäler ein. Sie sind die Überreste der großen Gletscher der Eiszeit. Der größte von allen, der eben genannte Siachen- oder Saitschargletscher, war in seinem Unterlaufe bekannt als Ursprungsgletscher des Nubraflusses, und seine große Länge wurde erst, und zwar durch die Orientierung der Sachverständigen „fern vom Schuß“ festgestellt, als T. G. Longstaff²⁾ im Juni 1909 vom Saltoro-Eispaß am oberen Ende des Bilafondgletschers³⁾ den Oberlauf eines mehrere Kilometer breiten Riesengletschers betrat, der von WNW aus der Gegend des durch Conway bekannt gewordenen Hidden Peak am südöstlichen Ende des Baltorogletschers herkam, und sich bis zu seinem oberen Ende überschauen ließ⁴⁾.

Da das besondere Interesse sich allzeit der Frage nach der Länge der großen Talgletscher zugewendet hat, sei hier eine Liste derselben mit Angabe ihrer Längen nach verschiedenen Schätzungen gegeben.

¹⁾ Schlagintweit a. a. O. IV, 47. Diese Daten, 5600 und 5900 m, sind seitdem in die Literatur übergegangen (Schlagintweit hat die Paßhöhe etwas niedriger angesetzt) und auf die ganze „Karakoram-Kette“ übertragen worden, ein Schulbeispiel für die schädlichen Folgen einer unzweckmäßigen Namengebung.

²⁾ T. G. Longstaff, Glacier exploration in the eastern Karakoram. Geogr. Journ. XXXV (1910), 622—646—658.

³⁾ Im Ursprung des Saltoro-Flusses, eines rechten Nebenflusses des Schayok.

⁴⁾ Er ist seitdem durch zwei Expeditionen des Ehepaars Workman erforscht worden, und eine Karte, von C. Calciati, wird demnächst erscheinen.

Siachen	72 km [45 miles].	(de Filippi, S. 195, nach Longstaff) ¹⁾ .
Biafo	59 „ [37 „].	(Workman, Hispar ²⁾ , S. 214. Burrard-Hayden nehmen 62,5 km [39] an.)
Hispar	58,6 „ [36,6 „].	(Workman a. a. O., S. 214. Conways Karte: 60 km. Burrard - Hayden 40 km [25].)
Baltoro	58 „ [36 „].	(de Filippi, 195 und 255 ³⁾ .)
Tschocho [Chogo] 48 „ [30 „].		(Workman, Mustagh, S. 4. Oestreichs Karte: 46, Text: etwa 50. Burrard-Hayden: 38 [24].)
Gascherbrum	34 „ [21 „].	(? = Kondusgletscher ⁴⁾ ; siehe de Filippi, 314 f. und 441 f. Länge nach Burrard-Hayden.)

In diesen tief eingeschnittenen Tälern werden die Firnmassen der Hochgipfel und Hochkämme in das Schmelzgebiet überführt. Die Gletscherenden liegen in einer Höhenzone zwischen 2900 und 3550 m. Die neuesten Zahlen sind:

3530 m [= 11 600']	für den Siachen	(de Filippi, 177, nach Longstaff).
3350 m [= 11 000']	„ „	Baltoro (de Filippi, 177).
3292 m [= 10 803']	„ „	Hispar (Karte zu Workman, Hispar, Theodolitstation am Gletscherende ⁵⁾).
3100 m [= 10 180']	„ „	Biafo (de Filippi, S. 177).
2900 m [= 9500']	„ „	Tschocho (Workman, Mustagh, S. 171).

Nachdem bisher von der touristischen Erkundung der Gletscherregion die Rede war, die uns für Vergleichszwecke bereits recht wertvolle Karten der verschiedenen Hauptgletscher geliefert hat⁶⁾, sei noch in Kürze

¹⁾ Burrard-Hayden gaben ihm noch 1907/1908 nur 34 km [21 miles].

²⁾ W. H. and F. B. Workman, *The call of the snowy Hispar*. London 1910.

³⁾ Nach de Filippi, S. 255, ist auf der Karte des Baltoro in Dr. J. Jacot Guillarmod, *Six mois dans l'Himalaya* (Neuchâtel o. J.) die Länge des oberen Beckens des Godwin Austen Gletschers (des rechten Quellarms des Baltoro) um mehr als 8 km zu lang gezeichnet. Hiernach ist der hohe Wert für die Länge des Baltoro, als des vermeintlich längsten Gletschers des Mustagh, bei Oestreich, *Der Tschochogletscher*, Z. Gl. VI, S. 1, zu vermindern. Conway's Karte hatte ihm eine Länge von mindestens 62,4 km [39 miles] gegeben, wozu noch die von J. Jacot Guillarmod, wie sich jetzt herausstellt, übermäßig groß dargestellte Länge des oberen Godwin Austen Gletschers gerechnet wurde.

⁴⁾ Kondus ist ein rechter Nebenfluß des Saltoro (s. o.). Sein Gletschergebiet reicht nach Norden bis zur Gruppe der Gascherbrumgipfel.

⁵⁾ Im Text S. 213, 11 000'.

⁶⁾ Karte des Hispar von W. M. Conway (nebst Darstellung der Gletscherregion westl. desselben) 1892 (1 : 126 720) und von Calciati - Koncza 1908 (1 : 100 000).

auf die exaktere Detailarbeit verwiesen, die in den letzten Jahren auch im Himalaya eingesetzt hat. Es war die Frage nach dem Vor- oder Rückgang der Gletscherenden, die Frage nach den Symptomen, die sich am Gletscher zur Beurteilung der großen klimatischen Perioden feststellen lassen. Wie jüngst wieder durch Ch. Rabot¹⁾ an der Hand eines Vergleiches alles vorhandenen Materials betont wurde, haben die Gletscher aller Gegenden der Erde eine Periode des Vorstoßes und der maximalen Ausdehnung in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gehabt. Auch der Himalaya steht im Verdacht einer größeren Ausdehnung des Gletscherphänomens in junger Zeit. Aber gute Nachrichten liegen nicht vor²⁾. Die entschiedene Schrumpfung der Dimensionen des Eiskörpers der Tschocho-Zunge bringt W. H. Workman³⁾ mit einer größeren Ausdehnung dieses Gletschers um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Zusammenhang, die sich daraus ergebe, daß nach Godwin Austen der Tschocho die Terrasse von Arrindo berührt haben soll, von der er 1902 200 m entfernt blieb. Doch lassen sich alle aus früherer Zeit vorliegenden Nachrichten mit dem heutigen Kartenbilde vollständig vereinigen⁴⁾. Auch der Baltoro gilt seit 1861, also seit der Aufnahme des Gletscherendes durch Godwin Austen, als im ganzen stationär⁵⁾. Jedenfalls zeigen, soweit wir es bis jetzt beurteilen können, die Riesengletscher des Mustagh keine ihrer Länge entsprechenden Vor- oder Rückbewegungen. Um in diesen Fragen Entscheidung zu bringen, ist damit begonnen worden, die Enden mehrerer Gletscher in den verschiedensten Teilen des Gebirges nach ihrer Gestalt und nach den Verhältnissen ihrer nächsten Umgebung kartographisch festzulegen, und die Markierung

Karte des Biafo von Conway (wie oben) und Kartenskizze von Workman 1899 (1 : 200 000).

Karte des Tschocho von Oestreich 1902 (1 : 200 000) und Karte des Tschocho sowie der Gletscher zwischen Tschocho und Hispar-Biafo nach Aufnahme von Hewett und Workman 1903 (1 : 150 000).

Karte des Baltoro von Conway (wie oben), von J. Jacot Guillarmod 1902 (1 : 200 000), wozu Kritik von de Filippi, S. 255, sowie Karte des oberen Baltoro nach photogrammetrischer Aufnahme 1909 (1 : 100 000) auf der Expedition des Herzogs der Abruzzen.

Karten des Kondus und Siachen sind von den Topographen der Workmanschen Expeditionen bereits ausgearbeitet, aber noch nicht veröffentlicht worden.

¹⁾ Ch. Rabot, *Revue de glaciologie* No. 3. (Mittlg. Naturf. Ges. Freiburg-Schweiz, V.) 142–145 u. 332.

²⁾ Höchstens Erzählungen und unkontrollierbare Erinnerungen, wie z. B. betreffs des Milamgletschers (s. *Rec. Geol. Surv. Ind.* XXXV, 153).

³⁾ From Srinagar to the sources of the Chogo Loogma Glacier. *Geogr. Journ.* XXV, 251.

⁴⁾ Vgl. dazu Oestreich, *Z. Gl.* VI, 28 f.

⁵⁾ F. de Filippi a. a. O., S. 174.

auffälliger Punkte wird den künftigen Beobachtern die Feststellung künftiger Bewegungen des Gletscherendes erleichtern. So wurde vom Verfasser 1902 das Gletscherende des Tschokocho durch Nivellement festgelegt¹⁾ und werden seit 1906, auf eine Anregung von Douglas W. Freshfield hin, in den verschiedensten Gegenden des Himalaya einzelne Gletscherenden von Beamten des Geological Survey of India vermessen, markiert und photographiert²⁾. Auch der Hispar gehört zu diesen mit ihrem heutigen Ende festgelegten Gletschern. In der Tat sind die Gletschermarken an seinem Ende bereits einmal revidiert worden, wenn auch nur zwei Jahre später. Es zeigte sich ein Rückgang um 10 m, der aber als unbedeutende jahreszeitliche Schwankung aufgefaßt wird³⁾. Die übrigen in ihren Enden vermessenen Gletscher sind meist kürzere und weniger bekannte Eisströme, von denen zwei ebenso wie der Hispar zum Hunzagebiet gehörige quergerichtete Gletscher, der gleich unterhalb des Hispargletscherendes von Süden her einmündende Yengutsa (Conway's Rung Pa) und der 50 km weiter unterhalb von Norden her einmündende Hassanabadgletscher Erwähnung verdienen, ersterer weil er seit Conways Besuch in 1892 um 2,6 km vorgerückt ist, während der letztere gar 10 km an Länge zugenommen haben soll. Und zwar hat nach Haydens⁴⁾ Erkundigungen beider Vorücken plötzlich stattgefunden, oder verhältnismäßig plötzlich: das Vorücken des Hassanabadgletschers geschah um 1904 oder 1905 im Laufe von 2½ Monaten. Das scheinen für uns noch unerklärbare, man kann meinen: katastrophale Ereignisse gewesen zu sein, die nichts mit den großen Perioden der Gletscherbewegungen infolge der Schwankungen der Niederschläge oder der Wärme zu tun haben, wie Hayden mit Recht bemerkt. Auch sind beide Gletscher seitdem wieder stationär geblieben⁵⁾.

¹⁾ Das Gletscherende des Tschokocho Luma Gletschers in Baltistan. 1 : 10 000, Z. Gl. VI, Taf. 2,

²⁾ Preliminary survey of certain glaciers in the North-West Himalaya. By officers of the Geological Survey of India. T. H. Holland, Introduction, Rec. Geol. Surv. Ind. XXXV, 123—126. Notes of certain glaciers in North-West Kashmir. Ebenda 127—137 (H. H. Hayden). Notes on certain glaciers in Lahaul (H. Walker and E. H. Pascoe) 139—147. Notes on certain glaciers in Kumaon (G. de P. Cotter and J. Coggin Brown) 148—157. Die Fortsetzung dieser Studien konnte vom Verfasser noch nicht eingesehen werden.

³⁾ Calciati und Koncza in Workman, The Call of snowy Hispar, S. 252.

⁴⁾ Rec. Geol. Surv. Ind. XXXV, 134 ff.

⁵⁾ Workman, Call of snowy Hispar, S. 25 f. (Hassanabad Gl.). Calciati-Koncza, ebenda 250 ff, betrachten die 30 m Schwund der Gletscherfront des Yengutsa als jahreszeitliche, nicht als säkulare Erscheinung.

Zur deutschen Landeskunde.

VII. Eifelstudien.

Der unter dem Namen „Eifel“ verstandene Teil der deutschen Westmark, der östlich vom Mittelrhein, südlich von der Mosel, westlich von der Landesgrenze und im Norden vom Niederrheinischen Tieflande begrenzt wird, ist wohl nicht mehr die terra incognita, wie vor einem Menschenalter, immerhin aber noch nicht so bekannt, wie es sein erdgeschichtlich so verschiedenartiger Aufbau und seine landschaftlich so mannigfaltige Ausgestaltung verdiente.

Das damals noch von Fremden gemiedene und als rau, unzugänglich und kulturell rückständig geltende Land mit seiner verarmten Bevölkerung erfreut sich heute¹⁾ rasch wachsender Wertschätzung. Entsprechend nahm der Wohlstand seiner Bewohner zu.

Nicht gleichen Schritt mit der Verkehrserschließung und -eroberung der Eifel hat deren wissenschaftliche Durchforschung gehalten.

Zwar gilt sie seit Leopold von Buchs Tagen als das klassische Land deutscher Geologie, deren Jünger sie jährlich zu Hunderten besuchen, doch sind wir auch heute noch weit davon entfernt, sie in allen Einzelheiten ihres so wechselreichen Aufbaues zu kennen²⁾.

Noch weniger durchforscht sind die Gebiete geographischen Wissens. Sowohl morphologische, als besonders auch wirtschafts-, siedlungs- und verkehrskundliche Probleme harren der Lösung. Daher ist jede Beisteuer zur Natur- und Landeskunde der Eifel aufrichtig zu begrüßen.

¹⁾ Hauptsächlich dank den langjährigen Bemühungen des rührigen „Eifel-Vereins“, der durch Wort und Tat (so bes. durch Erschließung und Anlage von neuen Verkehrswegen) im besten Sinne der Pionier des Landes geworden ist.

²⁾ Auch die staatlichen geologischen Aufnahmearbeiten erstreckten sich bisher erst auf einen relativ kleinen Teil der Eifel, in der Hauptsache auf deren nördliches und südliches Grenzgebiet. Außerhalb des derzeitigen Kartierungsgebietes liegt bedauerlicherweise auch fast die ganze Vulkaneifel.

Erschienen sind bislang nur die Lieferungen Nr. 50 (Blätter Trier, Pfalzel, Welschbillig, Schweide, Bitburg, Landscheid), Nr. 51 (Blätter Wallendorf, Bollendorf, Mettendorf, Gemünd, Oberweiß) und Nr. 78 (Blätter Dasburg, Neuerburg, Waxweiler, Kilburg), sowie Nr. 141 (Blätter Aachen, Herzogenrath, Eschweiler, Stolberg, Düren, Lendersdorf) und Nr. 144 (darunter die Blätter Vettweiß, Euskirchen und Rheinbach). Fertig aufgenommen ist Blatt Zulpich (66,20). In Kartierung befinden sich zurzeit die Blätter Nideggen (66,19), Eupen (66,23), Rötgen (66,24), Mechernich (66,26), Ahrweiler (66,29) und Linz (66,30) sowie Ternell (65,29) und Montjoie (65,30). Nach dem Tempo der seitherigen Eifelkartierung dürfte deren Abschluß (es sind noch etwa 40 Meßtischblätter aufzunehmen) nicht vor 15—20 Jahren zu erwarten sein. —

Besonders wichtige und interessante Beiträge dieser Art neben solchen rein geschichtlichen Inhalts liefert ein unlängst erschienenenes Sammelwerk, das der bereits erwähnte tat- und werbekräftige „Eifel-Verein“ zur 25 jährigen Jubelfeier im Jahre 1913 als „Eifel-Festschrift“ herausgab¹⁾.

Auf streng wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, bedeutet es in seiner Art eine Tat, die sich einen festen Platz auch in der geographischen Literatur sichern dürfte.

Aus dem inhaltsreichen Werke, das weiteren Kreisen (vgl. unten Anm. ¹⁾) kaum noch zugänglich sein wird, seien die landeskundlich am meisten interessierenden Eifelstudien herausgegriffen. Im Anschluß an sie möchte ich auch auf einige andere neue Eifelarbeiten hinweisen.

In einem größeren Aufsätze wird zunächst durch W. Tuckermann²⁾ das groß angelegte Kartenwerk der unter Napoleon I. ausgeführten Landesaufnahme der Eifel genauer besprochen und gebührend gewürdigt. Es bringt in seinen sorgfältigen Aufnahmen eine für die späteren topographischen Werke geradezu vorbildliche Einzeldarstellung der Anbau- und Verkehrsverhältnisse zu Anfang des 19. Jahrhunderts und ermöglicht so, die seitherigen Veränderungen in der Bodenbebauung, der Erwerbstätigkeit und den Hauptindustriezweigen sicher zu verfolgen und genau festzustellen.

Die Eifel³⁾, schon zu und vor der Römerzeit altes, z. T. sogar dichter als heute bevölkertes Kulturland, hat im Mittelalter vorwiegend Laubwald getragen. Später wurde sie, z. T. unter dem Zwange harter Kriegskontributionen, durch Raubbau stark entwaldet und damit entwertet. Sie verarmte und verödete. — Erst unter der französischen Herrschaft wurden wieder größere systematische Aufforstungen durchgeführt; besonders wurde

¹⁾ Im Auftrage des Vorstandes des Eifelvereines redigiert durch den Bonner Historiker Alfred Herrmann und erschienen im Selbstverlage des Vereins bei Karl Georgi, Bonn (Rh.). Das in 12000 Exemplaren herausgegebene Werk (im folgenden bei Bezugnahmen abgekürzt mit E. F. S. bezeichnet) umfaßt 423 Quartseiten mit zahlreichen Abbildungen und Karten. Es ist zurzeit völlig vergriffen und soll dauerlicherweise nach letzter Entschließung der Vereinsleitung nicht neu aufgelegt werden.

²⁾ Walter Tuckermann: Die Wandlungen im Landschaftsbilde der Eifel seit der unter dem Obersten Tranchot ausgeführten französischen Landesaufnahme (1801—1814). E. F. S., S. 76—91.

³⁾ Über unser derzeitiges Wissen von der Herkunft und Ableitung des Wortes „Eifel“ berichtet in einem kurzen Aufsätze der Festschrift (S. 52—58) der Germanist Joh. Franck. Als bisher sicher festgestellt erachtet er nur, daß der Wortbegriff vom Stamme „Aifl“ (= römischen, keltischen oder ligurischen(?) Ursprunges) abzuleiten ist. Urkundlich läßt sich „Eifel“ nur bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen. — Material zur gleichen Frage sammelt auch der bekannte Eifelforscher Franz Kramer.

Nadel- (Fichten-) wald angepflanzt. Zusammenhängende Waldungen reichten damals vom Nordende der Eifel bis in die Breite von Jülich-Bergheim¹⁾.

Der seit der Römerzeit in der Nordeifel gepflegte Weinbau wurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts beispielsweise noch im Rur(= Roer) tale bei Heimbach, bei Winden und bei Drove, in der Rurnähe bei Ginnick, Stockheim usw. betrieben. Heute wächst die Rebe in jenen Gegenden nur noch auf engbeschränktem Bezirke bei Winden. — In den Siedlungsverhältnissen ist neben überwiegendem Stillstande stellenweise sogar ein merklicher Rückgang festzustellen: besonders gegenüber einem gewissen Siedlungsmaximum im 12. und 13. Jahrhundert. So zählt die alte Industriestadt Montjoie 1790 etwa 40 000 Einwohner, heute kaum noch die Hälfte. Eine Bevölkerungszunahme im letztvergangenen Jahrhundert weisen im ganzen nur die neuerstandenen Industrieorte am Eifelnordrande (Stolberg, Eschweiler, Düren) und kleinere Gebiete um Bitburg, sowie um Neuerburg-Dalleiden auf. — Die relativ zahlreichen großen Straßen, die sich seit der Kelten- und Römerzeit streng an die Höhen hielten, wurden erst durch Napoleon auch die Täler entlang geführt. Seitdem hat das Wegenetz wesentliche Änderungen nicht mehr erfahren. — Der Bergbau (bes. auf Blei und Eisen), die damalige Hauptindustrie, ist inzwischen abgewandert, da sich Erzgewinnung und -verarbeitung nicht mehr lohnten. Papier- und Lederindustrie traten an seine Stelle. Letztere blüht noch heute bei Prüm, Malmedy und im Moseltale. Sie hatte zur Folge, daß die treffliche Lohe liefernden Eichenschälwälder aufkamen, die freilich landschaftlich verunstaltend wirken. Gegenwärtig weichen sie mit dem Rückgange der Loheverwertung zum Glück wieder den Fichten- und Mischwäldern. Die Lage der Steinbrüche (Stolberg, Leversbach, Mayen, Nieder-Mendig usw.) auf der französischen Musterkarte Tranchots weist gegenüber heute keine wesentlichen Veränderungen auf.

Zwei weitere Arbeiten der Eifel-Festschrift bringen in Form von Zusammenfassungen und Neubeobachtungen schätzenswerte Beiträge zur allgemeinen und speziellen Geologie. Einmal finden die heutigen Oberflächenformen nach Art und Entstehung ihre Erklärung aus dem geologischen Aufbau des Landes. Zum anderen werden die bekannten und interessanten Äußerungen und Erscheinungen des Vulkanismus in der Vulkaneifel — z. T. unter neuen Gesichtspunkten — behandelt und auch weiteren, geologisch nicht geschulten Kreisen verständlich gemacht.

An der Hand von zahlreichen, größtenteils recht instruktiven Ab-

¹⁾ Reste dieser Waldungen bilden noch heute der Kgl. Hambacher Forst und dessen östliche Ausläufer (Elsdorfer-Bürge und Buirer Wald). D. Verf.

bildungen gibt zunächst K. Stamm¹⁾ einen klaren Überblick über den rein stratigraphischen Aufbau der verschiedenen Eifelgebiete und über die Wandlungen im Landschaftsbilde im Laufe der erdgeschichtlichen Perioden: vom Kambrium bis zur Gegenwart. Vor allem werden die Talbildungsvorgänge berücksichtigt, die seit der jüngeren Tertiärzeit, vorzugsweise im Diluvium, an der allmählichen Herausarbeitung der heutigen Oberflächen- und Landschaftsformen gewirkt haben. Die periodischen Hebungen der Eifel (am meisten der Südeifel) haben im Zusammenhang mit etwa gleichzeitigen Absenkungen und Schollenbewegungen im nördlich angrenzenden Niederrhein-Maas-Gebiete die Eifelwasser gezwungen, sich auf bestimmten, meist tektonisch vorgezeichneten Linien in den heute stark eingeebneten Rumpf des alten variscischen Gebirges einzuschneiden. In rhythmisch wechselnden Zeiten einschneidender und aufschüttender Tätigkeit des Fließwassers haben dann die Flüsse und Bäche ihre Täler einerseits ausgeräumt, ausgetieft (z. T. auch übertieft) und ausgeebnet, andererseits mit Schuttmassen („Schottern“) z. T. wieder ausgefüllt. Diese Geröllablagerungen treten jetzt als Geländestufen mit annähernd horizontaler oder doch nur wenig geneigter ebener Oberfläche (= „Aufschüttungsterrassen“) in verschiedenen Höhenlagen über den heutigen Talsohlen auf. Und zwar werden sie innerhalb der einzelnen Flußgebiete in etwa gleichen, d. i. korrespondierenden Höhenlagen beobachtet. Stamm hat an Mosel, Ahr und Prüm Einzelstudien angestellt. Er zählt dort je vier solcher Terrassengruppen, ohne sich über deren Altersstellung und Eingliederung in die Stratigraphie des Niederrheinischen und Eifel-Diluviums bzw. -Jungtertiärs bestimmter festzulegen. Man vermißt einen Hinweis auf die Terrassen im Tale der Rur (Roer), des Hauptflusses der Nordeifel. Dort konnten inzwischen bis zu sieben und acht solcher Terrassengruppen, z. T. in modellartiger Ausbildung nachgewiesen werden²⁾. Stamm erwähnt aus diesem Tale nur kurz und nebenbei die Beobachtung von vier solcher Terrassen innerhalb der Stadt Montjoie³⁾ und parallelisiert sie, ohne nähere Begründung, mit den vier Diluvialterrassen Steinmanns⁴⁾, trotzdem diese

¹⁾ Kurt Stamm: Die Entstehung der Oberflächenformen der Eifel. E. F. S., S. 95—123.

²⁾ Vergl. auch E. Kurtz: a) Geologische Beobachtungen über die Bildung des Rurtales. Gymnasial-Programm 1906. Düren (Hamels Verlag) 1906, b) die diluvialen Flußterrassen am Nordrande von Eifel und Hohem Venn. Verhdlgn d. Naturh. Ver. d. Rhlde., 70. Jahrg., Bonn 1913, S. 55—85, und A. Quaas: Die Rurterrassen auf dem Blatte Nideggen (66,19). Wiss. Aufnahmeber. Jahrb. G. L. A. 1911, Bd. XXXII, II, 3, Berlin 1914 S. 406—414 und für 1912 (im Druck).

³⁾ Kurt Stamm: Glazialspuren im Rheinischen Schiefergebirge. Verhdlgn. d. Naturh. Ver. d. Rhlde. 69. Jahrg. Bonn 1912, S. 186—188.

⁴⁾ G. Steinmann: Über das Diluvium am Rodderberge. Sitzgsber. d. Niederrh. Ges. f. Heil- u. Naturk. Bonn 1906.

Gliederung bereits als für den Niederrhein nicht zutreffend erkannt worden war.¹⁾

Auch an der Urft und an der Olef sind diese Terrassengruppen in übereinstimmenden Höhenlagen z. T. gut entwickelt. Die vier untersten entsprechen hier, wie an der Rur, den vier Diluvialterrassen im Niederrhein—Maas-Gebiete. Die darüberfolgenden 3—4 Stufen, deren oberste nur um wenige Meter in die alte Fastebene der Eifelhochfläche eingesenkt erscheint (so am Gansberge bei Hecherscheidt (Bl. Nideggen), an der Schönen Aussicht gegenüber Einruhr (Bl. Schleiden), bei Gemünd und bei Schleiden), sind zum Jungtertiär zu stellen. Dabei muß zurzeit noch unentschieden bleiben, ob sie nur als pliozän anzusprechen sind oder ob die obersten bis ins Jungmiozän zurückreichen.²⁾ Die gleichen 7—8 Terrassengruppen dürften auch im Ahr- und Moseltale noch nachzuweisen sein, wie sie nach eigenen Beobachtungen im Rheintale zwischen Ahr- und Moseltale vorhanden sind. Voraussichtlich entsprechen Stamms vier Terrassengruppen an Mosel, Ahr und Prüm den vier Diluvialterrassen. — Die durch gute Abbildungen erläuterten, für die Eifel Flüsse so bezeichnenden Mäanderbildungen, alten Flußschlingen und Talböden und die durch sie bedingten Talsporne und Umlaufberge im Mosel- und Ahrgebiete hätten ebenfalls durch zahlreiche gleichartige Bildungen³⁾ im Rurtale (so bei Dedenborn, Schöne Aussicht, Ruhrberg —Woffelsbach und bei Heimbach-Hasenfeld) ergänzt werden können.

In der Gegend von Heimbach treten auch z. T. in Seitentälern der Rur verschiedene Terrassengruppen auf. So besonders im Haimbachtale und in dessen rechten, von Vlatten herabkommenden Seitentale, dem Herresbache.⁴⁾ Im Heimbachtale sind die höchsten Terrassenböden — wie im Rurtale — nur wenig (10—15 m) in die alte präoligozäne (?) Fastebene der Kermeter-Hochfläche eingesenkt. Sie liegen dort in rund 400 m Meereshöhe. Diese morphologisch reifen Täler reichen also gleich dem Rurtale bis weit ins Pliozän (vielleicht sogar ins Jungmiozän?) zurück. — In der Hauptsache sind die Rurnebenbäche jugendlicher Entstehung, typische V-förmige Erosionstäler. Auch modellartig ausgebildete alte Hängetäler⁵⁾ kommen im Rurgebiete vor, so besonders zwischen Nideggen und Heimbach.

¹⁾ Vergl. u. a. G. Fliegel: Rheindiluvium und Inlandeis. Verhdlgn. d. Naturh. Ver. d. Rhld. 66. Jahrgang. Bonn 1909, S. 329, 333 und G. Fliegel und W. Wunstorff: Die Geologie des Niederrheinischen Tieflandes. Abhdlgn. d. G. L. A. Berlin. Neue Folge. Heft 67, 1910, S. 116—117.

²⁾ Vergl. dazu A. Quaas: a. a. O. 1912.

³⁾ Vergl. auch E. Kurtz: a. a. O.

⁴⁾ A. Quaas: a. a. O. 1911.

⁵⁾ A. Quaas: Die Trias auf Blatt Nideggen. Jahrb. G. L. A. Berlin für 1910, Bd. XXXI, II 3, Berlin 1912, S. 453.

Sie enden z. T. bereits auf den mittleren Terrassenböden der Seitentäler. — In den Laufrichtungen der Rur und ihrer Nebenbäche ist dabei eine starke Abhängigkeit von den tektonischen Linien der Nordeifel zu beobachten. Sie folgen größtenteils den Hauptsprungsystemen (SE—NW und SW—NE).

Ähnliche Abhängigkeiten und gleiche Beziehungen zur Tektonik dürften auch für die anderen, größeren und kleineren Flußsysteme der Eifel noch nachgewiesen werden können.

Über die Terrassenverhältnisse an der Mosel — speziell zwischen Trier und Alf — hatte früher bereits B. Dietrich¹⁾ berichtet. Die recht beachtenswerte Arbeit, die auch in dieser Zeitschrift schon kurz besprochen und gewürdigt worden ist²⁾, beschäftigt sich vorzugsweise in morphologischer Beziehung mit den Terrassenfragen. Sie baut dabei ganz auf den modernen physiogeographischen Anschauungen auf, die in Davis ihren Hauptvertreter finden. Doch bringt sie im einzelnen auch davon abweichende eigene Beiträge und wertvolle Ausführungen allgemeiner Natur: so über Mäander- und Terrassenbildungen im Zusammenhang mit Hebungserscheinungen in der Eifel und besonders (in einem Schlußkapitel) über den z. T. problematischen Wert unserer heutigen Darstellung von Gefällskurven und der davon abzuleitenden Terrassenprofile. Auch die Bedeutung der von ihm morphologische — zum Unterschied von den Aufschüttungs(Schotter)terrassen³⁾ — genannten Terrassen hebt er gebührend hervor. Das sind die heute nur noch flächenhaft ausgebildet vorliegenden Geländestufen, von denen die früher auflagernden Flußschotter durch Gekriech- und Abspülvorgänge vollständig weggeführt worden sind.

Der Autor unterscheidet an der Mosel drei vorgeschichtliche durchlaufende Terrassengruppen in den mittleren absoluten Höhen von 270 bis 250, 180—150 und 130—115 m ü. NN. (= 140—160, 50—60 und 10 bis 20 m relative Höhe über dem heutigen Moselbette⁴⁾), ohne sie genauer zu gliedern und mit den am Mittel- und Niederrhein erkannten Terrassengruppen im einzelnen zu parallelisieren. Noch über der oberen durchlaufenden Terrassengruppe erkennt Dietrich weitere Terrassenreste, die in durchschnittlicher Höhe von 310—320 m ü. NN. (= 195—220 m ü. d. Mosel) auftreten und die er als „Anzeichen eines noch älteren diluvialen Mosellaufes“ ansieht⁵⁾. Er kommt zu dieser Anschauung, da er mit

¹⁾ Bruno Dietrich: Morphologie des Moselgebietes zwischen Trier und Alf. Verhdlg. d. Naturh. Ver. d. Rhld. 67. Jahrg. Bonn 1911, S. 83—181.

²⁾ A. Penck: Zur deutschen Landeskunde I. Die Wittlicher Senke und Moselmäander. Diese Zeitschrift 1912, S. 297—299.

³⁾ B. Dietrich: a. a. O. S. 140.

⁴⁾ B. Dietrich: a. a. O., S. 180—181 (Übersichtstabelle).

⁵⁾ Ebenda S. 142.

K. Östreich¹⁾ annimmt, daß im Rheintale eigentliche jungtertiäre Rheinablagerungen fehlen, folglich auch im Moseltale nicht entwickelt sind. Diese Annahme wird durch die neueren Forschungen widerlegt. Es sind mir selbst sicher ältere als diluviale, also noch über der ältesten diluvialen („Älteste Terrasse“) gelegene Terrassengruppen aus dem Rheintale zwischen Ahr und Mosel bekannt²⁾, die mit den an Rur, Urft usw. erkannten jungtertiären Aufschüttungsterrassen korrespondieren, also auch altersgleich sein dürften.

Zu gleichen Ergebnissen werden genauere Untersuchungen auf heutiger stratigraphischer Grundlage auch im Moseltale führen (vergl. auch oben S. 456).

Nicht bekannt oder doch noch nicht benutzbar scheint B. Dietrich die auf sehr sorgfältigen und eingehenden, auch vergleichenden Studien beruhende Moselterrassenarbeit A. Lepplas gewesen zu sein.³⁾ In ihr gibt dieser ausgezeichnete Kenner der Geologie des Moseltales eine genaue Gruppierung der von ihm dort erkannten und kartographisch festgelegten Terrassenstufen. Zugleich erörtert er deren Beziehungen zu den Glazialbildungen der Vogesen. Bezüglich der Einreihung seiner Moselterrassen in das für den Niederrhein erkannte Terrassensystem übt er alle Vorsicht. Immerhin nimmt er an, daß in seiner oberen Terrassengruppe auch ältere als ältestdiluviale Terrassenreste stecken.

In der Arbeit Stamm⁴⁾ werden noch die Vergletscherungserscheinungen breiter erörtert, die er im Hohen Venn, besonders im Baychon- und im Reichensteiner Tale, glaubt festgestellt haben zu können.⁵⁾ Die Ausführungen zu diesen interessanten Erscheinungen und Bildungen sind im ganzen Wiederholungen der schon in seiner Dissertation⁶⁾ eingehender behandelten und ausführlicher mitgeteilten Beobachtungen. Sie werden nur in der Eifel-Festschrift an Hand der gleichen Abbildungen in bestimmtere Form

¹⁾ K. Östreich: Geologische und morphologische Terrassenstudien. Monatsber. d. D. Geol. Ges. Bd. 64, 1909, S. 160.

²⁾ Z. T. nach gemeinsamen Studien mit Herrn P. G. Krause; vergl. dazu auch P. G. Krause: Einige Beobachtungen im Tertiär und Diluvium des westlichen Nieder-rheingebietes. Jahrb. G. L. A. Berlin, für 1911, Bd. XXXII, Berlin 1912, S. 138—139.

³⁾ A. Leppla: Das Diluvium der Mosel. Ein Gliederungsversuch. Jahrb. G. L. A. Berlin für 1910. XXXI. Bd. II, Teil, S. 343—376.

⁴⁾ K. Stamm: E. F. S., S. 115—123.

⁵⁾ Den Gedanken einer Vergletscherung der Ardennen, den A. Wichmann (Over Ardennengesteenten in het Nederlandsche Diluvium benoorden den Rijn. Acad. v. Wetenschappen. Verslag v. d. Vergader. d. Wis- en Naturk. Deel XIV, Amsterdam 1906, S. 445) auf Grund ganz unzulänglichen Materials (verschleppte Quarzitblöcke im niederländischen Diluvium) neuerdings aussprach, lehnt er mit vollem Recht ab.

⁶⁾ K. Stamm: Glazialspuren im Rheinischen Schiefergebirge. Verhdlgn. d. Naturh. Ver. d. Rhld. 69. Jahrg. Bonn 1912, S. 151—213.

gekleidet, da aber ohne Beibringung neuen Beweismateriales, nicht beweiskräftiger. Im ganzen stellen sie also bloß einen Auszug aus der erwähnten Originalarbeit dar, auf die deshalb hier zurückgegriffen wird. — Der Autor erblickt in den allerdings recht groben und wirren Block- und Geröllanhäufungen, die am deutlichsten im Reichensteiner Tale (einem kleinen Nebenbache der Rur, der in diese beim früheren Kloster, jetzigen Mustergute Reichenstein, zwischen Montjoie und Kalterherberge gelegen, mündet), auftreten, fluvioglaziale Bildungen. Er vergleicht sie mit den anderwärts bekannten, neuerdings schärfer beobachteten und besonders von den Amerikanern genauer untersuchten „stromartigen Schuttanhäufungen, die in breiten Tälern, flachen Mulden oder auf nur wenig geneigtem Gelände“ aufzutreten pflegen¹⁾ und nach Howe²⁾ (1909) als „Steinströme“ (rock streams) bezeichnet werden. Stamm denkt sich diese Fluvioglazialbildungen durch die Schmelzwasser eines kleinen, lokalen „Hohen Venn-Gletschers“ entstanden. Mitbestimmt wird er zu seinen Anschauungen hauptsächlich durch die grobe Blockpackung, der er trotz nicht beobachteter Kritzen und Schrammen (bzw. Gletscherschliffen)³⁾ auf den Gesteinen ganz Grundmoränennatur zuschreibt. Ferner erscheint ihm die für solche Steinströme bezeichnende höchste Aufwölbung der Schuttmassen in der Strommitte und ein ziemlich steiles Abfallen sowohl nach den begrenzenden Talsteilrändern, als auch nach vorn, dem Stromende, vorhanden. Es liegt also nach ihm eine zungenartig den breiten Talboden ausfüllende Gesteinsablagerung vor, wie sie nur ein Gletscher erzeugen könne. — Wer, etwa vom Leyhof ab, die dort zusammenfließenden „Steinstromarme“ aufwärts verfolgt oder nur von der Straße Reichenstein—Mützenich her vom gleichen Standpunkte wie Stamm⁴⁾ beide Talarme unbefangen überschaut, wird schwerlich die Auffassung des Autors als zwingend finden. Es liegt über dem heutigen schmalen Bachbette eine ausgesprochene breitflächige Terrassenstufe vor, deren Oberfläche annähernd eben, jedenfalls nicht auffallend schildförmig gewölbt ist. Sie trägt also ganz den Charakter normaler Aufschüttungsterrassen durch fließendes Wasser, wie sie auch an anderen Eifel- bzw. Vennbächen mit kurzem Laufe und entsprechend steilem Gefälle

¹⁾ Vergl. dazu Näheres und Literatur bei K. Stamm: Glazialspuren. S. 155—160.

²⁾ E. Howe: Landslides in the San Juan Mountains, Colorado, including a consideration of their causes and their classification. U. S. G. S. Professional Paper 67, Washington 1909.

³⁾ K. Stamm (Glazialspuren usw. S. 154) mißt diesen Glazialerscheinungen z.T. nur untergeordnete Beweiskraft für sichere Vergletscherung bei. Vergl. dazu auch G. Steinmann: Die Eiszeit und der vorgeschichtliche Mensch. Aus Natur und Geisteswelt. 302. Bändchen. Leipzig 1910, S. 39.

⁴⁾ K. Stamm: a. a. O. Tafel I, Abbildung 3, vergl. auch E. F. S., S. 118, Abbildung Nr. 16.

auftreten. Letztere beide Momente erklären auch noch hinreichend die wirre und lose Anhäufung groben, kaum abgerollten Blockmaterials aus vorwiegend sehr harten Quarziten der nahen Vennhochfläche. Ganz ähnlich grobes, ungeschichtetes Gesteinsmaterial liegt übrigens auch im heutigen Bachbette. Es zwingt die Bachwasser, sich in zahllosen kleinen Windungen ihren Weg zwischen dem Blockmeer hindurch zu suchen. Gelegentlich bilden sich auch kleine Wasserfälle, die größere Blöcke unterspülen, in geneigte Lage bringen, zur Zeit der Schneeschmelze auch talwärts bewegen können, wo sich auf flachem Talboden später wieder von feinerem Grus z. T. umgeben und in Sand und tonig verwittertes Schiefermaterial eingebettet werden können. — Ähnlich eingebettete, eckige bis kantengerundete Quarzitblöcke lassen sich zahlreich im „Steinstrome“ finden. „Einseitig völlig geglättete“ Gesteinsblöcke, die Stamm¹⁾ dort beobachtete, vermochte ich nicht wiederzufinden. Sie als Ablagerungen einer Grundmoräne anzusprechen, wie der Autor²⁾ will, liegt kaum Anlaß vor, da wir in der Glazialgeologie mit diesem Namen ganz bestimmte, anders geartete Bildungen zu bezeichnen pflegen.

Auch im Tale des Baychonbaches, eines nördlichen Zuflusses der Warche, stellt Stamm³⁾ einen ähnlich ausgebildeten Steinstrom fest. Daneben beobachtete er dort noch eine „eigenartige lose Anhäufung von eckigen bis abgerollten Blöcken“ vor der Einmündung eines südlichen Seitenbaches („Nebenbach“ vom Autor bezeichnet), der, vom Baychontale durch einen schmalen Höhenrücken getrennt, nahezu 1 km annähernd parallel mit diesem verläuft, ehe er sich mit ihm vereinigt. — Dieses Blockmeer zusammen mit einem Haufwerk grober Quarzitblöcke auf einer deutlich abgesetzten Felsterrasse über dem rechten Ufer dieses Nebenbaches spricht er gleichfalls als glaziale Bildungen an. Für erstere Ablagerung läßt er allerdings die Frage offen, ob sie rein glazialer Entstehung oder ein Gemisch von Gekriech-, fluviatilem- und fluvioglaziale Material sei. — Auch die Bildung eines 3—4 m hohen Wasserfalles, der etwa 100 m oberhalb der Einmündung des genannten Nebenbaches in den Baychonbach auftritt, sowie des kreisrunden Beckens am Fuße dieses Wasserfalles, das er als „Gletschertopf“ ansieht, schreibt Stamm der Tätigkeit von Schmelzwässern zu. Er denkt sich dabei den Gletscher auf genannter Felsterrasse und auf dem auffallenden Felsrücken zwischen dem Baychon- und seinem Nebenbache endend. Erst von diesem Becken ab soll das Baychonbach-Tal reines Erosionstal sein. — Weniger sichere Glazialspuren in Form von Steinströmen

¹⁾ K. Stamm: a. a. O., S. 170.

²⁾ Ebenda.

³⁾ K. Stamm: a. a. O., S. 176—179 (bzw. E. F. S., S. 120—121 und Abb. 18, S. 120).

beobachtete Stamm (nach seiner Auffassung) noch im Venn- oder Tros-Marais-Bache¹⁾ (Blatt Ternell) und im Chansterbache, westlich von Sourbrodt (Blatt Malmedy)²⁾. Immerhin gibt er zu, daß bemerkenswerterweise nicht an allen vom Hohen Venn herabkommenden Wasserläufen der Diluvialzeit ähnliche, auch als glazial anzusehende Ablagerungen und Bildungen nachzuweisen sind. Vor allem scheint er im Quellgebiet der Rur, des größten der dort entspringenden Eifel Flüsse, wie auch am nächstgrößten, der Hill, die hier die Landesgrenze zwischen Deutschland und Belgien bildet, keine Vereisungserscheinungen entdeckt zu haben.

Glazialen Ursprunges ist nach Stamm³⁾ auch der bekannte Quarzitschutt auf der Vennhochfläche, der neben kleineren und großen, z. T. noch heute aus der Oberfläche hervorragenden kambrischen Quarzitblöcken (= Vennquarzite) zahlreiche Feuersteinbruchstücke (aus offenbar aufgearbeiteten Kreidematerial) und meist völlig gerundete Michquarzgerölle enthält. Mit seiner Deutung haben sich in neuerer Zeit u. a. bereits Munck, Renier, Rutot⁴⁾ und vor allem E. Holzapfel⁵⁾ beschäftigt. Letzterer nahm früher eine alluviale Entstehung dieser eigenartigen Ablagerung an, die in ähnlicher Ausbildung auch größere Gebiete des Aachener Waldes bedeckt. In den letzten Jahren neigte dieser vorzügliche Kenner der Eifel immer stärker dazu, jene eigenartigen Schuttbildungen als Absätze des fließenden Wassers aus diluvialer oder tertiärer Zeit aufzufassen⁶⁾.

Manche gemeinsame Begehung des Venns förderte die Übereinstimmung unserer Ansichten in dieser Frage. Nach dem reichlichen Gehalte an Milchquarzgeröllen, die ziemlich allgemein als bezeichnend für tertiäre Flußablagerungen in der Nordeifel gelten, möchte ich den Quarzitschutt des Hohen Venns heute als jungtertiär (pliozän) ansehen. Und zwar betrachte ich ihn als Absatz von Eifelwassern aus der Zeit, zu der die heutigen Flüsse ihren ältesten Talboden auffüllten, also beispielsweise die Rur ihre höchste Terrasse aufschüttete.

Stamm betrachtet den eigentlichen Quarzitschutt als auf tertiären Sanden liegend und glaubt, da ihm die Tätigkeit des Fließwassers zur

¹⁾ Hier scheint auf dem Meßtischblatte Malmedy (65,34) ein Druckversehen vorzuliegen. Es muß wohl nicht Tros-, sondern „Gros-Marais“ (= „dicker Morast“ auf französisch) heißen. D. Verf.

²⁾ K. Stamm: a. a. O., S. 180 usw.

³⁾ Ebenda, S. 182—184.

⁴⁾ Vergl. dazu die Literatur bei K. Stamm, a. a. O., S. 184 u. 211—212.

⁵⁾ E. Holzapfel: Das Diluvium der Aachener Gegend. Jahrb. G. L. A. Berlin für 1903, Bd. XXIV, Berlin 1905, S. 499.

⁶⁾ E. Holzapfel: Die Geologie des Nordabfalles der Eifel usw. Verhdlgn. G. L. A. Berlin. Neue Folge, Heft 66, Berlin 1910, S. 141—142.

Schuttbildung nicht ausreichend erscheint, glaziale Kräfte dafür annehmen zu müssen, um so mehr, als nach ihm die beobachteten Steinströme ganz allmählich in den Quarzschutt der Vennhochfläche übergehen¹⁾.

Auch die starke Vermoorung der Vennhochfläche bringt er²⁾ mit deren diluvialen Vergletscherung in Verbindung. Die untere Grenze der Glazialablagerungen fällt nach ihm mit derjenigen der Moorbildungen zusammen. Als deren Ursache erkennt er die durch die Venngletscher bedingte Störung in der normalen Entwässerung. Unbekannt geblieben ist ihm anscheinend das häufige Vorkommen von Baumresten der Jetztzeit in den tieferen Schichten der Vennmoore. Sie scheinen mir zu beweisen, daß diese Bildungen weit jüngeren Datums und auf andere als glaziale (wohl klimatische) Ursachen zurückzuführen sein werden.

Zeitlich bringt Stamm seine erkannten Gletscherbildungen in Beziehung zur diluvialen Niederterrasse, deren Aufschüttung in der Hauptsache während der letzten, jüngsten Eiszeit (= Würmeiszeit der Alpen) erfolgt ist. Er erkennt nämlich einen direkten Übergang seiner Niederterrasse im Unterlaufe des Reichensteiner Baches in diejenige der Rur. Da der Steinstrom jenes Baches seinerseits in dessen „Niederterrasse“ unmittelbar übergeht, so schließt er, daß auch diese das Alter der Niederterrasse der Rur besitzen muß. Es wird also eine lokale Vergletscherung des Hohen Venns nur zur letzten Eiszeit angenommen. Erst damals habe sich die Eifel soweit gehoben, daß dort, auf ihrer höchsten Erhebung, die Vergletscherung möglich wurde.

Im Widerspruch mit dieser Auffassung steht die oben erwähnte Tatsache, daß Rur wie Hill in ihrem Laufe innerhalb des Hohen Venns keinerlei Glazialanzeichen aufweisen. Auch hat nach eigenen Beobachtungen die Rur auf der Vennhochfläche eine ausgesprochene Niederterrasse ausgebildet.

Überdies sind die Beziehungen von Stamms Niederterrasse im Reichensteiner-Bache zu dessen Steinströme nicht so klar, wie es nach seinen Ausführungen scheinen mag.

Nach allgemeiner Erfahrung haben die kleinen Eifelbäche nur in den selteneren Fällen selbständige Niederterrassen ausgebildet. Meist fließen die heutigen Eifelwässer auf deren Talebenen. Auch der jetzige Talboden des Reichensteiner-Baches ist wahrscheinlich als Niederterrassenebene anzusehen. Der „Steinstrom“, der terrassenförmig gegen ihn absetzt, muß also höheres Alter besitzen, zur Mittelterrassenzeit abgelagert worden sein. Die Vennverglletscherung würde dann entsprechend in die zweit-

¹⁾ K. Stamm: a. a. O., S. 182 usw.

²⁾ Ebenda S. 173—174.

jüngste Eiszeit zu verlegen sein. Da damals die Eifel noch weniger gehoben war als zur Niederterrassenzeit, wird folgerichtig auch ihre Vereisung zu jener Zeit noch unwahrscheinlicher.

Am nächstliegenden will mir erscheinen, den „Steinstrom“ Stamms als eine Mittelterrassenaufschüttung des Reichensteiner-Baches aufzufassen¹⁾.

Den Glazialspezialisten wird vorbehalten bleiben müssen, diese eigenartigen und auffälligen Ablagerungen und Erscheinungen im Hohen Venn auf die Richtigkeit ihrer Deutung genau nachzuprüfen und sie endgültig und sicher zu erklären.

Auf sie zuerst hingewiesen und sie eingehender untersucht zu haben, wird K. Stamms dauerndes Verdienst bleiben. —

In seiner Arbeit über die Vulkanwelt der Eifel gibt N. Tilmann²⁾ zunächst einleitend einen kurzen Überblick über die vulkanischen Vorgänge, Erscheinungen und Bildungen im allgemeinen. Sodann bespricht er an der Hand der alten geologischen Übersichtskarte von Dechens die in SE—NW-Richtung, quer zum Gebirgsstreichen, angeordnete Vulkanreihe der Vordereifel, weiter den „Vulkanweg von Vorder- und Hocheifel“. Es ist das Gebiet der großen Maare („Gemünder-, Weinfelder-, Pulvermaar usw.), des Mosenberges bei Manderscheid mit seinem prächtig ausgebildeten Lavastrome und des besterhaltenen alten Kraters, der Papenkaule bei Gerolstein mit ihrem Aschen- und Schlackenwall. — Es folgt die Besprechung des „Vulkangebietes des Laacher Sees“. Ausgezeichnet durch große Mannigfaltigkeit der vulkanischen Kräfteäußerungen und Formen bildet es mit seinen Kratern und Maaren, seinen Laven und Aschen, Tuffen, Traß- und Bimmssteinbildungen, seinen Mofetten und Säuerlingen eine Vulkanwelt im kleinen, deren Einzeldurchforschung dem Geographen wie dem Geologen noch immer lohnende Aufgaben stellt.

Unter dem weniger sagenden als haltenden Titel „Pflanzenschutz in der Eifel“ liefert der bekannte Eifelbotaniker M. Koernicke³⁾ einen recht wertvollen Beitrag zur Pflanzengeographie des Landes.

Mit warmen Worten tritt er für die Erhaltung der Eigenart der Eifelpflanzenwelt ein. Bestimmt und mit Recht wendet er sich u. a. gegen eine weitere Entwässerung des Landes, besonders des Hohen Venns. Zusammen mit der aus forstwirtschaftlichen Gründen bevorzugten Aufforstung mit Fichten, statt mit der naturgemäßen deutschen Waldform, dem Mischwalde, wirkt sie verheerend und zerstörend auf die bisherige Pflanzenwelt. —

¹⁾ Darüber a. a. Stelle mehr.

²⁾ Norbert Tilmann: Die Vulkane der Eifel und die Notwendigkeit ihres Schutzes. E. F. S., S. 124—152.

³⁾ Max Koernicke: Pflanzenschutz in der Eifel. E. F. S., S. 153—165.

Diese stellt eine Mischung von subalpinen und von atlantischen oder mediterranen Formen dar. Von letzteren, die in den Zwischeneiszeiten z. T. bis zum Baltikum vorgedrungen sind, blieben der dreilappige Ahorn, die Stechpalme und der Efeu in der Eifel zurück. — Subalpin bzw. subarktisch sind u. a. Preißel- und Moosbeere, Rasensimse, nordischer Siebenstern und die Wollgräser, von höheren Pflanzen Kriechweide und Moorbirke, Bärwurz und namentlich die weitverbreitete gelbe Narzisse.

Aus der Eiszeit direkt zurückgebliebene Pflanzenarten, die sich bis heute auf dem Hohen Venn erhalten konnten, sind nur Sumpfhedel- und Krähenbeere. Letztere kommt auch bei Jünkerath vor.

Schutz wünscht der Verfasser namentlich auch den „wissenschaftlich interessantesten und ästhetisch schönen“ Pflanzen, Bäumen und Baumgruppen: so der bekannten Gerolsteiner Linde mit $7\frac{1}{2}$ m Stammdurchmesser, die schon 1338 als Gerichtslinde diente, dem „Blom“, d. h. der „Napoleonstanne“ bei Schleiden (= 1,35 m Durchmesser) und besonders den für die Eifel so charakteristischen Wacholderhainen, die in Nebel und Schnee gar gigantische, gespensterhafte Formen annehmen können und dem scheuen Birk- und anderem Vogelwild willkommene Schlupfwinkel bieten¹⁾. —

Zu recht interessanten und wichtigen tiergeographischen Feststellungen und Ergebnissen für die heutige, wie für die subfossile Tierwelt der Eifel gelangen O. Le Roi und A. Reichensperger²⁾, — z. T. an der Hand einer besonderen Verbreitungskarte südlicher Tiere. —

Gleich der Flora setzt sich naturgemäß auch die Fauna der Eifel aus nördlichen und aus südlichen Tierelementen zusammen.

Unter Wirkung und Rückwirkung der eiszeitlichen, der zwischen- und der nacheiszeitlichen Wärmeverhältnisse und Lebensbedingungen hat sich allmählich eine ganz eigenartige „Mischfauna“ herausgebildet, der sich gleichfalls einige rein eiszeitliche Formen („Glazialrelikte“) zugesellen: so die kalkarme Bäche bevorzugende Forelle, die Quell- und Schlamm-schnecke, die dickschalige Perlmuschel (z. B. im Perlenbach bei Montjoie, in der Amel bei Ligneuville) und die Tellermuschel, ferner kleine Wasserkäfer und Krebsarten und besonders der bezeichnendste Vertreter

¹⁾ Speziell der ganz eigenartigen Kalkflora der Eifel (E. F. S., S. 166—176) sowie der nicht minder interessanten Pflanzenwelt der Schneefel (E. F. S., S. 177—185) widmet Franz Roth, Koernickes bekannter Mitarbeiter an der schönen Eifelflora (aus Karsten u. Schenck: „Vegetationsbilder“, 5. Reihe, Heft I/II, Jena 1907), zwei besondere Arbeiten.

²⁾ Otto Le Roi und August Reichensperger: „Die Tierwelt der Eifel in ihren Beziehungen zur Vergangenheit und Gegenwart“, z. T. an der Hand einer besonderen Verbreitungskarte südlicher Tiere. E. F. S., S. 186—212.

der Eiszeitfauna, der kaum 1 cm lange Strudelwurm (*Planaria alpina*, Dana), der hier zuerst durch Voigt-Bonn nachgewiesen worden ist. —

Auf die eigentliche Eiszeit folgte auch in der Eifel die Tundrenzeit, deren Charakter das Hohe Venn noch heutigentags trägt. Als Reste aus ihr dürfen neben dem großen Brachvogel und dem Goldregenpfeifer besonders Waldeidechse, Kreuzotter und verschiedene Insektenarten, vor allem Libellen (so *Leucorrhinia dubia* [Vand.] und *L. rubicunda* L.) angesprochen werden.

In der nachfolgenden Steppenzeit mit vorwiegend kontinentalem Klima wanderten viele östliche Tierformen in die Eifel ein, z. T. solche von Riesengröße. Zahlreiche Restfunde dieser Tiere (so Mammut, wollhaariges Nashorn, Wildpferd) im Buchenloch bei Gerolstein, in der Kakushöhle usw. und besonders der bezeichnendsten Vertreter steppenbewohnender Fauna (Steppen- und Alpenmurmeltier, Steppenhamster und Pfeifhase) bezeugen diese Periode. Gleichzeitig erfolgte im nördlichen Vorlande der Eifel in weitester Verbreitung die Ablagerung des Lößes, eines in der Hauptsache staubförmig-feinkörnigen Windabsatzes, durch die Steppenstürme. — Mit dem Vordringen der Baumvegetation änderte sich auch wieder entsprechend das Faunabild. Tiere mediterraner Herkunft treten auf. Sie scheinen zu beweisen, daß in einem dem Heute unmittelbar vorangegangenen Zeitabschnitte wenigstens z. T. höhere Temperaturen als jetzt in der Eifel geherrscht haben, die einen Zug dieser Tiere nach Norden ermöglichten. — Die Verfasser setzen diesen Vorgang in Übereinstimmung mit anderen Forschern in die Waldzeit (= Litorinazeit der Ostsee?). — Von Südosten her einwandernd hausten Bär, Wolf, Luchs und Wildkatze in den Urwäldern. Neben Hirsch, Reh und Wildsau durchstriefte der Elch die sumpfigen Gelände. Kohlrabe und Uhu zogen zu. Des Auerhahns einstige Anwesenheit in den Eifelwäldern bezeugen Knochenfunde im Buchenloche bei Gerolstein. — Auch die noch heute in den Gebirgswäldern z. T. weitverbreiteten Lurche (Feuersalamander, Bergunke und Bergmolch), Klausilien (bes. die seltene *Azeca Menkeana* (C. Pfr.)) und zahlreiche Schmetterlingsarten sind südlicher Herkunft.

Als typische Südländer unter den Vögeln gelten u. a. Rothuhn, Steindrossel (beide heute dem Aussterben nahe), Zaun- und Zippammer, sowie vor allem der Gartenschläfer und der muntere, zeisigähnliche Girlitz. Ausgesprochene Mittelmeerformen unter den Amphibien sind Salamander- und Mauereidechse (die sonst nirgends in Deutschland vorkommt) und der Springfrosch. — Zahlreiche waldliebende Schmetterlinge (Bläulinge, Widderchen) und Libellen, Käfer und Heuschrecken (= *Oedipoda miniata* [Pall.]) und von Schnecken (*Pupa bigranata* Rossm., *Fruticiola cathusiana* [Müll.], *Milax marginatus* [Drap.]) vervollständigen die damalige Fauna.

Eine Änderung in der Mischung der Eifeltierwelt bringt nochmals der Mensch, dessen Auftreten ungefähr gegen Ende der Waldzeit erfolgt. Er verschiebt die natürlichen Grenzen von Wald und Feld und zwingt durch die Entwässerung der Moore und durch das Entfernen des Unterholzes walddiebende Tiere — so die scheue Hohltaube — zum Auswandern. Vertreter der „Kultursteppe“, besonders Vogelarten, ziehen zu und werden heimisch (so Haubenlerche und Grauammer). Als „Kulturfolger“ des Menschen werden bezeichnet: von höheren Tieren Wiesel, Wanderratte und Hausmaus, Haussperling (der erst mit dem Getreidebau in Deutschland eingewandert sein soll), Saatkrähe, Hausschwalbe und Rebhuhn — von niederen Tieren die Nachtschnecke *Limax terrellus* (Nils.), der Kohlweißling, das Heimchen, die Wanze u. a. — Im Eifelinneren kann bis zu gewissem Grade noch heutigen Tags von einer Andauer der Waldperiode gesprochen werden. Versuche mit dem Wiedereinsetzen des Auerhahnes (seit 1904 in den Kreisen Montjoie, Eupen und Düren), des schottischen Moorhuhnes im Hohen Venn und des Königsfasanes in den wärmeren Strichen der Nordeifel schlugen ein. Auch der gewöhnliche Fasan wanderte hier zu. — Die in den Eifelbächen ausgesetzten Regenbogenforellen, Bachsaiblinge und Silberfelchen vermehren sich unter gesetzlichem Jagdschutz gleichfalls zufriedenstellend. Nur des Schneehasen Einführung in die Eifelhochmoore ist aus unaufgeklärt gebliebenen Gründen fehlgeschlagen. —

Wichtige, z. T. unter neuen Gesichtspunkten zusammengefaßte siedlungs- und verkehrsgeographische Fragen behandeln die „Beiträge zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte der Eifel“, die den letzten der drei Hauptteile der Eifel-Festschrift füllen. Sie geben eine gute Übersicht über die kulturelle Erschließung und Entwicklung des Landes von der Römerzeit bis zur Gegenwart.

Eine besonders bemerkens- und lesenswerte Arbeit in diesem Teile der Festschrift bildet der Beitrag F. Kramers¹⁾, dessen Feder die Eifel-forschung schon manche Förderung verdankt. Beredt preist, doch streng sachlich und kritisch behandelt er die kulturellen Großtaten der Römer in der Eifel. Nicht, als ob sie dem Lande die höhere Kultur überhaupt erst gebracht hätten: sie fanden vielmehr auf ihren Eroberungszügen gegen Germanien schon relativ hohe, eigenartige Kultur aus keltisch-germanischer Zeit dort vor. Auch war damals die Eifel bereits mit geschlossenen Dorfanlagen und mit größeren Einzelhöfen ziemlich dicht besiedelt. Sie bildete schon „Mittelland des Verkehrs“ zwischen Rhonegebiet und Niederrhein. Die Römer bauten nur weiter aus: in erster Linie die vorhandenen Haupt-

¹⁾ Franz Kramer: Die Römer in der Eifel. E. F. S., S. 215—246.

verkehrswege. Auch ergänzten sie diese — hauptsächlich zur wirtschaftlichen Erschließung, weniger für militärische Zwecke — durch zahlreiche befestigte Querstraßen und Verbindungswege. Bei ihren Militär- und Kolonisationsanlagen trugen sie den vorgefundenen baulichen Eigenarten und der Natur des Landes streng Rechnung. Neu führten sie nur die Ziegelbrandsteine als Baumaterial ein. — Durch die in ihrer großzügigen Anlage und Durchführung noch heute bewundernswerte und technisch kaum übertroffene Wasserleitung¹⁾ aus der Eifel nach Cöln, die noch in Resten erhalten ist, setzte sich das Römervolk ein unvergängliches Denkmal seiner Ingenieur- und Baukunst.

Auch die schon von den Germano-Kelten benutzten Heilquellen des Landes erfuhren durch die Römer weiteren Ausbau. So legten diese bereits in Bad Bertrich (Moseltal) die z. T. bis heute erhalten gebliebenen unterirdischen Bauten an. Nach Plinius wurden durch Legionssoldaten besonders auch die Aachener Thermen, d. h. die heißen Quellen der Worm (vom keltischen worm = warm abzuleiten) ausgebaut. — Ferner betrieben die Römer eifrig den Bergbau, der schon seit hallstädtischer (= keltischer) Zeit in der Eifel umgegangen ist. Namentlich gewannen sie die Blei- und Kupfererze aus dem Buntsandstein der Nordeifel (Mechernich, Leversbach, Bergheim), Glamei (Stolberg) und das allgemein verbreitete Eisen: letzteres, wie gefundene Schmiedeeisenblöcke von 140 × 30 cm Durchmesser bezeugen, besonders auf der Hochfläche von Schmidtheim und Marmagen. Vorzügliches Bausteinmaterial fanden die Römer einmal in den Kalksteinbrüchen der Nordeifel, bei Langerwehe und Kalkar (= Sötenicher Mulde), zum anderen in den Vulkangebieten der Hocheifel, wo ihnen die Trachyttuffe des Brohltales, die Lavafelder des Laacher Sees und die Traßbildungen bei Krufft sehr begehrte Baustoffe lieferten. — Von industriellen Tätigkeiten führten sie neben der Töpferei (Iversheim, Speicher) und der Glasfabrikation (bes. von Fensterglas) auch die Tuch- und Wollbereitung ein. Diese Industrien wurden besonders in der Nordeifel heimisch. Sie werden z. T. noch heute dort (Aachen, Eupen) gepflegt.

Die Kultur der Römer wurde von deren Nachfolgern in der Besiedlung des Landes, den Franken und Alemannen, übernommen, wie u. a. zahlreiche, ursprünglich römische, später germanisierte Ortsnamen bekunden: so der „Kermeter“ (von carpinetum = carmetum (spätlateinisch) = Hainbuchenwald) und das weitverbreitete „Pesch“ (= pascum = „Viehweide“). —

Über die vielgestaltige Geschichte und die wechselvollen Geschehnisse

¹⁾ Vergl. Skizze davon auf E. F. S., S. 220.

der zahlreichen Burgen und Schlösser der Eifel berichtet an der Hand prächtiger Abbildungen Bruno Hirschfeld¹⁾.

Die aus den verschiedensten Zeiten stammenden alten Rittersitze, deren es mehr als 700 gegeben haben soll, liefern nicht unwichtige Dokumente zur Siedlungsgeschichte des Landes. Leider sind nur relativ wenige bis heute erhalten geblieben. Die meisten sind verfallen oder in Kriegszeiten zerstört worden. —

Die Geschichte bestimmter Hauptindustrien, so der Eisenindustrie²⁾ und der Steinbruchindustrie (Basalt, Lava, Bautuff- und Schwemmsteine, Kalke, Sandsteine und Schiefer)³⁾, sowie die Eifel als Industriegebiet an sich⁴⁾ schildern kürzere Aufsätze, deren Besprechung hier zu weit führen würde. — Besonders interessiert noch die auf geologischer und klimatischer Grundlage aufbauende Arbeit Th. Brinkmanns⁵⁾ über das Wirtschaftsleben des Eifelbauern. Der Autor entwirft darin ein übersichtliches Bild vom Werdegange der Kultur in dem einst hochkultivierten und dicht besiedelten, später allmählich verarmten und entvölkerten Lande, das noch vor 40 Jahren als bitterarm verrufen war. Er führt dabei den Leser durch die mehr als zweitausendjährige, geschichtlich bewiesene Entwicklungszeit (die vorgeschichtliche reicht ungleich weiter zurück) mit ihrer Wechselfolge verschiedenartigster Kulturen. Wir lernen die Kelten als bereits seßhaftes, ackerbau- und viehzuchttreibendes Naturvolk mit germanischem Einschlag kennen, das schon eigene, höhere Kultur besitzt und sich zur Römerzeit stark mit romanischen Elementen zu Keltoromanen mischt. Vom 5. Jahrhundert ab ergreifen deutsche Stämme, besonders Franken und Alemannen, Besitz vom Lande. Diesen folgen, von Karl dem Großen dorthin verpflanzt, Sachsen. — Als keltoromanische Volksreste sind die noch heutigentags am Südsüdabhange des Venns (Malmedy) ansässigen Wallonen anzusprechen.

Kurzen Bemerkungen über die von verschiedenen Autoren verschieden beurteilten Charakterzüge des heutigen Eiflers folgen ausführlichere über Bevölkerungsbewegung, Berufsgliederung und Verkehrsverhältnisse. Entsprechend der Natur und der Bodenbeschaffenheit des Landes ist der Eifler hauptsächlich auf Ackerbau und Viehzucht angewiesen. — Die Industrie

¹⁾ Bruno Hirschfeld: Die Burgen der Eifel. E. F. S., S. 247—268.

²⁾ Justus Hashagen: Zur Geschichte der Eisenindustrie, vornehmlich in der nordwestlichen Eifel. E. F. S., S. 269—294.

³⁾ Anton Hambloch: Die Steinindustrie in der Vordereifel. E. F. S., S. 295—308.

⁴⁾ Karl Heindle: Die Eifel als Industriegebiet. E. F. S., S. 309—312.

⁵⁾ Theodor Brinkmann: Aus dem Wirtschaftsleben der Eifelbauern. E. F. S., S. 319—391.

hat im ganzen nur in den Randgebieten festeren Fuß gefaßt. Sie folgt vorzugsweise den natürlichen Zugangswegen in das Landinnere, den Flußtäälern. — Genauere statistische Angaben erläutern die Wanderbewegungen im Volkskörper, das Verhältnis des angebauten zum anbaufähigen Lande, die Arten und Formen des Ackerbaues (z. T. noch Dreifelderwirtschaft oder gar rüskständige Schiffelung) und die Intensität der Bodenbewirtschaftung. Letztere fand zur Hebung des Landes und zur Linderung der Armut infolge jahrelanger Mißernten (bes. 1882) z. T. beträchtliche staatliche Unterstützung und nützliche Anregung. —

Die letzte Arbeit der Festschrift bringt eine sorgfältige Zusammenstellung alter, z. T. auch heute noch gepflegter Sitten und Gebräuche aus dem Leben des Eifelbauern. A. Wrede¹⁾ weiß auf Grund fleißiger Einzelstudien von manchen ganz eigenartigen Bräuchen zu berichten, die in der Stammesart der Bewohner der einzelnen Eifelgebiete begründet sind. Sie tragen z. T. noch ganz altväterische Züge: so die alteifeler Hochzeitsbräuche, Totenfeiern, Festfeiern zu Neujahr, Weiberfastnacht, Maigelag, Kirmes, Nikolastag usw.²⁾ —

Manche Wissenslücke aus dem Eifelgebiete füllen die vorstehend besprochenen Arbeiten aus, besonders die im Rahmen der Eifel-Festschrift erschienenen. Aber gerade bei deren Durchblättern empfindet der Leser stark, wieviel lohnende und dankbare wissenschaftliche Arbeit noch zu leisten sein wird, um unsere landeskundlichen Einzelkenntnisse der Eifel auf einen befriedigenden Höhestand zu bringen.

Möchten diese Zeilen ein wenig dazu beitragen, Mitarbeiter an der weiteren Erforschung des schönen und eigenartigen Landes deutscher Erde auch in den mittleren und östlichen Teilen unserer Heimat und innerhalb des Mitgliederkreises der Gesellschaft für Erdkunde Berlin zu werben. —

Gustav Nachtigal.

Ein Forscherleben in mangelhafter Beleuchtung.

Mit großer Erwartung hatte ich im vergangenen Winter, während meines ägyptischen Aufenthalts, den stattlichen Band in die Hand genommen, in dem Dr. J. Wiese sich anheischig macht, das Leben von Gustav Nachtigal als das eines deutschen Forschers zu schildern¹⁾. Aber gar

¹⁾ Adam Wrede: Eifeler Bauernleben in Sitte und Brauch. E. F. S., S. 392-423.

²⁾ Manche Förderung erwies und erweist der Pflege und der Erforschung alteifeler Art und Sitte auch der Eifelverein in seinem Vereinsblatte (Eifelvereinsblatt, im Selbstverlage bei K. Georgi Bonn, 14. Jahrgang, 1914).

³⁾ Gustav Nachtigal, ein deutsches Forscherleben im dunklen Erdteil. Mit Unterstützung der Nachtigal-Gesellschaft zu Berlin herausgegeben von Dr. J. Wiese. Mit einem Titelbild, 45 Abbildungen und einer Karte. (387 Seiten). Berlin 1914. Verlagsb. Alfred Schall.

bald stieß ich beim Lesen auf bedenkliche Anzeichen von fehlerhafter Arbeitsweise. Sie ließen den Verfasser als sehr ungeeignet erscheinen, ein so reiches Forscherleben erschöpfend und in würdiger Form der Nachwelt zu verkünden. Da mir in Luxor Nachtigals großes Reisewerk nicht zur Verfügung stand, um mich über die Herstellungsweise der im vorliegenden Werk zusammengetragenen Auszüge zu orientieren, wandte ich mich an den mir befreundeten, jetzt in Kairo ansässigen und durch seine Haussa-Studien rühmlichst bekannten, auch sonst in afrikanischen Dingen wohlbewanderten Sprachforscher Rudolf Prietze mit der Bitte, an der Hand der von Dr. Wiese benutzten Quellen das Verhältnis nachzuweisen, in dem des Herausgebers eigene Darlegungen zu den nur in geringem Maße als solche bezeichneten Entlehnungen ständen. Ich hoffte dadurch eine wohldokumentierte Kritik des Werkes zur Veröffentlichung in der Zeitschrift unserer Gesellschaft zu ermöglichen.

Herr Prietze unterzog sich der sehr mühsamen Arbeit mit größter Gewissenhaftigkeit und teilte mir das Ergebnis in einem umfangreichen Schriftstück mit, von dem ich im nachfolgenden eine gekürzte Wiedergabe biete. Herr Prietze hat nämlich, aus gewissen, jedenfalls sehr achtungswerten Gründen, die ich aber im Interesse der Gesellschaft für Erdkunde nicht anerkennen mag, sich geweigert, diese Kritik des Wieseschen Werkes unter seinem Namen der Öffentlichkeit zu übergeben. Nach dem Befund hat er als zusammenfassendes Urteil zunächst festgestellt: Weit entfernt, aus wirklicher Verarbeitung des Stoffes ein Lebensbild zu schaffen, begnügt sich der Verfasser zum weitaus größten Teil mit einer wörtlichen, bald ausdrücklich als solche bezeichneten, bald stillschweigenden Wiedergabe der herangezogenen Stellen. In den massenhaft vorkommenden Fällen, bei denen die Entlehnung nicht eingestanden wird, ist die erste Person durch die dritte ersetzt. Ein solcher Unfug tritt in höchst ärgerlicher Gestalt da in die Erscheinung, wo bei wörtlichem Wiederabdruck eine von der Bescheidenheit des Helden diktierte Einschränkung, eine karge Selbstbeurteilung als selbstverantwortetes Urteil des Verfassers erscheint. So lesen wir an Stelle der von Nachtigal (s. S. I, 7) gegebenen Worte — „meine geringe Befähigung zu wissenschaftlichen Forschungsreisen . . . ein Mangel, der die Ergebnisse meiner späteren . . . Wanderung in ihrem Werte nur allzu sehr beschränkt“ — bei Wiese (s. 30): „seine geringe Befähigung . . . ein Mangel, der die Ergebnisse seiner . . . Wanderung . . . nur allzu sehr beschränkt“¹⁾.

Doch auch, wenn sich das Buch nur als eine Art Chrestomathie mit angemessener Verknüpfung von Ausschnitten aus bewährten Werken geben wollte, würde der Mangel an Geschick und namentlich an aufgewandter Sorgfalt bei dieser Herstellungsweise eines Lebensbildes aufs ärgste zu rügen sein. Die, abgesehen von den Briefen, vielfach schlecht erwogene Auswahl der entlehnten Stücke läßt das „Forscherleben“ als solches nicht zu seinem Recht kommen.

Einen ungebührlichen Raum nehmen die über Land und Leute zusammengestellten Abschnitte ein, die mit dem Lebensbild nichts zu tun haben.

¹⁾ Markante Beispiele der Art finden sich noch S. 45 (Abschätzung der Seelenzahl) und S. 80 (über den Charakter der Teda).

Sie umfassen über 100 Seiten! Beispielsweise dürfte hierbei zu erwähnen sein, daß in eine Biographie Th. Mommsens doch nicht Abschnitte der römischen Geschichte hineingehören würden. Nur als Proben von der Darstellungs- und Auffassungsweise des Helden könnte ihnen ein entsprechend beschränkter Platz zustehen. Was haben vollends Abschnitte, die gar nicht mehr auf Nachtigal fußen, sondern auf Arnold Schulze (Bornu S. 100—118) oder auf Mason-Bey (Dar Fur S. 248 ff.), mit diesem Lebensbilde zu tun? Aber auch in der Behandlung der Erlebnisse tritt nicht selten wichtiges hinter minderwichtigem zurück, oder wird ganz übergangen. Wie ein Raub am Helden, so auch am Leser nimmt es sich aus, wenn der Verfasser das „Forscherleben“, das er dem deutschen Volk schildern will, um seinen heroisch-tragischen Abschluß verkürzt, um den mit Hingabe der letzten Kräfte durch Nachtigal besiegelten Erwerb unserer westafrikanischen Kolonien im Jahre 1884 und 1885. Da wäre freilich eine eigene Leistung unerlässlich gewesen, der Verfasser aber hat es sich bequem gemacht, denn er begnügte sich mit Heranziehung auf zehn Seiten von Paul Gübelfeldts allerdings wundervoller Gedächtnisrede bei der Trauerfeier unserer Gesellschaft im Mai 1885.

Aus dem Befunde der Herstellungsweise des Buches seien nun die folgenden Daten zusammengestellt. Ihm liegen hauptsächlich zugrunde: 1. die herrlichen Nachtigal-Erinnerungen von Dorothea Berlin, 2. Nachtigals großes Reisewerk, 3. Gübelfeldts Gedächtnisrede. Dr. Wiese führt außerdem noch als Grundlagen seiner Darstellung an: 4. Das Sultanat von Bornu, von Dr. Arnold Schulze (S. 135—152), 5. für die Bewohner von Kanem Nachtigals Abhandlung in der Zeitschr. der Ges. f. Erdk. (S. 135—152), 6. für Dar-For Mason-Bey's Werk (S. 348 ff.). Die aus den drei genannten Hauptquellen genommenen und ausdrücklich zitierten Stellen nehmen zusammen 141 Seiten ein; die ohne Angabe der Entlehnung mit dem Anschein der eigenen Darstellung, aber wörtlich wiedergegebenen Stellen dieser drei Hauptquellen¹⁾ betragen 143 Seiten, beide Arten der Wiedergabe demnach zusammen 284 Seiten. Die unter 4, 5 und 6 aufgeführten, vom Verfasser ausdrücklich namhaft gemachten Quellen konnten zu dieser Statistik nicht herangezogen werden. Da das Werk 387 Druckseiten enthält, läßt sich die eigene stilistische Leistung des Verfassers auf höchstens ein Viertel seines Buches veranschlagen; sie wird sich aber wahrscheinlich auf nur ein Fünftel des Umfangs belaufen.

Gewiß sind die Zitate aus obigen Hauptquellen, so namentlich die köstlichen Briefe Nachtigals eine Zierde des Buches, ja sie umfassen zusammen mit den uneingestandenem wörtlichen Anführungen alles in ihm lesenswürdige. Daß aber der Verfasser für den ganzen an Mühsal und Entbehrung so überaus reichen Zug durch die Wüste bis Bornu und namentlich für die an Todesschrecken und Leiden so reiche Reise nach Tiberti sich lediglich mit der Wiedergabe jener heiteren brieflichen Rückblicke begnügt, wo Nachtigals lebenswürdiger Galgenhumor in so erfrischender Weise zum Ausdruck gelangt, statt auf den sorgsam erwogenen Bericht im Reise-

¹⁾ R. Prietze hat auf seinem sorgfältigst zusammengestellten Entlehnungsregister allein für diese zweite Klasse der Entlehnungen 40 zusammenhängende Stellen aus Nachtigals Reisewerk und 9 aus den Erinnerungen von Dorothea Berlin nachgewiesen.

werk selbst zurückzugreifen, ist abermals als ein gar zu bequemer Notbehelf zu verurteilen. Selbst die von Nachtigal (s. S. I. 235—244) so rührend geschilderte Gefahr des Verdurstens wird (S. 57) mit nur drei Zeilen abgetan.

Derselbe Mangel an Perspektive, der sich in den so wenig einheitlich gestalteten länder- und völkerkundlichen Abschnitten¹⁾ kund tut, kennzeichnet auch die Darstellung von Nachtigals Reisen und Entdeckungen, die doch den Hauptgegenstand ausmachen sollten. Da werden bei aller Entlehnungsfülle oft hervorragende Erlebnisse zu wenigen Zeilen zusammengezogen oder gar ganz weggelassen. Über die so wichtige Reise von Kuka nach Borku wird oft nur Unzusammenhängendes und Lückenhaftes berichtet. Ein sieben Wochen umfassender Reiseabschnitt auf dem Zuge durch Borku wird übergangen (S. 182), die vier Wochen dauernde Rückreise nach Bornu auf zwei Zeilen zusammengefaßt. Die zwanzigtägige Reise zum Fitrisee wird (S. 283) in 15 Zeilen erledigt und der sechswöchige beschwerliche Abstecher in die terra incognita von Dar-Runga ist mit zwei Zeilen abgetan! Der sechs Wochen währenden, durch gleichfalls völlig unerforschtes Gebiet führenden Reise nach Dar-For widmet der Verfasser eine halbe Seite (S. 337), und mit gleicher Flüchtigkeit läßt er den Forscher die einen ganzen Monat in Anspruch nehmende Strecke von el-Fascher nach el-Obeid durcheilen.

Bei einer derartig zerstückten, unausgeglichenen Darstellung ist es nicht zu verwundern, wenn der Faden des Zusammenhanges nicht nur dem Leser, sondern selbst dem Verfasser wiederholt verloren geht. Namentlich gegen den Schluß des Werkes geraten die Etappen und viele Zeitangaben der Reise in Verwirrung. An anderen Stellen werden Personen, mit denen uns Nachtigal ausführlich bekannt gemacht hat, nicht aber der Verfasser, als alte Bekannte behandelt, ohne es für den Leser zu sein. Andere Persönlichkeiten werden aus Vergeßlichkeit wiederholt vorgeführt. Häufig fehlen die zur Orientierung des Lesers erforderlichen Daten, oft auch sind sie, wenn vorhanden, unzuverlässig. An verschiedenen Stellen treten uns eigenmächtige Abänderungen entgegen, vorgenommen am Wortlaut der nach Nachtigal zitierten Sätze: Ausfuhr von Straußenfedern verfunffacht, statt „verfünfzigfacht“; aus fünf Viertelstunden werden (S. 204) 5¼ Stunden, und viele ähnliche. Wunderlich nimmt es sich aus, wenn der Verfasser Nachtigals Ausführungen absichtlich ändert, z. B.: Die Yedina (S. 155) statt auf eine Kopffzahl von 12—15 000 auf eine solche von 15—20 000 schätzt (ähnliches wiederholt sich S. 161). Eine als Stimmungsbild ausdrücklich angeführte Seite aus dem Werke Nachtigals hat der Verfasser (S. 87) erheblich umgestaltet. Von dem häufig recht fragwürdigen Deutsch, Folge hochgradiger Hast, mag bei den vielen sachlichen Mängeln nichts gesagt sein. Im Einklang damit steht eine Fülle von Druckfehlern, besonders bei den Namen, wie sie sich selten in einem Buche beisammenfinden dürften. Die mitten in Güßfeldts Gedächtnisrede eingeklebte Kartenskizze von Afrika ist ein Unikum an Unzulänglichkeit.

Über die Herkunft der Bilder fehlt jede Bemerkung. Sie stehen fast nie an der richtigen Stelle, noch findet sich eine Andeutung, zu welcher

¹⁾ So sind z. B. über Bornu, Wadai und Dar-For eine Menge von historischen und politischen Angaben zusammengetragen, aber keine über Baghirmi, wo sie bei Nachtigal (s. S. II. 69c—728) so reichlich zu Gebote stehen.

Stelle sie gehören, ja manche Aufschriften lassen vermuten, daß der Verfasser selber hierüber im Unklaren war. Dem dicken, in seinem Äußeren prächtig erscheinendem Band ist kein alphabetisches Inhaltsverzeichnis beigegeben, was ein schnelles Nachschlagen auf der Suche nach Einzelheiten zur Unmöglichkeit macht.

Zum Schluß muß der schwerste Vorwurf wiederholt werden, der den Verfasser wegen seines leichten Hinweggehens über Nachtigals volkstümlichste Großtat trifft. Nach des Kardinals Lavigerie später veröffentlichten Erinnerung ging Nachtigal seiner Aufgabe mit dem Bewußtsein sein Leben zu opfern entgegen. Auch in Frau Prof. Berlins Erinnerungen (S. 228 ff.) sind diesem heroischen Abschluß seines Lebens mehrere schöne Seiten gewidmet. Eine Schilderung jener ersten Phasen unserer kolonialen Ära von 1884/85, in denen sich ihr Vorkämpfer die höchste Krone seines Opfermuts errang, hätte dem Lebensbilde nimmermehr vorenthalten werden dürfen.

Georg Schweinfurth.

KLEINE MITTEILUNGEN.

Europa.

Der Darß und Zingst. In einer beachtenswerten Studie legt Th. Otto die Ergebnisse mehrjähriger Arbeiten an einer besonders interessanten Stelle der pommerschen Küste vor.¹⁾ Im Darßer Ort springt in einen stark bewegten Meeresteil eine Landspitze weit vor, die an Kühnheit der Form noch die Kaps von Rügen übertrifft, die doch aus Geschiebemergel und Kreide, also festem Material, bestehen, während hier alles Sand ist und flaches Land. Tatsächlich stecken aber nun auch im Darß und im Zingst ältere Kerne und aus der gegenseitigen Lage derselben und dem Stil der vom Meer hier geschaffenen Formen erklärt sich die so wunderbar symmetrisch geschwungene Uferform. Ich habe in dieser Zeitschrift (1911, S. 546) schon einmal auf diese Uferstelle hingewiesen und damals eine Kartenskizze der Entwicklung des Darß 1 : 200 000 gegeben. Dieselbe besteht nach den sehr gründlichen Untersuchungen von Otto auch jetzt noch insoweit zu Recht, als sie die Rolle wiedergibt, welche Fischland und Altdarß bei der Entstehung der Bogenwälle des Neu-Darß gespielt haben. Die Fortsetzung nach der Prerow-Bank hinüber, einem dritten, nördlich gelegenen Landkern, bestreitet Otto dagegen und nimmt sie in seine Bildungsskizzen nicht auf. Während ich Ottos Berichtungen in mehreren anderen Punkten gern annehme, kann ich bezüglich der Rolle der Prerow-Bank nicht von meiner Ansicht abgehen und Ottos Skizzen vermögen mich nicht zu überzeugen. Es kann aber natürlich nicht meine Aufgabe sein, an dieser Stelle dieser Einzelfrage nachzuspüren, sondern es sei eben hier nur auf diese tüchtige Arbeit aufmerksam gemacht. Seit langer Zeit ist keine so wertvolle Studie über einen Teil der deutschen Küsten erschienen, wie sie hier vorliegt. Hoffentlich regt sie an, den vielen Problemen unserer Gestade weiter nachzugehen, damit wir allmählich unsere Küsten wirklich verstehen lernen.

G. Braun.

¹⁾ Th. Otto: Der Darß und Zingst. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der vorpommerschen Küste. XIII. Jahresber. Geogr. Ges. Greifswald. 1913. 235-485; Diss. Greifswald 1913.

Asien.

*** Die Erforschung des Siachengletschers im Karakoram durch die Workman-Expeditionen 1911/12.** Oberst H. Strachey hat im Jahre 1848 zuerst die Zunge dieses größten Talgletschers in außereuropäischem Gebiete betreten, aber erst T. G. Longstaff hat 1909 seine gewaltige Größe festgestellt undargetan, daß hier die Wasserscheide des Indusystems, dem der Gletscher angehört, weit nördlicher liege, als man bis dahin angenommen hatte. Indem er den Gletscher sowohl vom Zungenende aus 16 km weit verfolgte, wie über den Saltopaß betrat und eine Woche mit Aufnahmen zubrachte, konnte er bereits eine in den Grundzügen richtige Karte im Maßstab 1 : 500 000 entwerfen (Geogr. Journ. 1910, XXXV, S. 622—658, m. Karte). Nunmehr hat das Forscherpaar Workman fast vier Wochen im Spätsommer 1911 und zwei Monate im Sommer 1912 den Gletscher eingehend erforscht und daraufhin nicht nur eine treffliche Karte im Maßstab 1 : 175 000 veröffentlicht, sondern auch sehr wertvolle Beiträge zur Gletscherkunde mitgebracht (1. Geogr. Journ., XLIII, S. 117—148, m. Karte, und S. 273 bis 292; 2. F. B. Workman: The Exploration of the Siachen or Rose Glacier Eastern Karakoram, London 1914, 8°, 30 S.; 3. Ztschr. f. Gletscherkunde, 1913, VIII, S. 65—103). Der Gletscher wurde beidemal auf dem Wege Longstaffs vom Saltorotal aus über den 21 km langen, in der unteren Hälfte ganz mit Moränen bedeckten Bilaphondgletscher erreicht, an dessen oberen Ende der Saltopaß (5608 m; die Workmans nennen ihn Bilaphond La) zum 11 km langen Lolophondgletscher¹⁾, einem rechten Zufluß des mittleren Siachen hinüberführt. Es wurden sämtliche größere Zuflüsse erforscht und der Hauptgletscher selbst vom Zungenende bis zu den Pässen des Einzugsgebietes begangen. Der Rückweg erfolgte 1912 über den ebenfalls bis dahin unerforschten Kondusgletscher, der wie der Bilaphond zum Einzugsgebiet des Saltoroflusses gehört. Die Schwierigkeiten dieser erfolgreichen Expedition wird man richtig ermessen können, wenn man bedenkt, daß die nächste Basis im Saltorotal 50 km vom Gletscher entfernt ist und eine Karawane von 90 Kulis aufgeboden werden mußte, daß die Oberflächenbeschaffenheit des Siachen der Fortbewegung die größten Schwierigkeiten bereitet und bei dem langen Aufenthalt in Höhen über 5000 m die Menschen unter Appetit- und Schlaflosigkeit litten, ganz abgesehen von Kälte und tagelangen Schneestürmen, die dann wieder von Sonnenbrand abgelöst wurden.

Die Karte beruht auf den umfangreichen, an fünf Fixpunkte des Survey of India angeschlossenen, durch Peiltisch- und photographische Aufnahmen ergänzten Triangulierungen des Topographen C. Grant Peterkin, der ebenfalls alle größeren Gletscheräste besuchte. Nach dieser Karte und den Untersuchungen der Workmans können wir die Topographie des Siachensystems wie folgt skizzieren. Der Siachengletscher erstreckt sich mit einer Breite von 4—4½ km und einer Länge von 75 km von 35° 43½' nördlicher Breite und 76° 45' westlicher Länge in südöstlicher Richtung bis 35° 11' nördlicher Breite und 77° 17½' östliche Länge wobei die Gletscheroberfläche von 6400 m auf 3713 m mit

¹⁾ Der Name „Lolophond“ wurde den Workman von den Eingeborenen angegeben, ist aber nach Longstaff nur eine Entstellung des Namens „Longstaff“, womit ihn die Eingeborenen belegt haben, da Longstaff ihn zuerst betreten hat.

einem mittleren Gefälle von 1 : 26 abfällt. Aus der Zunge führt der Nubra im Sommer so gewaltige Wassermengen zum Shyok (Nebenfluß des Indus), daß eine Erreichung des Gletschers von der Zunge her in den Monaten Mai—September kaum möglich ist.

Die obersten Verzweigungen des Siachen ziehen beiderseits der nach Südosten in den Gletscher ausstreichenden König Georg V. Kette bis zum Queen Mary Peak (7409 m) hinan, die Kette selbst aber setzt sich weiter nach Nordwesten über den Pk 23 (Hidden Pk, 8049 m), die drei Gusherbrums (8018 m) und den Broad Pk (8270 m) bis zum K² (8597 m) fort. Von ihr zweigt sich am Queen Mary Pk eine Kette nach Südwesten über den Goldenen Thron zum Pk 25 (Bride Pk, 7650 m) ab, die mit dem nordwestlichen Teil der Hauptkette den Baltorogletscher im Osten abschließt. Die Südostgehänge dieser Queen Mary-Bride Pk-kette gehören dem Kondusgletscher an, dessen beide in tiefen Trogtälern parallel nach Süden ziehenden Hauptäste sich östlich des Pk 26 vereinigen. Der östliche Hauptarm ist, abgesehen von der obersten Partie, fast ganz mit Moränen bedeckt, die bis 100 m Höhe erreichen. Ein niedrigerer, von zwei eisbedeckten Sätteln (Silverthron Col 5974 m; Sia La 5700, von der Karawane beim Rückmarsch über den Kondusgletscher benutzt) unterbrochener Kamm, der vom Queen Mary Pk in gewundener Linie südwärts führt, trennt ihn im Osten von den weit ausgebreiteten westlichen Firngebieten des Siachen, die sich am Südostende der König Georg V. Kette, in etwa 5500 m Höhe, mit dem nördlichen Arm des Gletschers vereinigen. Dieser nördliche Ast des Siachengletschers, der sich an das Nordostgehänge der König Georg V. Kette anlehnt und sich schließlich wieder in drei Teiläste gliedert, wird im Norden und Nordosten von einer niedrigeren Kette umwallt, die sich zwischen Pk 23 und Queen Mary Pk von der genannten Hauptkette abzweigt und von zwei durch die Expedition erstiegenen Pässen, dem Indira Col (6342 m) und dem Turkestan La (5852 m) unterbrochen ist. Vom Indira Col, dem nordwestlichen Paß, erblickt man die Gusherbrumgletscher vom Turkestan La, dem nordöstlichen Paß, sieht man 1600—2000 m tiefer den etwa bis hierher bereits 1889 von Oberst Younghusband erforschten Urdokgletscher, der dem Siachen parallel, aber in entgegengesetzter Richtung fließt, den Gusherbrumgletscher aufnimmt und durch den Oprangfluß zum Tarim entwässert. Es gehören mithin diese Pässe der Hauptwasserscheide zwischen Indus und Ostturkestan an, die weiterhin als wohlausgesprochener Kamm, 53 km weit ohne Einsattelung, den Siachen an seiner Nordostseite und weiterhin seinen großen östlichen Zufluß, den Tarim¹⁾ Shehrgletscher, an seiner Nordseite begleitet und dann wohl noch weiter östlich gegen den Karakoram Paß verläuft. Aus der von einem Labyrinth von Spalten zerklüfteten Firnmulde des Tarim Shehrgletschers, der eine Länge von 27 km und eine Breite von 2,4—3,2 km hat, scheint ein etwa 6270 m hoher Paß zum Remogletscher (Quellgebiet des Shyok) hinüberzuführen. In dem stumpfen Winkel zwischen Siachen und Tarim Shehr erhebt sich aus der Hauptwasserscheide das Massiv des Teram Kangri (7470 m), der je einen größeren Nebengletscher zum Siachen und Tarim Shehr entsendet. Sonst empfängt der Siachen vom Nordosten her keine bedeutende Eiszufuhr.

¹⁾ Die Eingeborenen kennen nur den Namen „Teram“, den die Workmans vielleicht nicht mit Recht in „Tarim“ verwandelt haben.

Von der Südwestseite strömen dem Siachen unterhalb der großen westlichen Firnmulden noch drei größere Gletscher zu: ein unbenannter, der von jenen Firnmulden durch den Grat des Mt Ghent (7342 m) und Habicht (6754 m) abgegrenzt wird; dann folgt der große Peak 36 Gletscher, der die Abflüsse von den Nordostgehängen des Pk 35 (7705 m) und Pk 36 (7742 m) empfängt, und schließlich der Lolophondgletscher. Erst vom Peak 36 Gletscher an begleitet auch auf dieser Seite den Siachen ein ähnlich ausgesprochener Kamm wie auf der Nordostseite; während oberhalb zwischen den großen Gletscherzuflüssen nur einzelne Seitengrate zum Siachen vorspringen.

Die geologischen Verhältnisse sind sehr kompliziert. Die Gesteinsschichten sind, wie im ganzen Karakoram, intensiv gefaltet, so daß auf kurze Distanzen die zusammensetzenden Bestandteile einander ablösen und die infolge der enormen Druckwirkung dünnblättrigen und rasch verwitternden Gesteine einerseits scharfe Grat- und Gipfformen bilden, anderseits riesige Mengen von Moränenmaterial liefern, das für die Ökonomie des Gletschers von größter Bedeutung wird. Da die König Georg V. Kette vorzüglich aus Granit und Gneiß zu bestehen scheint, so wendet sich H. Workman gegen die Auffassung De Filippis, der besonders auf Grund von Moränenmaterial annahm, daß die Gusherbrums und der Goldene Thron aus Kalken und Konglomeraten bestehen. Denn besonders die Gusherbrums seien ja die topographische Fortsetzung jener Kette, unterschieden sich in ihrer Form nicht von deren Gipfeln und erreichten auch eine Höhe, die in der Regel im Himalaya den Granitmassiven zukomme. Das Moränenmaterial dürfte aus der niedrigeren Umrahmung stammen, ebenso wie der Habicht eine Granitspitze sei, die sich über schwarzen Schiefen aufbaue. Die Hauptwasserscheide, die das Nordostgehänge des Siachen und das Nordgehänge des Tarim Shehr bildet, besteht vorzüglich aus schwarzen Schiefen, die auch den Teram Kangri aufbauen, daneben enthält sie, besonders am oberen Siachen, größere Kalkpartien, Granit und Gneiß aber nur im obersten Gebiete des Tarim Shehr und an seiner Mündung. Ebenso ist der Kamm an der Südwestseite des Siachen, entgegen der Angabe Longstaffs, vorzüglich aus schwarzem Schiefer zusammengesetzt, doch tritt der Kalk hier mehr zurück und der Granit besonders am unteren Ende mehr hervor. Das Massiv des Pk 35 und 36 besteht wieder aus Granit.

Von größtem Interesse sind die glaziologischen Ergebnisse. Betrachtet man den Siachen von einem höheren Gipfel, so erkennt man, daß er aus einer Reihe von Strömen besteht, die parallel und unvermischt nebeneinander talab ziehen; die einen sind mit Gesteinstrümmern bedeckt (Moränenströme), die anderen aber blank (Weiße Ströme). Diese Ströme sind vom obersten Gebiet des Hauptgletschers und seiner Zuflüsse bis weit zungenabwärts zu verfolgen; dabei aber sind sie mannigfachen Wandlungen ausgesetzt. Indem die Eis- und Moränenmasse des Siachen durch die steten Zuflüsse talabwärts zunimmt, wird die ganze Masse, da die Talbreite sich kaum vergrößert, immer mehr zusammengepreßt. Am großartigsten zeigt sich dies unterhalb der Einmündung des Tarim Shehr, wo die oberhalb der Vereinigung zusammen 7,6 km breiten Gletscher in das 4,4 km breite Haupttal eingezwängt werden. Durch den gewaltigen Druck des Tarim Shehr, der bei seinem Einschwenken in das Haupttal einen Winkel von 140°

beschreibt, wird, wie auch sonst bei der Einmündung genügend starker Zuflüsse, die Eismasse des Siachen zur Seite gedrängt, die nordöstliche Seitenmoräne (graue Kalkmoräne) des Siachen und die nördliche Seitenmoräne (schwarze Hillockmoräne) des Tarim Shehr werden aneinander gedrängt und wandern nun Seite an Seite talabwärts, bleiben aber bis in geringe Entfernung vom Zungenende gänzlich unvermischt. Die Oberfläche des Tarim Shehr ist an der Mündung trotz des geringen Gefälles, aber infolge des großen Druckes, in gigantische Séracs zerbrochen, in deren wilden Gewirre von hoch und tief eine Menge von Seen liegen, umrahmt von dem großartigen Bogen der schwarzen Hillockmoräne. Diese „Druckséracs“ durchdringen zum Unterschied von den „Spannungsséracs“ die Eismasse nicht bis zum Grund, sondern nur bis etwa 30 m Tiefe.

Während die Moränen, wenigstens oberflächlich, den Firngebietern fehlen und erst an Stellen, wo der Schnee von der Gletscheroberfläche weggeschmolzen ist, als kleine Schuttanhäufungen erscheinen, die talab sich immer mehr verbreitern und über die übrige Gletscheroberfläche erheben, verhält es sich mit den weißen Strömen gerade umgekehrt. Sie kommen aus den Firngebietern herab, werden dabei durch den steigenden Druck zusammengepreßt, und dadurch in der Mittellinie emporgewölbt. Während diese Wölbungen im oberen Teil des Siachen sanft und symmetrisch sind, nehmen sie, besonders nach der Einmündung des Tarim Shehr, an Steilheit rasch zu. Die Oberfläche bricht auf und die intensive Sonnenstrahlung der großen Höhen greift die vergrößerte Oberfläche sehr stark an. Dadurch wird die Eismasse vermindert und erweicht, so daß sie dem Seitendrucke immer mehr nachgibt und immer mehr empor- und zusammengepreßt wird. Schließlich lösen sich die Überreste der Weißen Ströme häufig in 5—12 m hohe steile Eispysramiden auf (Pinnakel oder Eis-Penitentes), indem die dünneren Partien zwischen den massiveren wegschmelzen, bis endlich die weißen Ströme zwischen den Moränenströmen gänzlich verschwinden. So verschwindet z. B. der letzte weiße Strom am Chogo Lungma 14,4 km, am Hispar 16 km, am Kondus 18 km, am Biafo 5 km, am Siachen aber erst 2,4 km oberhalb des Zungenendes.

Es werden natürlich auch die Moränenströme talabwärts zusammengepreßt; da aber ihre Eismassen infolge der Schuttbedeckung nur minimaler Abschmelzung ausgesetzt sind, ihr Gesteinsmaterial andererseits durch Vereinigung mit anderen Seitenmoränen und Aufpressung ihrer Unterlage vermehrt wird, so erheben sie sich nach und nach über das Niveau der weißen Ströme, bilden allmählich Hügelreihen von 100 und mehr Meter Höhe (Hillockmoränen), welche die Reste der weißen Ströme zwischen sich zerpressen und schließlich die ganze Breite des Gletscherbettes einnehmen. Aber erst nahe dem Zungenende mischen sie sich miteinander, so daß hier die Oberfläche aus unregelmäßigen Erhebungen und Vertiefungen besteht. Der Siachen besitzt unterhalb der Mündung des Tarim Shehr 8—10 Moränenströme, unter denen folgende drei die bedeutendsten sind: 1. Die schwarze Hillockmoräne, die vom Tarim Shehr und vom Teram Kangri ungeheure Mengen von Schieferschutt herabbringt und sich nach der Einmündung in den Siachen bei einer Breite von 500 m zu Hügeln von fast 150 m Höhe erhebt, zwischen denen Seen liegen. Sie ist bis zum Zungenende zu verfolgen und mit 50 km Länge die größte Moräne des Karakoramgebietes. 2. Die

graue Kalkmoräne, die am Nordostkamm (Hauptwasserscheide), etwas unterhalb des Endes der König Georg V. Kette beginnt und aus Kalk, Breccien und Konglomeraten besteht; sie erhält seitlich immer mehr Zuwachs, wächst dadurch allmählich auf 400 m Breite und erhebt sich zu Hillocks von 100 m Höhe. Wie schon oben erwähnt, zieht sie schließlich an Seite der schwarzen Hillockmoräne fast bis zum Zungenende talab. 3. Die Granitmoräne. Sie kommt vom Peak 36 Gletscher, besteht ursprünglich aus 4—8 m hohen, durch einen Eisfuß getrennten Hillocks, die sich talab zusammenschließen und höher werden. Durch seitlichen Zufluß vermehrt, wird sie allmählich 500 m breit, vereinigt sich mit der nördlichen Seitenmoräne des Lolophondgletschers und zieht nun als Mittelmoräne talab.

Auch an den Rand der Moräne knüpfen sich im unteren Teil des Gletschers „Penitente-Pinnakel“, die dadurch entstehen, daß der zerstreute Moränenschutt in die Oberfläche einschmilzt. So begleitet z. B. am unteren Gusherbrumgletscher je eine Reihe die beiden Ränder des zentralen Moränenwalles. Von Kleinformen der Gletscheroberfläche sind noch die große Flächen einnehmenden Nieve Penitentes aus dem Firngebiet und die Eis-Penitentes unterhalb der Firnlinie zu nennen.

Die Ablation, die H. Workman für das Sommerhalbjahr auf 10 m schätzt, schafft in den oberen, mit Firn bedeckten Teilen des Gletschers oft große Wasseransammlungen, die in den kalten Nächten frieren, und dann entweder gar nicht oder nur auf Händen und Füßen kriechend passiert werden können. Weiter abwärts trifft man reißende Bäche, oft acht bis zwölf an der Zahl, die in den Furchen zwischen den aufgewölbten Eisströmen dahineilen, von denen ihnen seitwärts Bäche zuströmen. Oft sind sie 2—10 m breit, in Kanälen von zehn und mehr Meter Tiefe eingeschnitten, so daß sie nur auf Schneebrücken oder an Verengungen überschritten werden können. Kleine Seen findet man an vorspringenden Felsspornen, wo durch die Wärmestrahlung der Felsen das Eis auf 20—40 m Entfernung weggeschmolzen wird. Solche Seen wurden noch in 5600 m Höhe gefunden.

Diese unendliche Wüste von Eis und Schnee, die nur Steinböcke, Füchse, Widder und Schneehühner beleben und die nur an der Mündung des Tarim Shehr eine kleine Stätte bietet, wo Moränenreste eines höheren Eisstandes zwischen diffluierenden Gletscherarmen den Boden für etwas Gras bieten, diese Eiswüste ist nicht nur durch alpinistische Leistungen von Europäern bezwungen worden, sondern Steincairns, die an drei verschiedenen Punkten bis 5600 m gefunden wurden, deuten an, daß sie auch von den Eingeborenen schon durchwandert ist.

Das Erdbebengebiet des nördlichen Tienschan. Im Frühjahr 1911 wurde eine russische Expedition in die nördlichen Ketten des Tienschan, unter Führung von Bogdanowitsch, unternommen, zum Studium des durch das Erdbeben vom 4. Januar 1911 betroffenen und in seinen Oberflächenformen stark veränderten Gebietes (Sailiskij- und Kungeij Alatau, nördlich des Issyk-kul). Es liegt nunmehr darüber ein umfangreicher, glänzend illustrierter Bericht von Bogdanowitsch, Kark, Korolkow und Muschetow vor (Mémoires du Comité Géologique, Nouvelle Série, Livr. 89, Petersburg 1914). Der Leiter der Expedition grenzt die Gebiete dauernder Veränderungen

der Erdoberfläche ab gegen solche, die nur gelegentliche Erschütterungen erlitten haben, und untersucht ihre Beziehung zur Tektonik des Gebirges. Er kommt zu dem Ergebnis, daß ein geologischer Graben von rund 200 km Länge, der im Tal des Großen Kebin verläuft und sich nach kurzer Unterbrechung im Tal des Tschilik (Südabhang des Sailiskij Alatan) fortsetzt, das Gebiet stärkster rezenter Spaltenbildungen, Zerreißen und Bergstürze gewesen ist, von deren Großartigkeit die beigegebenen Photographien eine sehr gute Vorstellung geben. In dieser Zone größter Erschütterungen grenzen Sedimentgesteine an Granit. Eine zweite, weniger deutliche tektonische Linie, die ebenfalls mit einer Zone oberflächlicher Zerstörungen zusammentrifft, erstreckt sich nördlich des Sailiskij-Alatau über etwa 25 km. Die an diese tektonischen Linien geknüpften, oberflächlich sichtbaren Störungen verlaufen gradlinig. Es sind dies die Störungslinien erster Ordnung, die durch vertikale Bewegungen entstanden sind. Nördlich und südlich dieser Linien gibt es Gebiete, deren oberflächliche Veränderungen (Bergstürze u. a.) je nach der Steilheit der Gehänge mehr oder weniger zirkusähnliche Formen zeigen. Es sind die Zonen, in denen sich die Erdbeben durch horizontale Stöße fortpflanzen, z. B. die Gegend von Wernij.

Der Vergleich der Erdbeben des nördlichen Tienschan von 1868—1911 läßt vermuten, daß das Zentrum der Erschütterungen sich von der Peripherie des Gebirges entfernt und nach dem mittleren Teil der nördlichen Ketten, wahrscheinlich nach dem Terskij Alatau fortpflanzt. Das Erdbeben von 1911 übertraf an Ausdehnung bei weitem die von 1887 und 1889.

E. Wahnschaffe.

Bildung einer vulkanischen Insel im Westpazifischen Ozean.

Im Januar 1914, zur Zeit des letzten Ausbruches des Vulkans Sakurashima (vgl. diese Zeitschr. S. 151/53, S. 295 ff.), tauchte gleichzeitig eine kleine vulkanische Insel in der Nähe der Vulkan- oder Iwō-Inseln plötzlich aus dem Meere empor. Sie liegt in $24^{\circ} 16' 6''$ N und $141^{\circ} 28' 9''$ E, 3 Sm. nordöstlich von Minami-Iwō-jima (Südschwefel-Insel), welche die südlichste von den drei Vulkan-Inseln ist. Diese gehören einer großen Vulkanzone an, welche die Mitte der Hauptinsel Japans, Honshu, von NNW nach SSE durchzieht und dann in das Meer hinausläuft. In dieser Zone treten zahlreiche vulkanische Inseln auf, z. B. Igu-shichitō (Shichitō = sieben Inseln), Tori-shima, Aogashima und die Vulkan-Inseln. Zweifellos bilden die Marianen die Fortsetzung dieser Vulkanzone. Nach Berichten von japanischen Fachleuten (Terada und Ogura in The Journ. of the Geol. Soc. of Tōkyō, Vol. XXI (1914) und Ikegami in The Journ. of Geogr., Tōkyō Geogr. Soc., Vol. XXVI (1914); alles in japan. Sprache) begann die vulkanische Tätigkeit am 23. Januar 1914. Die japanische Verwaltung der Bonin-Inseln hatte bereits vorher einen Beamten nach Iwō-jima, einer der Vulkan-Inseln gesendet, da sie vermutete, daß im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Sakurashima auch in diesem sehr unruhigen Gebiete vulkanische Erscheinungen auftreten könnten. Der Beamte konnte vom 23. bis 25. Januar von Iwō-jima aus an der Stelle der neuen Insel ein fast ununterbrochenes Ausstoßen von großen Dampfmassen beobachten. Am 25. Januar, nachmittags, sah er das erste Mal die neue Insel, die an derselben

Stelle liegt, wo schon am 5. Dezember 1904 eine kleine vulkanische Insel (Shinto) aufgetaucht war, die aber nach $1\frac{1}{2}$ Jahren wieder verschwand. Bald darauf wurde das Kriegsschiff „Takachiho“, mit Prof. Terada, Dr. Kokura, Dr. Ikegami und noch einigen Herren an Bord, von der Regierung dorthin geschickt. Am 12. Februar kam das Schiff in die Nähe der neuen Insel. Leider konnte wegen der geringen Tiefen und der vulkanischen Unruhe nicht auf der Insel gelandet werden. Doch umfuhr das Schiff einen ganzen Tag lang in etwa 3 Sm. Entfernung den größten Teil der Insel. Das Ergebnis der Expedition kann wie folgt zusammengefaßt werden: 1. Die Insel bildet ein von NE nach SW sich erstreckendes Ellipsoid. Der Durchmesser beträgt von Osten nach Westen $\frac{1}{2}$ Sm. und von Norden nach Süden 0,7 Sm. Etwas nordöstlich von der Mitte der Insel befindet sich der bis 120 m aufragende Kraterwall, dessen Durchmesser beinahe die Hälfte des Durchmessers der Insel beträgt. Die Böschung der Flanken beträgt in oberen Teilen im allgemeinen etwa 30° , nach unten wird sie sanft und geht allmählich ins Meer über. Die Küste umranden jedoch größtenteils Kliffe, nur der südwestliche Teil ist Flachküste. Auf der Nordseite befindet sich eine große Depression, die vom Kraterwall bis zum Kliff reicht, und anscheinend durch ein Absinken an Verwerfungen entstanden ist. Ferner klappt am Südostgehänge eine große Lücke, welche sogar den Kraterwall durchbricht und ebenfalls bis zur Küste reicht. Sie dürfte durch Explosion entstanden sein. Durch diese Lücke sieht man von der hohen See aus in den trogförmigen Krater, aus dem periodisch Rauch emporsteigt. Die am Kliff und an der Kraterwand wahrnehmbare Schichtung machte es klar, daß die Insel ein Strato-Vulkan ist, der anscheinend aus Asche, Bimsstein und anderen feinen vulkanischen Materialien besteht. Lava ist nicht zu sehen. 2. Der Rauch, der aus dem Krater, meist in Zwischenräumen von wenigen Minuten emporsteigt, besteht hauptsächlich aus Wasserdampf, Schwefelsäure und Asche. An den Rändern der nördlichen Senkung findet man an verschiedenen Stellen kleine aufsteigende Rauchsäulen. Doch war damals kein Getöse auf dem 3 Sm. entfernten Schiff zu hören. 3. In der Nähe der Insel stieg die Temperatur des Meereswassers bedeutend an und die Oberfläche des Meeres war mit Bimssteinen bedeckt. 4. Die Entwicklung der nördlichen und östlichen Kliffe ist sehr bemerkenswert. Nach einer rohen Messung dürfte die nördliche Küste innerhalb der 18 Tage, vom 25. Januar bis 11. Februar, infolge von mariner Abrasion um ungefähr 7 Fuß pro Tag rückwärts geschritten sein. Falls die Messung richtig ist, würde die Insel bloß unter Einwirkung der Meeresabration etwa nach sechs Monaten verschwunden sein. Es ist vielleicht von Interesse zu erwähnen, daß eine im Jahre 1911 vorgenommene Tiefenmessung an derselben Stelle, an der früher auch die Insel Shinto gelegen war, 233 Faden ergab. An dem Verschwinden der Insel Shinto mögen Erosion, Senkung und allenfalls Explosionen Anteil gehabt haben. Der neuen Insel dürfte in absehbarer Zeit dasselbe Schicksal beschieden sein.

K. Oseki.

Niederländische Forschungen in der Insulinde. Mit seltener Großzügigkeit arbeiten die Niederländer an der wissenschaftlichen Erforschung ihrer Kolonien. Durch systematische militärische Expeditionen ist

es ihnen gelungen, das bis vor kurzem fast unbetretene Gebiet Niederländisch-Neuguineas fast ganz zu entschleiern, so daß wir schon heute keine großen Überraschungen mehr erwarten dürfen. Und schon setzt eine neue Agitation ein, die von namhaften Männern unterzeichnet und von der Niederländischen Geographischen Gesellschaft unterstützt wird. Sie stellt sich zur Aufgabe, die Inselgebiete zwischen Celebes und Neuguinea zu erforschen, also gerade Gebiete, über die wir nur in Vermutungen uns bislang ergehen können. Der Bericht dieser Kommission wird aber dadurch geographisch wichtig, weil in weitschauender Weise zuerst einmal eine Zusammenstellung unserer bisherigen Kenntnis der Inselwelt gegeben wird. So danken wir schon jetzt der Kommission eine neue Karte von Ceram und eine übersichtliche Zusammenstellung unseres Wissens in der Nummer 3, 1914, der Zeitschrift der Niederl. Geogr. Ges. Man darf an die Ausführung des Planes große Hoffnungen knüpfen, bildet doch gerade die mangelnde Kenntnis dieser Gebiete eine empfindliche Lücke bei der Beurteilung aller Fragen, die den Zusammenhang Asiens und Australiens, der Sundainseln und Neuguineas betreffen.

W. Behrmann.

Amerika.

Die Wirkung der Erosion an der Verwerfungslinie von San Franzisko. Durch das gewaltige Erdbeben von San Franzisko im Jahre 1906 wurde bekanntlich eine ausgedehnte Verwerfung gebildet, an der weithin die beiden Flügel um ein bis zwei Fuß vertikal — außerdem auch horizontal — gegeneinander verschoben wurden. Ruliff S. Holway hat die treffliche Gelegenheit benutzt, die diese Störungslinie bietet, um die Wirkung der Erosion innerhalb eines kurzen Zeitraumes festzustellen (Bull. of the American Geogr. Soc., 1914). Am bedeutendsten war sie in den beiden ersten Jahren, in denen die scharfen Kanten eine Abrundung erfuhren. Seitdem hat sich aber, trotz einer Regenmenge von 1000 mm, nicht viel verändert und die Störungslinie ist, abgesehen von den in Kultur genommenen Stellen, noch ebenso gut zu verfolgen wie 1906. Es trifft mithin nicht die Annahme zu, daß solche Wirkungen eines Erdbebens nach wenigen Jahren vollkommen verschwinden müßten.

E. Wahnschaffe.

*** Ergebnisse von J. Bowmans Expedition in die Zentral-Anden 1913.** Schon 1907 und 1911 hat J. Bowman, damals unterstützt von der Yale Universität, Expeditionen in die Zentral-Anden unternommen, worunter er die Anden etwa zwischen 14° und 28° südlicher Breite, also jenen Teil des Gebirges versteht, der die großen abflußlosen Becken des Titicaca- und Poopósees und der Puna di Atacama umfaßt. Die letzte und abschließende Expedition wurde von der Amerikanischen Geographischen Gesellschaft unterstützt, in deren Bulletin (1914, S. 161—183) der Forscher über die sehr interessanten Ergebnisse in diesem nach Naturverhältnissen und Bewohnern gleich mannigfaltigem Gebiete berichtet.

Der Ostflanke des Gebirges waren Studien im nordwestlichen Argentinien gewidmet. Hier findet man, etwa westlich von Salta, die Gehänge in 1370—1830 m Höhe, in der Zone der größten Niederschläge, mit Wäldern bedeckt, in denen Holz gewonnen, aber auf freien Flächen auch Ackerbau und Viehzucht betrieben wird. Unterhalb herrscht intensiver Ackerbau,

dem die aus der Waldzone kommenden Flüsse die Bewässerung liefern, oberhalb findet man Wald nur in schattigen, feuchten Talfluren, sonst breitet sich ein von Hirten bevölkertes Grasland aus. Doch gedeiht die Gerste bis 2750, m und noch weiter hinauf die Kartoffel. Auf den höchsten Erhebungen findet man noch Büschel von Ichugras. Der rasch emporblühende Handel mit dem chilenischen Salpetergebiet und die Entwicklung des Bergbaues bringen nunmehr auch in diese einst armen Gebirgsgebiete allmählich Wohlstand, während dem angrenzenden Teile des Chaco Ölgewinnung, Zuckerrohrpflanzung und Viehzucht eine günstige Entwicklung verbürgen. Dementsprechend hat sich Salta, die Hauptstadt der am meisten davon betroffenen Provinz, in der letzten Zeit stark verändert. Es besitzt jetzt große Geschäftshäuser, vier große Banken und sogar eine Straßenbahn.

Die großen abflußlosen Becken im Innern sind morphologisch von besonderem Interesse. Denn diese im Tertiär und älteren Diluvium um wenigstens 1500—2000 m emporgehobenen Gebiete gewähren vorzügliche Beispiele für die Entwicklung im ariden Zyklus. Die auf der letzten Expedition speziell erforschte Puna di Atacama liegt auf argentinischem Boden und stellt den südlichsten Komplex von abflußlosen Becken dar. Sie ist aus alten Schiefen, Kalksteinen und jüngeren Intrusivgraniten aufgebaut, die intensiv gefaltet und verworfen sind. Aber nur die Hauptstrukturlinien, die auch mit den rezenten Vulkanausbrüchen in Beziehung stehen und wiederholt tektonisch hervorgetreten sind, machen sich in der Topographie dieser alten Landschaft bemerkbar, die sonst in bemerkenswerter Unabhängigkeit vom Aufbau steht. Denn diese Landschaft war bereits vor der jungvulkanischen Epoche, welche die alte Topographie zum größten Teil verhüllt hat, in ein spätreifes Stadium getreten. Wo das vulkanische Material fehlt, wie in der Präkordillere nordöstlich von Tucuman, oder in den Ketten zwischen Rosario de Lerma und La Poma, sind die Züge der alten Landschaft wohl erkennbar, indem vor allem die Bergzüge sanfte, wohl abgeboöschte Formen zeigen, die im scharfen Gegensatz zu dem tief zerschnittenen Gelände jung vulkanischer Aufschüttung stehen. Mit der Abtragung der Beckenränder korrespondierte die Auffüllung der Zentralflächen. Die flachgelagerten, weit ausgedehnten, feinen, teilweise salzhaltigen Ablagerungen, die Bowman hier gefunden hat, zeigen an, daß der aride Zyklus damals weit vorgeschrittener war als heute, wo im Jugendstadium des neuen, durch die jungvulkanische Periode hervorgerufenen Zyklus, über sie hinweg grobes, unregelmäßig verteiltes Material fächerförmig ausgebreitet wird. Da aber selbst im gegenwärtigen Zyklus eine ganze Reihe von Becken einander angegliedert ist, so muß man annehmen, daß im älteren Zyklus die Angliederung der Becken viel weiter vorgeschritten war; erst die jungvulkanischen Aufschüttungen haben die alte Topographie größtenteils verdeckt, von neuem gesonderte Becken geschaffen und die Entwässerung zum Atlantischen und Pazifischen Ozean zum größten Teil abgeschnitten. Dagegen zeigt das Titicaca-Poopóbecken heute noch zum größten Teil den spätreifen Zustand, da sich hier die jungvulkanische Tätigkeit hauptsächlich auf die westliche Kordillere beschränkt hat. So findet man hier reife, sanfte Bergformen an den Beckenrändern, von denen in unmerkbarem Übergang flache Böschungen zum Rande der Salzsteppen führen und die einzelnen Becken sind einander angegliedert. Der Titicacasee entwässert

zum Poopósee durch den Desaguadero, der Poopósee entwässert wieder intermittierend in den Salar von Aullagas, der mit anderen großen Salars in enger Verbindung steht.

Im Titicaca-Poopóbecken studierte Bowman speziell auch die Frage einstiger größerer Seenbildungen. Er fand schön erhaltene Strandlinien im Poopóbecken, zum Teil bis 300 km südlich des jetzigen Poopósee (bei Llica), die einem vorübergehend in der Diluvialzeit vorhandenen See angehören, den er Minchinsee nennt. Dieser See, dessen feingeschichtete Bodenablagerungen auch im Desaguaderotal nachzuweisen sind, erstreckte sich südlich über das ganze Poopóbecken und näherte sich nördlich dem Titicacasee auf ungefähr 50 km. Das Niveau dieses Minchinsee lag etwa 10 m unter dem jetzigen Niveau des Titicacasee. In viel früherer Zeit, vermutlich zu Beginn des Diluviums, bestand im Titicacabecken ein See, dessen durch Ton- und Sandablagerungen und Muschelreste, nicht aber durch Uferlinien gekennzeichnetes Niveau, etwa 45 m über dem Spiegel des heutigen Titicacasee lag. Bowman nennt ihn Balliviansee. Der Abfluß dieses Sees grub sich allmählich tiefer ein, so daß die Ablagerungen dieses Sees größtenteils noch vor der letzten Eiszeit wieder ausgeräumt wurden, doch sind sie besonders an den Gehängen des Desaguadero zu sehen, der bei seiner Tieferlegung immer mehr in die Seeablagerungen einschneidet. Nach Bowman existieren weder die zahlreichen Strandlinien von Agassiz im Titicacabecken noch hat je ein einheitlicher See gleichzeitig das Titicaca-Poopóbecken bedeckt, wie andere Forscher annehmen. Die mächtigen Salzablagerungen im Westen und Süden des Poopósees gehören also nicht nur der Gegenwart und dem jungdiluvialen Minchinsee, sondern auch der langen Periode des älteren Balliviansees an.

Das Klima der Punta di Atacama ist winterkalt, so daß nicht selten Menschen umkommen und Vieh zugrunde geht. Bowman hat Temperaturen bis -20° beobachtet. Dagegen gibt es nur wenig Schnee, so daß, abgesehen von einigen Wochen im Winter, der „Maultierexpres“ von La Poma in Argentinien bis San Pedro de Atacama in Chile das ganze Jahr die Puna in sechs Tagen queren kann. Die häufigen Stürme sind ebenso unangenehm im Sommer, wo sie Staubwolken vor sich hertreiben, wie im kalten Winter. Die außerordentliche Trockenheit bewirkt, daß brauchbare Viehweiden nur in etwa 3300—4000 m Höhe zu finden sind, wo im Winter die Wolken hängen und im Sommer der Niederschlag noch am häufigsten ist. Oberhalb und unterhalb ist alles unverwertbares Land, abgesehen von kleinen, von den Bergflüssen bewässerten Tälchen und weit zerstreuten, kleinen Oasen. Die Oasenbewohner, die in der wüstenhaften Umgebung ihres kleinen grünen Fleckens kein Vieh halten können, sind daher auf die Viehzüchter der Berghöhen ebenso angewiesen, als diese auf die Produkte der Oasen. Viele Hirten ziehen im Winter in kleine Oasen, wo die älteren Leute bleiben und ihre kleinen Felder bestellen. Ein Hauptzentrum bildet San Pedro de Atacama, eigentlich ein Sammelname für zahlreiche eigens benannte kleine Siedlungen von zusammen 2000 Einwohnern, die hauptsächlich Maultiertreiber sind. Hierher kommen viele Hirten mit ihren Herden — oft haben sie sogar eigene Hütten am Rande des bebauten Gebietes — und handeln und tauschen die nötigen Artikel und Nahrungsmittel ein. Gar manche dieser in entlegenen Gebieten angesiedelten Hirtenstämme haben noch viele altertümliche Sitten und heidnische Gebräuche bewahrt.

Das patagonische Inlandeis. Kaum bekannt ist die Tatsache, daß Patagonien Inlandeis besitzt, denn bislang ist es nur an dem in die Täler hinabführenden Gletscherenden besucht worden. Auf Grund kritischer Studien, sowie eigener Beobachtung kommt H. Steffen (*Ztschr. f. Gletscherkunde VIII, 1914*) zu dem Resultat, daß der nördliche Teil der Inlandeisvergletscherung eine Hochgebirgsmulde innerhalb der Küstenvorhöhen und der nordsüdlich verlaufenden 3—4000 m hohen Kordillere mit den San Valentin ausfüllt. Nur Gletscherenden des Zährgebietes führen in die Täler hinab. Es liegt diese Zone zwischen $45^{\circ} 51'$ s. Br. und $47^{\circ} 45'$. Auch die südliche von ihr getrennte Eismasse, bei $48^{\circ} 10'$ beginnend und durch ungefähr vier Breitengrade sich erstreckend, scheint eine Depression im Innern der Kordillere auszufüllen. Sie ist noch nie überschritten worden, nur die in die Täler hinabführenden Gletscher wurden von Forschern wie Hauthal, Moreno, O. Nordenskjöld und Quensel besucht, wenn auch die ersten Nachrichten auf ältere Seefahrer (Francisco Cortés Ojea 1558) zurückgehen. Die große Ausdehnung des bis 70 km breiten Eiskuchens rechtfertigt vollauf den Namen „Inlandeis“, auch wenn das Zährgebiet keine geschlossene Masse darstellt. Die Nachrichten von tätigen Vulkanen in diesen Regionen, die durch die Grenzkommission gebracht wurden, bedürfen noch der Bestätigung.

W. Behrmann.

Australien.

Die neue Hauptstadt von Australien. Nach langer Wahl ist der Ort Canberra als Sitz der australischen Zentralregierung ausgewählt worden. In einem Aufsatz im *Geogr. Journ.* (1914, S. 378 ff.) behandelt Taylor die Vorzüge der Lage, die landschaftliche Umgebung und den Bauplan der Stadt. Canberra liegt in Neu-Südwesten am Molonglo, einem Nebenfluß des Murrumbidgee, leicht zu erreichen von den beiden größten Städten Australiens, Melbourne und Sidney, im Zentrum der dichtesten Bevölkerung. Vor dem 1904 gewählten Ort Dalgety hat Canberra den Vorteil besserer Zugänglichkeit und größerer landschaftlicher Schönheit. Geologisch besteht das südliche Hochland von Neu-Südwesten aus paläozoischen Sand- und Kalksteinen und Granit; gutes Baumaterial für die künftigen Bauten ist also leicht zu beschaffen. Die Umgebung stellt eine spätreif zerschnittene Fastebene dar, die selbst nur mehr in einigen Monadnocks erhalten ist. Später haben nordsüdliche Verwerfungen eine Änderung des Flußnetzes bewirkt (Verlegung der Wasserscheide zwischen Murrumbidgee und Snowy River nach Süden, Ablenkung des alten Oberlaufes des Snowy Rivers zum Murrumbidgee u. a.). In jüngster geologischer Zeit bis zur Gegenwart haben zahlreiche, allerdings kleinere Erdbeben stattgefunden.

Die Arbeit in Canberra wurde 1909 begonnen. Es sind Eisenbahnen gebaut (mit Sidney ist die Verbindung schon fertig gestellt, auf der Strecke nach Melbourne fehlen noch 36 engl. Meilen) und Wege angelegt worden. Für die Wasserversorgung ist am Cotter, südwestlich von Canberra, ein Wehr angelegt worden, da der im Sommer trockene Molonglo nicht genug liefern kann. Neben vielen anderen Karten und Skizzen gibt Taylor auch einen für die zukünftige Stadt entworfenen Plan. Er hat, wie Taylor rühmend hervorhebt, nicht einen amerikanischen Grundriß mit rechtwinklig sich schneidenden Straßen, sondern diese strahlen von einem Zentrum mit dem

Parlamentsgebäude aus. Für Anlagen mit einem See, Sportplätze und zahlreiche öffentliche Gebäude ist Sorge getragen. Gegenwärtig allerdings bestehen die wenigen vorhandenen Häuser noch aus Holz und Eisenblech, und das umliegende Gebiet, das Taylor für den Ackerbau für geeignet hält, trägt nur Schafweiden.

E. Wahnschaffe.

Staatsgrenzen und Stromgebiete. Ausgehend von einem Artikel von A. Dix untersucht Sieger (*Deutsche Rundsch. f. Geogr.* XXXVI 7, 8) das Verhältnis von Staatsgebiet und Stromgebiet. Es herrscht bei den Völkern das Bestreben, die Stromgebiete bis zur Wasserscheide in ihren Besitz zu bringen, doch ist der Satz: „Die Wasserscheide ist die naturgemäße Staatengrenze“ in dieser Allgemeinheit nicht haltbar. Ausnahmen sind dort zu suchen, wo Engen, Bodenerhebungen, Wüste, Sumpf oder Urwald einen Teil des Flußgebietes abschließen, wo sich Mündungsstaaten entwickelt haben und wo in „jungen Ländern“ der Kampf um den Besitz des Flußsystems erst beginnt.

Sieger gibt dann einen Überblick über die Staatsgebiete der Erde unter diesem Gesichtspunkt. Asien zeigt nur wenige und durchaus leicht erklärliche Zerreißen von Stromgebieten (am Amu, Amur und Ussuri, Yalu, Saluen und Mekong). Die rücksichtslose Zerschneidung der Stromgebiete Afrikas hat ihren Grund in der hastigen Aufteilung mit provisorischen Grenzlinien. Auch in Südamerika herrscht Unabhängigkeit der Grenzen von den Stromgebieten (Parana, Amazonas), auch hier sind die Grenzfragen noch ungeschlichtet. Obgleich in Nordamerika Kamm- und Wasserscheiden-grenzen ganz fehlen, so sind doch die wichtigsten Stromgebiete — soweit sie schiffbar sind — (außer dem Lorenzstrom) in einer Hand. In Europa ist das Durchschneiden der Stromgebiete durch Staatsgrenzen unbedenklicher, da letztere alt und eingelebt sind. In Westeuropa ist es aus natürlichen oder historischen Verhältnissen zu begründen, östlich des Varangerfjordes und der Weichsel (besonders im Südosten) ist es ein Zeugnis unausgeglichener Grenzen. Die neuen Grenzen der südosteuropäischen Halbinsel schneiden die Flußgebiete der Marica, des Struma, Vardar, des Schwarzen und Weißen Drin und der Metohija.

E. Wahnschaffe.

Der XIX. Deutsche Geographentag. Auf der Straßburger Tagung des Deutschen Geographentages in der Pfingstwoche war ein Gebiet der Geographie in den Vordergrund des Interesses gerückt, das sonst nicht so oft behandelt zu werden pflegt. Es war dies die Anthropogeographie. Nicht nur eine volle Sitzung war ihr gewidmet unter dem Titel „Wanderungen der Naturvölker“, sondern auch in den meisten Vorträgen über neuere Forschungsreisen, die zwei Tagungen ausfüllten, waren völkerkundliche Kapitel eingeschaltet. So brachte gleich der erste Vortrag von Hans Meyer nach einer kurzen Charakteristik der Geologie und Morphologie von Urundi eine völkerkundliche Darstellung der Bewohner des Zwergvolkes der Batwa, der ackerbauenden Bahutu und des Herrschervolkes der Batussi. Im zweiten Vortrag des Unterzeichneten wurde kurz auf die primitiven Eingeborenen Neuguineas eingegangen, doch sind die Ausführungen den Lesern dieser Zeitschrift bekannt (vgl. diesen Jahrg. S. 254 ff.). Über die Ausrüstung und Erfolge der antarktischen Expedition sprach Wilhelm Filchner;

er verabschiedete sich gleichzeitig von Deutschland, da er als Mitglied von Amundsens Expedition nach Norwegen übersiedeln will. Der Geologe der Expedition, Fritz Heim, schilderte Luitpold-Land als ein unter dem Inlandeis begrabenes Fjordgebiet, das in ein wohl zur ostantarktischen Scholle zu rechnendes Tafelland eingeschnitten ist. Er vermutet einen großen Einbruch, der sein Forschungsgebiet, quer durch Antarktika ziehend, von Grahamland trennt.

Die Berichte der übrigen Forschungsreisen kollidierten leider mit den Vorträgen über Gebirgsbildung. Wissenschaftlich am bedeutungsvollsten war wohl der Vortrag von Fritz Klute, der seine gründlichen Untersuchungen im Hochgebiet des Kilimandscharo benutzte, um weitausschauende Folgerungen über die Konstanz der Passate seit der Eiszeit zu ziehen. Der Vortragende brachte außerdem eine geologische Entwicklungsgeschichte der Vulkane des Kilimandscharo. Franz Thorbecke berichtete über das Land Tikar und Wute in Kamerun, das sich in das Hochland von Ndomme und das von Pygmäen bewohnte Inselgebirge von Njanti und die Niederung der Wuteebene trennt. In das Gebiet von Neukamerun führte der klare Bericht Hans Gehnes, der von den weiten Sumpf- und Mangroweflächen sowie dem Urwaldgebiet an der deutsch-französischen Grenze ein anschauliches Bild entwarf und bemerkenswerte Beobachtungen zur Tropenverwitterung herbeiführte.

Die Parallelsitzung wurde mit einem Vortrag Oskar Heckers begonnen, der zwei mitteldeutsche Beben vom November 1911 und Juli 1913 behandelte und die große Abhängigkeit der Intensität des Bebens von dem geologischen Bau der Schüttergebiete dartat. Siegmund Günther forderte zwischen die Typen der Dislokations-, Einsturz- und vulkanischen Beben noch tektonische Eisbruchsbeben, pseudovulkanische und krypto-vulkanische Beben einzuschieben, um die Gesamtheit der Beben zu umfassen. Gustav Braun lenkte die Aufmerksamkeit auf die Arbeiten der Geologen in der mittelhheinischen Tiefebene, die er morphologisch ausnutzte, um zu zeigen, daß in der Umgebung von Basel die Erosions- und Akkumulationstätigkeit des Rheins weitgehender auf die Oberflächen-gestaltung auch der Nachbargebiete, als bislang angenommen, gewirkt hat.

Dieser Vortrag leitete hinüber zu den landeskundlichen Vorträgen über Elsaß-Lothringen, in denen Rudolf Langenbeck referierend einen kurzen Überblick über die Vogesen gab, ohne immer im genügenden Ausmaß moderne Forschungsmethoden heranzuziehen. Besonderheiten der Flora besprach Ernst Krause; über eine wirtschaftlich für Elsaß-Lothringen wichtige Kulturleistung, nämlich die Rheinregulierung, berichtete Stadtbaudirektor Eisenlohr, während Georg Wolfram einen tiefgründigen Vortrag über Sprach- und Kulturgrenzen und Siedlungsformen von Elsaß-Lothringen hielt, indem er ausgehend von den Ortsnamen eine gute Darstellung der Siedlungsgeschichte bot. Friedrich Hahn berichtete als Vorsitzender der Zentralkommission für deutsche Landes- und Volkskunde über neuere Arbeiten, wies vor allem auf die demnächst erscheinende Landeskunde von Deutschland von Gustav Braun hin, während Wilhelm Meinarus den Siegfried Pasarge'schen morphologischen Atlas empfahl.

Die Schlußsitzung trug rein anthropogeographisches Gepräge, ja,

Karl Weule befürchtete sogar, daß die Geographie erobernd in das Gebiet der Ethnologie vordringen wollte, er bat um scharfe Gebietsabgrenzung und um wirksame Unterstützung der Ethnologie von seiten der Geographie beim Ausbau ihrer Wissenschaft. Er berichtete in seinem Vortrag über afrikanische Wanderungen, die den natürlichen, durch Trockengebiete und Urwaldregionen vorgezeichneten Bahnen gefolgt sind. Georg Friederici sprach über das Vordringen der malaischen Rasse nach Osten und die Besiedelung der weiten ozeanischen Inselwelt, fand allerdings bei Augustin Krämer nicht in allen Punkten Zustimmung. Endlich redete Fritz Krause über Wanderungen nordamerikanischer Indianer, er wollte durch seinen Vortrag, ähnlich wie Karl Weule, die Grenzen zwischen Geographie und Ethnologie scharf ziehen, indem er auf die Verschiedenheit der Forschungsmethode beider Wissensgebiete hinwies.

Wie immer war eine Sitzung des Geographentages der Schulgeographie gewidmet. Die diesjährige Tagung wird dadurch bedeutungsvoll, das der von Felix Lampe vorgelegte und empfohlene neue Lehrplan für Schulen von dem Deutschen Geographentage genehmigt und zu dem seinen gemacht wurde. Dadurch wird einem lange empfundenen Bedürfnis für ein einheitliches Vorgehen entsprochen, dem sich auf die Dauer die Behörden nicht verschließen werden. In gleicher Sitzung sprach Heinrich Fischer über die Erdkunde an den Lehranstalten für weibliche Jugend und betonte die Wichtigkeit, der künftigen Mutter Vaterlandsliebe durch Kenntnis des Landes zu übermitteln. Bitterling empfahl als vorzüglichstes Mittel geographischen Unterrichts das Wandern mit den Schülern; er fand allgemeine Zustimmung, daß die moderne Wanderbewegung der Schüler auch von seiten der Geographie zu begrüßen und zu unterstützen sei.

Man würde ein unvollständiges Bild des Verlaufes der Tagung geben, wollte man nicht der freudigen Aufnahme gedenken, die wir in Straßburg erhielten, die sich äußerte in wohldurchdachten Reden, die oft rein wissenschaftlichen Vorträgen Konkurrenz machten, und in den Veranstaltungen der Stadt. Endlich sei des jugendfrischen Vorsitzenden des Geographentages, Hermann Wagners, gedacht, dessen Festrede über die Zyklen der Geographie in den letzten hundert Jahren ein seltenes Beispiel feinsinniger Redegewandtheit war.

W. Behrmann.

Wechsel im Generalsekretariate der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien. Der Generalsekretär der k. k. Geographischen Gesellschaft, Regierungsrat Dr. Ernst Gallina, der sein Amt seit mehr als 20 Jahren führte, hat dasselbe nunmehr niedergelegt. In Anerkennung der langjährigen und verdienstvollen Geschäftsführung wurde der scheidende Generalsekretär zum Ehrenmitglied der k. k. Geographischen Gesellschaft ernannt. An Stelle des Herrn Regierungsrates Gallina wurde das Ausschußmitglied Dr. Hermann Leiter zum Generalsekretär gewählt.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.

Amdrup G.: Report on the Danmark Expedition to the north-east coast of Greenland 1906—1908. (Særtryk af „Meddelelser om Grønland“ XLI.) København 1913. 8°. 270 S. Mit 4 Porträts, 5 Tafeln u. 5 Karten.

Das tragische Schicksal des Leiters der Danmark-Expedition, Mylius-Erichsen, der nach erreichtem Ziel auf dem Rückwege mit zwei Begleitern im Eise umkam, erinnert in vielen Einzelheiten an den Untergang der Südpolabteilung unter Kapitän Scott. Über die Ergebnisse der Expedition ist in dieser Zeitschrift (1906, Seite 508, und 1908, S. 490—491) bereits berichtet worden. Bald nach der Rückkehr der Überlebenden hat zudem A. Friis eine populäre Darstellung des äußeren Verlaufs gegeben, die gleichfalls in dieser Zeitschrift (1910, S. 624—625) besprochen worden ist.

Das vorliegende Werk nun bietet zunächst eine historische Übersicht über die früheren Reisen nach der Ostküste Grönlands, dann folgt eine ausführliche aktenmäßige Darstellung der Vorgeschichte, der Ausrüstung, sowie der Ausreise der Expedition nebst Auszug aus dem Logbuch auf der Fahrt von Jan Mayen bis zur grönländischen Küste. Den Hauptteil des Buches aber machen die wortgetreuen Übersetzungen der Tagebücher aus, die auf den einzelnen Schlittenreisen von den verschiedenen Teilnehmern geführt worden sind. Ein besonderes Interesse verdient natürlich das Tagebuch des Grönländers Brönlund, das bei der Leiche gefunden wurde. Da es auch Mikkelson später nicht gelang, die Tagebücher von Mylius-Erichsen und Höeg-Hansen zu finden, so sind die Brönlund'schen Aufzeichnungen die einzigen Nachrichten, die wir von dem Todesmarsch der drei Reisenden besitzen. Die letzte Seite aus dem Notizbuch ist deshalb in Faksimile wiedergegeben. Die Porträts der Umgekommenen, eine Übersichts- und mehrere Spezialkarten sind dem verdienstlichen Werke, dessen Hauptwert in seiner dokumentarischen Bedeutung besteht, beigegeben. *O. Baschin.*

B a e d e k e r, Karl: I n d i e n. Ein Handbuch für Reisende. Mit 22 Karten, 33 Plänen und 8 Grundrissen. Leipzig, Karl Baedeker, 1914. 358 S. 8°.

Der Weltreisende wird die Herausgabe dieses neuen Baedekers lebhaft begrüßen, ein jeder, der Gelegenheit hatte, eine größere Reise durch Indien zu machen, wird den Mangel eines solchen recht empfunden haben: die bisher erschienenen Reisehandbücher konnten in dieser Beziehung nicht völlig genügen. Es kamen hierfür nur zwei Werke in Betracht, nämlich: Meyers Weltreiseführer und Murrays Handbook for travellers in India, Burma and Ceylon. Ersteres mußte sich als Reisehandbuch, das einen großen Teil der Welt umfaßt, in den Einzelheiten stark beschränken, der Umfang des letzteren ist umgekehrt für den gewöhnlichen Reisenden zu groß. Der „Murray“ ist vielmehr ein nützliches Handbuch für den europäischen Ansiedler in Indien, insbesondere für den englischen Beamten, Offizier, Ingenieur, Kaufmann usw.

Im Gegensatz hierzu treten nun die Vorteile des Baedekers recht in die Erscheinung. Es ist nämlich gerade der subjektive Standpunkt des Durchschnittsreisenden, auf den sich alle Reisehandbücher Baedekers kritisch stellen und dem sie ihre große Popularität verdanken. Baedeker weiß, was das große Reisepublikum sehen will und welche Bedürfnisse es hat und gibt ihm auf Grund bester eigener Information übersichtliche Auskunft.

Der Band umfaßt Indien im weiteren Sinne: außer Vorder-Indien, das den größten Teil des Werkes einnimmt, werden Ceylon, Birma, die malayische Halbinsel, Siam und Java behandelt. Eine große Anzahl nütz-

licher Karten und Pläne in der bekannten klaren Darstellung, eigens für den Band gezeichnet, erleichtern dem Reisenden die Orientierung; die beiden Übersichtskarten von Vorder- und Hinter-Indien im Maßstab 1 : 10 000 000 sind dem Handatlas von Wagner und Debes entnommen. Die praktischen Vorbemerkungen sind für eine derartige Reise von besonderem Wert und die darin enthaltenen Angaben und Ratschläge sind außerordentlich klar und zeugen von großer Reiseerfahrung der Verfasser, von denen Dr. A. Faller und der frühere Sekretär beim deutschen Konsulat in Bombay W. v. Köppen genannt seien. Von letzterem stammt auch ein kleiner Abschnitt „Etwas Hindustani zum Reisegebrauch“ mit einem Wörterverzeichnis, das im Gegensatz zu den englischen Sprachführern eine wirklich praktische Auswahl des Nötigen aufweist; um den Klang des gesprochenen Wortes zum Ausdruck zu bringen, ist hierbei die Schreibung nach deutschen Grundsätzen angewandt; es ist dies sehr angenehm, da man ja aus der englischen Form die Aussprache nicht entnehmen kann. So könnte z. B. der Engländer das Wort hathi = der Elefant ebensogut häthei aussprechen, während unsere deutsche Schreibart keinen Zweifel über die Aussprache läßt. Überhaupt hat Baedeker in dem ganzen Buch nach diesem Prinzip die nützliche Angabe durchgeführt, wie die Ortsnamen auszusprechen sind, deren englische, vornehmlich dem Imperial Gazetteer of India entnommene Schreibung sonst beibehalten ist.

Das Kapitel „Zur indischen Volkskunde, Kultur und Kunstgeschichte“ ist von Prof. Dr. Richard Garbe, der es verstanden hat, das umfangreiche Material eines solchen Themas trotz des beschränkten Raumes in übersichtlicher und leicht verständlicher Art darzustellen. In richtiger Würdigung der ungeheuren Bedeutung der Religion für das indische Volksleben, hat der Verfasser die Entwicklung der verschiedenen Religionen besonders ausführlich behandelt und vor allem der brahmanischen Philosophie und ihrer Entstehung aus der vedischen Religion eine eingehende Abhandlung gewidmet. Bei der Besprechung der Plastik ist Verfasser vielleicht etwas hart in Beurteilung der brahmanischen Kunst und berücksichtigt nicht die Ideen jener Forscher, die wie E. B. Havell indische Kunst nicht nach unseren engen, aus griechischen Vorbildern allein abgeleiteten Schönheitsbegriffen gewertet wissen wollen. Eine kurze Geschichte der Baukunst beschließt das interessante Kapitel.

Ich vermisse nun hinter diesem Abschnitt ein Kapitel über die Geschichte Indiens. Es folgt nämlich nun erst die Beschreibung der Seefahrt aus Europa nach Indien und die Abhandlung über Ceylon, und dann finden sich in dem Abschnitt über Vorder-Indien nur einige wenige Andeutungen über die Geschichte, die auf knapp zwei Seiten zusammengedrängt sind und so versteckt stehen, daß man sie erst nach längerem Suchen finden kann. Nun wird ja in dem beschreibenden Text die lokale Geschichte der einzelnen Orte behandelt, es fehlt aber die allgemeine Übersicht, die doch um so nötiger erscheint, als indische Geschichte auch dem gebildeten Laien ferner liegt. Eine tabellarische Anordnung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse wäre hier am Platze, etwa in der klaren Form, wie wir sie in Baedekers Ägypten finden. Auch über die Verwaltung und die Herrschaft der Engländer wird etwas zu wenig gesagt. Selbst bei nur flüchtigem Besuch Indiens kommt der Reisende in Berührung mit englischen Verwal-

tungsbeamten und Offizieren und wird durch die Unterhaltung mit ihnen angeregt, den großen Problemen des modernen Indiens Interesse zu schenken. Eine kritische Besprechung der heutigen Herrschaftsstellung der Engländer würde auch viel falsches Urteil, das in Deutschland im Publikum verbreitet ist, beseitigen. Prof. Dr. Georg Wegener, dessen Manuskript die Grundlage für das vorliegende Buch bildet, hat ja in seinem Vortrage über „Das heutige Indien“ (veröffentlicht diese Zeitschrift 1911, S. 521 ff.) die schwierigen Regierungsfragen klar erörtert und von den Beziehungen Englands zu seinem wertvollsten Kronland, insbesondere von den Ursachen der gegenwärtigen Unruhen ein deutliches Bild gegeben.

Über die Geographie und Geologie der einzelnen Länder wird im Anfang jedes Abschnitts eine gute Übersicht gegeben, ebenso über die Pflanzen- und Tierwelt, Bevölkerung usw. Was nun den Text der eigentlichen Reisebeschreibung anbetrifft, so möge als Lob nur die Behauptung dienen, daß sich hierin der neue Baedeker seinen Vorgängern würdig anreihet. Der Reisende findet in bester Anordnung sowohl alle Angaben über die praktischen Bedürfnisse in bezug auf Unterkunft, Verpflegung, Verkehrsmittel, Zeiteinteilung usw., als auch die Beschreibung der Sehenswürdigkeiten in der allen Baedekern gemeinsamen glücklichen Form. Das Material ist größtenteils von Prof. Dr. G. Wegener auf seinen wiederholten Reisen, die teilweise besonders für die Zwecke des Buches unternommen waren, gesammelt, die Auskünfte der deutschen Konsuln und anderer im Lande ansässigen Herren haben das Werk vervollständigt; soweit ich aus einer viermonatlichen Reise, welche die Hauptstätten Nord-Indiens berührte, aus eigener Erfahrung urteilen kann, sind die Angaben mit außerordentlicher Genauigkeit gemacht, für die Vorzüglichkeit der geschichtlichen und kulturhistorischen Darstellungen bürgen die Namen der genannten Verfasser. Da es offizielle Kataloge für die Museen in Kalkutta, Lahore, Muttra usw. noch nicht gibt, sind die Beschreibungen der nordindischen Altertümer, die von Dr. J. Ph. Vogel von der Archaeological Survey of India stammen, besonders schätzenswert.

Der erste Abschnitt der Reisebeschreibung behandelt Ceylon, das von den meisten deutschen Reisenden, die wohl vorwiegend den Norddeutschen Lloyd benutzen, auf der Fahrt nach Indien in Colombo zuerst berührt wird. Die wunderbare tropische Natur, das schöne Klima von Kandy, das farbenbunte Treiben der Singhalesen, die mächtigen Ruinen von Anuradhapura und der Besuch des Adamspicks haben Ceylon zu einem begehrten Touristenziel gemacht, zumal da sich alles per Automobil leicht erreichen läßt. Der zweite Abschnitt über Vorder-Indien nimmt naturgemäß den Hauptteil des Buches in Anspruch. In 31 Routen wird das ganze Land in allen Himmelsrichtungen von dem Führer durchquert. In Süd-Indien sind es die Bauwerke dravidischer Kunst in Tanjore, Madura, Mahavellipur u. a., weiter nördlich die buddhistischen Felsentempel von Karli und Ellora, dann in Ahmedabad und den berühmten Städten des Jumna-Stromes Delhi und Agra, die unvergleichlichen Bauwerke der Mohammedaner, die das künstlerische Interesse des Reisenden beherrschen. Die großen Wallfahrtsorte Benares und Puri geben einen Einblick in das Pilgerleben der Hindus, Bombay und Kalkutta sind Zeugen des mächtigen englischen Welthandels, die Ausflüge nach Darjeeling und Simla führen

den Touristen in die großartigste Gebirgswelt der Erde, der Besuch des Khaibarpasses von Peshawar aus zeigt dem Reisenden die Stelle, wo alle Eroberer Indiens von je eingedrungen sind. Da der Reisende einen Besuch Birmas häufig mit einer Reise durch Vorder-Indien verbinden wird, ist die Aufnahme der Beschreibung dieses Landes in dem Buch gerechtfertigt. Die ausführlich beschriebene, über 1600 km lange Dampferfahrt auf dem Irrawaddy von Rangoon über Mandalay bis nach Bhamo dürfte für den Touristen nächst der Nilfahrt eine der interessantesten und gleichzeitig bequemsten Reisen in der Welt sein. Zwei weitere Abschnitte behandeln die malayische Halbinsel und Siam: in ersterem wird die Eisenbahnfahrt von Penang nach Singapur, in letzterem hauptsächlich Bangkok beschrieben. Ein größerer Abschnitt ist endlich zum Schluß einer Reise durch Java gewidmet. Hier sind es neben der Besichtigung des Boroboedoe, des großartigsten buddhistischen Heiligtums der Insel, vor allem die Ausflüge in das vulkanische Gebirge, die für den Touristen großen Reiz bieten.

Einige Angaben über die malayische Sprache für den Gebrauch des Reisenden beschließen das Buch. Eine Herausgabe dieses Baedekers in englischer Sprache dürfte sich wohl für den Verfasser empfehlen.

Georg Schickendantz.

Bensaude, Joaquim: L'Astronomie nautique au Portugal à l'époque des grandes découvertes. Bern, Max Drechsel, 1912. 8°. 290 S., 12 Fig.

Das Dunkel, das bis jetzt immer noch über der zweifellos im Zeitalter der Entdeckungen sehr aufgeblühten nautischen Astronomie in Portugal lagerte, aufgehellt zu haben, ist ein unbestreitbares Verdienst des Autors, der dieser wichtigen Frage eine sehr gründliche Abhandlung von nahezu 300 Druckseiten widmet.

Bensaude findet als wahren Grund für unsere nur sehr dürftigen Kenntnisse über die Entwicklung der portugiesischen Nautik ein unverkennbares Bestreben möglicher Verheimlichung aller wissenschaftlichen Errungenschaften in Portugal im Hinblick auf den Wettbewerb mit Spanien. Es ist dem Autor gelungen, zwei Ausgaben des „Regimento do astrolabio e do quadrante“, die eine in der Bibliothek zu Evora, einer einstigen portugiesischen Universitätsstadt, die andere in der Kgl. Bibliothek zu München zu entdecken, aus denen er, wie auch aus dem einzigen vorhandenen in letzter Bibliothek gefundenen Exemplar „Regimento do estrolabio et Tractado da Spera do Mundo“, — welches er veröffentlichten wird in der Sammlung „Seltenheiten aus süddeutschen Bibliotheken“ — reichlich zu schöpfen. Auf einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Nautik in Portugal bis zum Ende des 15. Jahrhunderts und der Berufung Behaim's in portugiesische Dienste folgt eine Analyse der Münchener Ausgabe, sowie eines ihr angehefteten Briefes von Dr. Moneta'rius (Hieronymus Müller aus Nürnberg), in dem ein Reiseplan Behaim's besprochen ist. Für nähere Details möchten wir auf das Buch selbst und den sehr wertvollen Appendix: „Résumé chronologique des découvertes“ (pag. 276—287) verweisen.

C. Schoy.

Deckert, Emil: Nordamerika. Dritte, neubearb. Aufl. 86 Abbild. im Texte, 13 Kartenbeilagen, 27 schwarze Doppeltafeln und 10 Tafeln in Farbendruck. Leipzig, Bibliographisches Institut 1913. XII u. 612 S. gr. 8°.

Man konnte auf diese Neuauflage gespannt sein; denn in den fast zehn Jahren, die seit der zweiten verstrichen sind, hat sich unser Verhältnis zu Nordamerika ganz gewaltig verschoben, ist, was uns hier am meisten angeht, die amerikanische Geographie, von ihrem vornehmsten Vertreter sogar ein Semester lang an der Berliner Universität persönlich vertreten, mit manchem greifbaren Erfolge in unser wissenschaftliches Leben eingedrungen. Andererseits ist Deckert ein zu erfahrener alter Amerikakenner und sein Buch in der Gestalt der beiden ersten Auflagen behauptet einen so sicheren Platz, daß es doch wohl nicht ausgemacht erscheinen konnte, ob wir nun bei dieser 3. Auflage Nord-Amerika in nordamerikanischer Auffassung, sagen wir richtiger in Davisscher Methode dargelegt finden würden. Tatsächlich hat sich Deckert auch dazu entschlossen, „von mancherlei Wind der Lehre“ abzusehen und sein Werk das bleiben zu lassen, was es zur Freude seiner vielen Leser bisher gewesen ist. Das soll keine einseitige Absage gegen den großen Anreger von drüben bedeuten, aber das ungeschmälerte Recht zur alten länderkundlichen Darstellungsform betonen, nach der bisher uns die fremden Weiten Nordamerikas von Deckert nahegebracht worden waren. Daneben überhebt die Tatsache, daß der alte Charakter des Buches ungeschmälert fortbesteht, uns der Aufgabe, auf das ja wohlbekanntes einzugehen. Nur die durch die Zeit gebotenen Erneuerungen am Zahlenmaterial, die Zusätze und Veränderungen, die sich, wie der Verfasser es auch hervorhebt, besonders in der nördlichen Hälfte des Weltteils infolge gründlicherer Erforschung nötig zeigten, haben das Buch leise umgestaltet, doch auch sie zurücktretend neben dem bewährten festgehaltenen Bau des Ganzen. Mehr als diese, im einzelnen natürlich zahlreiche Änderungen fallen die starken technischen und, bei den Kartenbeilagen auch inhaltlichen, Besserungen auf, die der illustrative Teil des Werkes gewonnen hat.

H. Fischer.

Hartmann, Martin: Reisebriefe aus Syrien. Berlin, D. Reimer, 1913. 8°. 123 S.

Der als Professor am Orientalischen Seminar zu Berlin als einer der besten Kenner der Arabischen Sprache, Syriens und des Islam wohlbekannte Verfasser hat eine Ferienreise von März bis April 1913 benutzt, um die seit der türkischen Revolution in lebhaften Fluß gekommene syrisch-arabische Frage an Ort und Stelle zu studieren und in den wichtigsten Städten Syriens: Beirut, Haifa, Damaskus, Homs, Hama, Aleppo, Tripolis, Lattakije persönlich unter Fühlungnahme mit der einheimischen Bevölkerung Erkundungen einzuziehen. Die Ergebnisse bringt er in Form zehn interessanter Reisebriefe, die ursprünglich in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht waren und beherzigenswerte Mahnungen an das deutsche Publikum, Reichsregierung wie Volk, enthalten.

Vorderasien ist in einer geistigen Bewegung, die sich nicht mehr aufhalten läßt. Es handelt sich darum, sie zu leiten oder an ihrer Leitung teilzunehmen. Syrien, nach dem Verfasser gegenwärtig das fortgeschrittenste Gebiet der arabischen Welt, erwacht zu neuem Leben auf geistigem, wirt-

schaftlichem und politischem Gebiet. Im Vordergrund des Interesses stehen jetzt nationale Reformen, die auf Dezentralisation oder Schwächung des türkischen Regiments, Einrichtung von Provinzialregierungen sowie Anstellung Fremder als Beiräte und Inspektoren für einzelne Verwaltungszweige wie Finanzen, Post, Polizei hinzielen (Beiruter Reformprogramm).

Deutschland, das im Gegensatz zu den Mächten des Dreiverbandes einzig wirtschaftlich und kulturell interessiert ist, sollte allen diesen Bewegungen seine volle Aufmerksamkeit widmen. Insbesondere erwächst uns die Pflicht, darüber zu wachen, daß keiner anderen Nation ein politisches, wirtschaftliches oder kulturelles Übergewicht in den türkischen Provinzen zufällt, unserer Reichsregierung reichliche Mittel zu gewähren zur Förderung des ganzen Schulwesens, damit die Kenntnis der deutschen Sprache, Kultur und Industrie sich stärker als bisher verbreite, und die im Lande ansässigen oder tätigen deutschen Ackerbaukolonien, die Geschäftswelt sowie auch die unter deutschem Schutz stehenden Anstalten, Missionen und Personen wirksam zu unterstützen. Von den vielen Einzelvorschlägen des Verfassers seien hervorgehoben: Schaffung einer besonderen Abteilung für das auswärtige Schulwesen im Auswärtigen Amt, Gründung einer deutschen Hochschule für Handel und Technik in der asiatischen Türkei, einer landwirtschaftlichen Hochschule in Aleppo, Überziehen von ganz Syrien mit einem Netz von deutschen Schulen, z. B. auch in dem noch ganz unberührten westlichen Nusaisiergebirge, in Lattakije usw., Heranbildung eines Stabes von arabischen Volksschullehrern an einem Lehrerseminar, Gründung oder Unterstützung einer arabisch geschriebenen Zeitung oder Wochenschrift in Beirut, die der Bevölkerung das geistige und wirtschaftliche Leben Deutschlands regelmäßig vermittelt, Darstellung der deutschen Verhältnisse in leicht lesbaren, arabisch geschriebenen billigen Broschüren, Überwachung des unter deutschem Schutz gestellten neuen Jüdischen Instituts für technische Erziehung in Haifa, daß es den deutschsprachlichen Unterricht in allen Fächern des Technikums beibehält, Gründung einer deutschen Stelle für Bankgeschäfte in Lattakije usw.

So bietet Hartmann im ganzen ein Programm für Deutschlands Kulturarbeit in Syrien und weist den Weg für unsere Mitarbeit bei der Einführung des osmanischen Reiches in das System der Kulturstaaten.

M. Blanckenhorn.

Herzog, Th.: „Vom Urwald zu den Gletschern der Cordillere“. Zwei Forschungsreisen in Bolivia. Stuttgart, Strecker & Schröder, 1914. 8°, XII, 270 S., 1 Taf.

Der Verfasser hat Bolivien auf zwei selten betretenen Wegen erreicht, einmal längs des Nordsaums des Gran Chaco vom Osten, das andere Mal seitens dessen Westsaums von den argentinischen Nordprovinzen aus. Ausflüge zu den halbwilden Indianerstämmen am Pilcomayo, zu den gezähmten Guarayos, in die Urwälder an den oberen Zuflüssen des Madeira, und in die Vorketten der Cordillere bei Santa Cruz de la Sierra bilden den ersten Teil des Werkes. Der zweite Teil enthält die Erforschung von Strecken der hohen Ostcordillere, zunächst in der Umgebung von Cochabamba, sodann eine gründliche Durchreisung der südöstlich von La Paz belegenen Sierra de Quimsacruz, deren Hochgipfel an 6000 m erreichen.

Wenngleich der Verfasser die wissenschaftlichen Ergebnisse Fachzeitschriften vorbehält, so bietet das Buch doch dem Geographen wie dem Botaniker eine Fülle von Stoff. Die Schilderung ist so anziehend und die zahlreichen Bilder nach eigenen Aufnahmen sind so künstlerisch schön, daß das Werk jeden Freund der Natur befriedigen muß. Es kann sich im Tiefland neben die klassischen Werke von v. d. Steinen und im Hochgebirge neben Hans Meyers Schilderung der Bergwelt von Ecuador stellen.

Freiherr v. Thielmann.

Scott Keltie, J. and Howarth, O. J. R.: History of Geography. London, Watts & Co., 1913. 8°. VII u. 154 S. Mit 17 Text-Illustrationen.

Auf so geringem Raume eine vollständige Geschichte der Erdkunde zusammenzudrängen, ist keine leichte Aufgabe, doch ist diese ja auch in unserer Sprache bereits durch K. Kretschmer gelöst worden, und zwar, wie uns bedünken will, in noch erfolgreicherer Weise. Daß die Autoren hiervon nichts wissen oder doch nichts sagen, daß ihnen überhaupt von der Beschäftigung deutscher Schriftsteller mit diesem Spezialfache nichts bekannt zu sein scheint, wird kaum wunder nehmen können, wenn man an zahlreiche Präzedenzfälle denkt. Unsere obige Äußerung soll jedoch nicht etwa einen Tadel gegen das von Scott Keltie und Howarth verfaßte Büchlein enthalten, denn es entspricht im ganzen seinem Zweck sehr gut und wird sich unter den Briten, deren reiche geographische Literatur kein zusammenfassendes Werk dieser Art enthält, zweifellos einen großen Leserkreis erwerben.

Die Einteilung des Stoffes in vierzehn Kapitel vollzieht sich folgendermaßen: Anfänge; Die Geographie der Griechen und Römer; Das dunkle Zeitalter; Die mittelalterliche Renaissance; Portugiesische Ausbreitung und Wiederaufleben des Ptolemäus; Die Neue Welt; Der ferne Osten und die Entdeckung von Australien; Polartorschungen im 18. Jahrhundert (greift auch auf frühere Zeiten zurück); James Cook und seine Nachfolger (bis zu den russischen Weltumsegelungen des beginnenden neunzehnten Jahrhunderts); Messungen, Kartographie und Fortschritte der Theorie von 1500 bis 1800; Das vorige Jahrhundert und die Erschließung Afrikas; Das vorige Jahrhundert und die Erschließung Asiens und Australiens; Das vorige Jahrhundert und die Polargegenden; Das vorige Jahrhundert, Entwicklung und Ausbildung der Erdkunde als Wissenschaft. Wenn vom vergangenen Jahrhundert die Rede ist, werden immer noch die Worte „and after“ beigefügt; d. h. es setzt sich die Erzählung bis zur Gegenwart fort, indem z. B. auch die Expeditionen von R. F. Scott, Amundsen usw. berücksichtigt werden. Eine „kurze Bibliographie“ und ein Sach- und Namenindex bilden den Schluß. Als eine hübsche Beigabe wird man die Abbildungen von älteren Karten und von Meßapparaten anzuerkennen haben, welche für gewisse Epochen des geschichtlichen Herganges bezeichnend sind.

Die Auswahl der Materien und die historischen Angaben selbst entsprechen in der Hauptsache den von der Gegenwart zu stellenden Anforderungen. Daß ein deutscher Leser, dem die behandelten Dinge nicht eben fremd sind, gelegentlich einen anderen Standpunkt einnimmt, ist nur natürlich, aber an dieser Stelle kann schon des Raumes wegen auf nähere Auseinandersetzungen nicht eingegangen werden. Nur eines einzigen

Punktes wollen wir Erwähnung tun; das ist unsererseits zwar auch an anderen Orten schon geschehen, aber angesichts der Schwierigkeit, gewissen Vorurteilen zu begegnen, erachten wir es für eine Pflicht, mehrfach Gesagtes zu wiederholen. Gegen Behaim wird, merkwürdigerweise ohne den Gewährsmann Ravenstein zu nennen, der Vorwurf gerichtet, er habe doch wohl unberechtigt sich als Teilnehmer an Diogo Caõs Fahrt zum Kongo hingestellt, und sein Globus beweise, daß er ganz in ptolemäischen Vorstellungen befangen gewesen sei und nichts von der wirklichen Gestalt der westafrikanischen Küste gewußt habe. Nun ist authentisch festgestellt (vgl. des Referenten Schrift „Martin Behaim“, Bamberg 1890), daß der jetzt so gerne Angegriffene 1491 lediglich in Erbschaftsangelegenheiten seine Vaterstadt Nürnberg wieder aufgesucht hat; kann man da im Ernste glauben, er habe seine Papiere von der Reise her bei sich gehabt, die er doch nach bestehendem Brauche gleich nach der Rückkehr an das Lissaboner Archiv abliefern mußte? In der Heimat stand ihm als einziges Hilfsmittel bei der Konstruktion des „Erdapfels“ eine Ptolemäus-Übersetzung zu Gebote, und da will man sich wundern, daß er sich dieser Quelle bediente!

S. Günther.

Kayser, Em.: Lehrbuch der geologischen Formationskunde (Lehrbuch d. Geologie II). Fünfte Auflage. Stuttgart, Ferd. Enke, 1913. 8°. VIII, 852 S.

Auf über 800 Seiten wird hier die historische Geologie dargestellt und, bei der erfreulich raschen Folge von Auflagen, damit ein Hilfsmittel geboten, für das der Geograph, der in der geologisch-paläontologischen Literatur naturgemäß nicht zu Hause sein kann, besonders dankbar sein muß. Die reichen Literaturangaben unterstützen das weitere Eindringen aufs Beste. Noch stärkere Berücksichtigung des Auslandes und häufigere Mächtigkeitsangaben wären von unserem Standpunkt aus für neue Auflagen vielleicht zu wünschen.

G. Braun.

Philippon, A.: Das Mittelmeergebiet. Dritte Auflage. Leipzig, B. G. Teubner, 1914. 8°, IX, 256 S., 15 Tf.

Auch dieses Buch ist in seinen beiden Auflagen bereits so rühmlich bekannt geworden, daß hier nicht viel zu sagen übrig bleibt. Die sorgsam durchdachte Anlage hat keine Änderung erfahren. Es sind die Literaturangaben vermehrt worden, doch bleibt darin immer noch viel zu wünschen übrig und eine Vermehrung dieser kritisch gesichteten und kommentierten Angaben würde den Wert des Buches beim Gebrauch in Vorlesungen usw. noch sehr erhöhen. Text und Begleitkarten sind durchgehends auf den neuesten Stand der Forschung gebracht worden.

G. Braun.

Speiser, Felix: Südsee, Urwald, Kannibalen. — Reise-Eindrücke aus den Neuen Hebriden. Leipzig, R. Voigtländer, 1913. 8°. V u. 308 S. 192 Abbild. u. 2 Karten.

Die deutsche Literatur ist nicht reich an lebenswahren, frischen und gleichzeitig stimmungsvollen Schilderungen der entlegenen Südsee-Inseln und ihrer Bewohner. Um so dankbarer wird man dem Verfasser für das

Buch sein müssen, das diesem Mangel ganz entschieden abhilft. Lose aneinandergereihte Skizzen, die während der Reise niedergeschrieben wurden, sind hier zu einem Ganzen vereint; und in so vollendeter Weise, daß der Zweck des Buches, den Leser „etwas von der Atmosphäre der Südseeinseln verspüren zu lassen, ihm ein Sehnen nach diesen Gefilden der Seligen zu erwecken“ vollauf erreicht wird. Immer wieder nimmt man gern dies Buch in die Hand, das dem tüchtig beobachtenden, richtig sehenden und vorurteilslosen Forscher eine große Liebe zur Natur und eine nicht geringere Freundschaft und ein Verstehenwollen der Eingeborenen und ihres so vielgestaltigen Innen- und Außenlebens niederschreiben hieß. Obschon sich das Buch an das große Publikum wendet, ist es doch von allergrößtem Wert für den Wissenschaftler, in erster Linie für den Ethnologen, der eine Fülle neuer unbekannter Dinge aus ihm entnehmen kann, dann auch für den Geographen, der dem Verfasser für die Schilderung der Landschaften danken wird, vor allem der großen Vulkane der Neuen Hebriden, die auf Ambrym im vorigen und in diesem Jahre so gewaltige, umbildende Verheerungen anrichteten. Einzelheiten möchte ich nicht herausgreifen, sondern jedem, ob Gelehrter oder Laie, das Studium oder die Lektüre des Speiserschen Buches angelegentlichst empfehlen. Er wird eine große, stille Freude an ihm haben. Ein reicher, sorgfältig ausgewählter, charakteristischer, wissenschaftlich höchst beachtenswerter Bilderschmuck nach den Aufnahmen des Verfassers fördert das Verständnis und läßt den Leser sich in die Umwelt des Gelesenen einleben. Möge das Buch bald eine Neuauflage erleben, aber dann unter einem anderen Titel, denn der jetzige wird ihm wenig gerecht!

P. Hambruch.

Spethmann, Dr. Hans: Studien zur Ozeanographie der südwestlichen Ostsee I. (Aus „Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie“. Ergänzungsheft zu Band V. (1913). 8°. IV u. 108 S.

In der vorliegenden Abhandlung hat der Verfasser als Einleitung eine morphologische Übersicht über das Relief der Beltsee mit spezieller Berücksichtigung der Länge, der Tiefe und des Querschnittes der Durchlaufprofile an den verschiedenen Schwellen gegeben.

Als Resultat der Behandlung des hydrographischen Beobachtungsmaterials ist zu erwähnen der gefundene Zusammenhang zwischen Sturm und Strom an den dänischen Leuchtschiffen Schultz Grund, Lappegrunden, Drogden und Gjedser Rev. Diese Ergebnisse in Verbindung mit den aus den Beobachtungen von den erwähnten Leuchtschiffen berechneten Mittelwerten für Auslauf und Einlauf des Wassers und für den Salzgehalt in den verschiedenen Tiefen geben ein Gesamtbild der Bewegungsverhältnisse des Wassers in der Beltsee.

Wie der Verfasser anführt, ist es zu bedauern, daß die deutschen Beobachtungen vom Feuerschiffe Fehmarnbelt nicht ein mit den Beobachtungen von den dänischen Leuchtschiffen vergleichbares Material darbieten. Für das Klarlegen der hydrographischen Verhältnisse der südwestlichen Ostsee sind Strombeobachtungen in Verbindung mit Salz- und Temperaturbestimmungen von diesem Feuerschiffe von besonderer Wichtigkeit.

In dem letzten Abschnitte der Abhandlung werden die periodischen Schwankungen des Salzgehalts diskutiert, wozu außer den Beobachtungen von den Feuerschiffen auch die durch die internationale Meeresforschung sowohl von deutscher als von dänischer Seite gewonnenen Resultate herangezogen werden. Die Anschauung, daß die Herbstanschwellung des atlantischen Wassers im Winter sich in der Arkonasee durch eine Erhöhung des Salzgehalts bemerkbar macht, wird hier vertreten. Es ist doch hierzu zu bemerken, daß gemeinschaftliche Ursachen für die Schwankungen des Salzgehalts in Skagerak, Kattegat und Ostsee wohl zugegen sind, daß sie aber, von verwickelter Natur, nur im geringen Maßstabe in den ozeanographischen Verhältnissen außerhalb des Skageraks zu suchen sind.

Am Schlusse seiner Abhandlung hat der Verfasser die Aufmerksamkeit auf eine Erweiterung des Beobachtungsmaterials hingeleitet und u. a. Messungen von Niederschlag und Verdunstung, hydrographische Messungen in der Nachbarschaft der Feuerschiffe, um festzustellen, in welchem Maßstabe die Messungen von den Feuerschiffen die hydrographischen Verhältnisse repräsentieren, sowie erweiterte hydrographische Beobachtungen vom Feuerschiffe Fehmarnbelt vorgeschlagen.

J. P. Jacobsen.

Das Arbeitsgebiet des Kaiserlichen Statistischen Amtes. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 201. Berlin. Puttkammer und Mühlbrecht, 1913. 4°. VIII, 656 S.

Jeder, der sich mit der Verarbeitung statistischen Quellenmaterials beschäftigt hat, kennt die zahlreichen Klippen, die hier drohen, und wird das jüngst gesprochene Wort nur zu berechtigt finden, daß die Statistik keine Dirne sei, die sich jedermann an den Hals werfe, sondern vielmehr eine vornehme Dame, die nicht jeder zu behandeln verstehe. Das Kaiserliche Statistische Amt hat sich ein großes Verdienst erworben, daß es den vorliegenden stattlichen Band als eine Art Leitfaden zur Benutzung der sämtlichen von ihm herausgegebenen Publikationen veröffentlicht hat. Die Entstehung der einzelnen Statistiken wird angegeben, man findet die Gesetze mit ihren Ausführungsbestimmungen und Dienstvorschriften, Anmeldescheine mit Beispielen sind abgedruckt, die verschiedenen Bezeichnungen in den Überschriften werden interpretiert usw. Besonders wertvoll ist, daß man hier in extenso verfolgen kann, welche Veränderungen die Grundlagen der statistischen Aufnahmen, die einen direkten Vergleich erschweren, im Laufe der Zeit erfahren haben. Hinter jedem Abschnitt findet man eine übersichtliche Zusammenstellung der regelmäßigen und sonstigen auf die betreffende Statistik bezüglichen Veröffentlichungen des Amtes; da die Bände bekanntlich fortlaufend durchnummeriert werden, ist es nämlich oftmals nicht leicht, eine gesuchte Angabe aufzufinden, und auch auf manche wertvolle Untersuchung wird so wieder die Aufmerksamkeit gelenkt. Es hätte sich vielleicht empfohlen, eine Teilung vorzunehmen, da das Ganze 656 Seiten des großen Formats der „Statistik des Deutschen Reiches“ umfaßt und z. B. die Sozialstatistik allein etwa ein Drittel des Bandes einnimmt.

A. Rühl.

Handbuch der geographischen Wissenschaft. Herausgegeben von Oskar Kende. Teil 1. 370 S. 8°. Berlin, Vossische Buchhandlung 1914.

An guten Lehrbüchern, die in nicht allzu großem Umfange das Gesamtgebiet der Geographie in einer für Studierende geeigneten Form darstellen, haben wir ganz sicherlich Mangel. Ihm abzuhelfen, war der Wille des Herausgebers des oben genannten Handbuches, der den Stoff an eine große Anzahl von Mitarbeitern verteilte, während er selbst in diesem Bande für Titel, Vorwort und Inhaltsverzeichnis verantwortlich zeichnete. Dem fertiggestellten ersten Bande, der die allgemeine Geographie umfaßt, soll in kurzem der zweite folgen, der dann die Länderkunde enthalten wird.

Sollen wir unser Urteil sogleich resümieren, so muß gesagt werden, daß das Erreichte hinter dem Wollen weit zurück geblieben ist, ja wir müssen bekennen, daß uns das Buch sowohl nach Anlage wie nach Inhalt verfehlt erscheint. War der Raum auf noch nicht 400 Seiten festgelegt, so hätte man die Grenzlinie wesentlich enger ziehen sollen, um die vielen Aufzählungen zu vermeiden und z. B. die Geschichte der Erdkunde, die Völkerkunde und manche umfangreichen Teile der übrigen Abschnitte fortlassen sollen, namentlich aber hätten die einzelnen Teile gewissenhafter gegeneinander abgewogen werden müssen: es geht nicht an, der Morphologie 100 Seiten zu gewähren, und die Ozeanographie, die Klimatologie und die Pflanzengeographie auf je 10 Seiten abzutun, und wenn es im Plane des Herausgebers lag, so hätten die Mitarbeiter protestieren oder streiken müssen. Ferner ist die Anlage so getroffen, daß fast die Hälfte des Textes in Anmerkungen verlegt ist, die die Beispiele oder den Nachweis im einzelnen bringen sollen. Dadurch beraubt man den eigentlichen Text alles Lebens und eine wirkliche Lektüre wird meistens unmöglich; daß das Buch gleichzeitig als Nachschlagewerk zu dienen bestimmt ist, kann keine Entschuldigung sein. Nur wenigen Abschnitten kann man schließlich den Vorwurf ersparen, daß nur der aus dem Buche etwas lernen wird, der die Gegenstände bereits kennt.

Am besten haben uns die Abschnitte von Tams über die endogene Dynamik, von Sölch über die Formen der Erdoberfläche und von Adamović über die Pflanzengeographie gefallen. Hier wird eine brauchbare Übersicht geboten und das Wesentliche ist vom unwesentlichen geschieden, was ja gerade für ein Lehrbuch von besonderer Bedeutung ist. Sölch hat für seinen Artikel den Löwenanteil des Raumes erhalten, aber hier auch etwas wirklich Brauchbares geschaffen. Ständen ihm auch gute Vorbilder zur Verfügung, so merkt man doch fast überall die selbständige Verarbeitung; eine Fülle von Literatur hat er herangezogen und hier wohl des Guten sogar zu viel getan; auch manch guter Terminus ist ihm geglückt. Das Kapitel hätte unseres Erachtens noch gewonnen, wenn die Hydrologie gesondert behandelt worden wäre.

Norbert Herz hat die mathematische Geographie übernommen und hier die Grenzen zu Ungunsten des geographisch Bedeutsamen sehr weit gesteckt, denn er betrachtet auch die Kometen, Planeten, den Mond, die physikalische Beschaffenheit der Himmelskörper und die geographische Ortsbestimmung muß sich dann mit zwei Seiten begnügen. Ebenso hätte die Zahl der Kartenprojektionen ohne Schaden eingeschränkt werden können, aber die ganze Lehre des Kartenzeichnens in noch nicht einer Seite zu erledigen, ist doch wohl ein Unding.

Friedrichs Bearbeitung der Wirtschaftsgeographie wird nach unserem Gefühl dieser Wissenschaft keine neuen Freunde unter den Studierenden und Lehrern werben. Er spannt den Rahmen bekanntlich sehr viel weiter, als es sonst üblich ist, doch läßt sich natürlich über eine solche Auffassung debattieren. Daß der Autor überall versucht hat, seine „Stufen“ aufzudecken, wird man begreiflich finden, weniger schon, daß er die Kapitel über die geistigen Betätigungen des Menschen mit einer Orientierung über die Tiere beginnt; leider fehlte es ihm aber an Raum, um die Stufenfolge dann im einzelnen nachzuweisen. Friedrich muß selbst zugeben, daß über vieles, was er bringt, noch kaum irgend etwas Wertbares vorliegt, und so beschränkt er sich denn auch häufig darauf, seinen Bericht aus dem „Geographischen Jahrbuch“ wörtlich abzudrucken. Was sollen uns unter diesen Umständen die Ausführungen über Entstehung und Zweck der Sprache, das Wesen der Religion, die Entstehung der Stände, die Rechts- und Kunstäußerungen des Menschen, das Verhältnis der Geschlechter zueinander? In einer Anmerkung wird gar über den Zweck der Vereinigung der Geschlechter gesprochen: darüber sucht im allgemeinen der Studierende der Geographie in seinem Lehrbuch keine Orientierung, und der Verfasser hätte besser getan, wenn er die Wirtschafts- und Siedlungsgeographie, die doch schon manche schönen Resultate aufzuweisen haben, weiter ausgebaut hätte und nicht, was namentlich von der Wirtschaftsgeographie gilt, bei einer Aufzählung stehen geblieben wäre. Eine auch nur einigermaßen befriedigende Erörterung jener Materien erfordert so profunde Kenntnisse auf so vielen Gebieten und jene Probleme müssen mit so zarten und feinnervigen Fingern berührt werden, daß die Behandlungsweise Friedrichs nicht im entferntesten genügen kann. Die Angaben im einzelnen sind, wie stets bei diesem Autor, zuverlässig.

Die schwerste Enttäuschung haben uns die beiden von Mecking bearbeiteten Abschnitte über Ozeanographie und Klimatologie bereitet, denn der schon im allgemeinen gerügte Mangel an Perspektive und Stilgefühl erreicht hier einen unerlaubten Grad, man sehe z. B. das Kapitel über die Wellen! Jedem Studierenden, der hieraus seine Kenntnisse schöpfen will, ist mit unfehlbarer Sicherheit das Schicksal des Schülers im Faust zu prophezeien. Der klimatologische Abschnitt ist noch besser geraten als der ozeanographische, wenn auch auf das Klima selbst so gut wie gar nicht eingegangen wird. Für einen Spezialisten konnte es doch keine allzu schwere Aufgabe sein, auf zehn Seiten die wichtigsten Tatsachen der Meereskunde in verständlicher Form darzustellen. Man vermißt die Scheidung des Wichtigen vom Unwichtigen, die geographische Seite ist ganz in den Hintergrund gedrängt, eine Unmenge von Dingen wird erwähnt, aber nicht näher erläutert, nur oftmals in Gänsefüßchen gesetzt. Gegenstände wie gegißtes und astronomisches Besteck, Windfläche, kapillare Wellen, freie und gezwungene Strömungen, die Eisschmelze als Ursache der Meeresströmungen, die Bora, die Namen der Wolkenformen, der Regenmesser sind ohne Erklärung doch nur Worte. Viele Zahlenangaben (z. B. über die Mittel- und Maximaltiefen der Ozeane, die größte beobachtete Wellenlänge von 824 m u. a.) werden in dem Leser irrige Vorstellungen von unseren Kenntnissen und Methoden erwecken. Auch Flüchtigkeiten laufen mehrfach unter (nicht nur an submarinen Vulkanen und Koralleninseln sind Böschungen

von 30—40° nachgewiesen worden; die Strömungen zeigen nach Ekman nicht allgemein in 150 m Tiefe eine Umkehr ihrer Richtung, sondern sind hierin vielmehr von der geographischen Breite abhängig). Während die übrigen Verfasser auch dem Fachmann mancherlei neues in der Auffassung und Anordnung des Stoffes oder an Tatsachen bieten, hat Mecking auf derartige Ambitionen verzichtet und auch seine Beispiele sind meist gute alte Bekannte; neu war uns allerdings das Vorkommen des Marrobbio an der marokkanischen Küste.

Die Korrektur des Gesamtwerkes ist nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erfolgt, denn die Zahl der Druckfehler ist über Gebühr groß, aber auch in dieser Hinsicht schießt Mecking den Vogel ab. Ich übergehe die gewöhnlichen Druckfehler. Wenn man liest: Shacleton, Messerschmidt, Secci, Forrel, Frech (soll „Forch“ heißen), Ferrell, Neumeyer, Nowara, Skagerrack, Dyssenterie, paralaktisch, Scirrocco, Benthon, bathylithologique, wenn in englischen Titeln konstant: geographie, physiographie, meteorologie geschrieben wird, — von den gewöhnlichen Druckfehlern zu schweigen, — so könnte ein Übelwollender leicht merkwürdige Rückschlüsse ziehen. Che vuoi di più? Mit wachsendem Erstaunen haben wir diese Abschnitte gelesen und sind erst nach reiflicher Überlegung zu diesem harten Urteil gelangt, es auszusprechen hat uns schmerzhaft Überwindung gekostet.

Wir sind nicht sonderlich begierig auf den zweiten Band.

A. Rühl.

EINGÄNGE FÜR DIE BIBLIOTHEK UND ANZEIGEN.

Bücher und Sonderabzüge:

Europa.

- Hellmann, G.:** Regenkarten der Provinz Westfalen sowie der Fürstentümer Waldeck, Schaumburg-Lippe, Lippe und des Kreises Grafschaft Schaumburg. (Ver. d. Kgl. Pr. Met. Inst.) Berlin 1914. 8°. 24 S., 2 Tf. (Behörde.)
- Lidén, Ragnar:** Geokronologiska Studier öfver det Finiglaciala Skedet i Ängermanland. (Sveriges Geol. Undersökn.) Stockholm 1913. 39 S., 7 Tf. 4°. (Behörde.)
- Metz, Friedrich:** Der Kraichgau. (Abhdl. z. bad. Landeskd., 4. H.) Karlsruhe 1914. VI, 127 S. 8°. (G. Braun.)
- Munthe, Henr.:** Drag ur Gottlands Odlingshistoria i Relation till öns Geologiska Byggnad. (Sveriges Geol. Undersökn.) Stockholm 1913. III, 67, 2 Tf. 4°. (Behörde.)
- Rothpletz, Aug.:** Über die Kalkalgen, Spongiostromen und einige andere Fossilien aus dem Obersilur Gottlands. (Sveriges Geol. Undersökn.) Stockholm 1913. 57 S., 9 Tf., 1 Krt. 4°. (Behörde.)
- Stavenhagen, W.:** Schweden und seine Landesverteidigung. (S.-A.: Stuttg. Mil. Bl.) 1914. 11 S. 8°. (Verf.)
- Stoller, J.:** Das Erdölgebiet Hänigsen-Obershagen in der südlichen Lüneburger Heide. (Archiv f. Lagerst.-Forsch., H. 14.) Berlin 1913. III, 97 S., 2 Tf. 8°. (Behörde.)
- Südthof, Hermann:** Beiträge zur Verkehrsgeographie von Rumänien: Binnenschiffahrts- und Seeverkehr. Greifswald 1914. 168 S., 2 Tf. 8°. (Verf.)

- Wießner, K.:** Die Bodenformen des Balearenbeckens. Hamburg 1914. 31 S. 8°. (Verf.)
- Woldfich, Joseph:** Geologische und montanistische Studien in den Karpathen nördlich von Dobschau. (Archiv f. Lagerst.-Forschg., H. 11.) Berlin 1913. 108 S., 5 Tf. 8°. (Behörde.)
- Die **Arbeiten** des Königl. Preussischen Aeronautischen Observatoriums bei Lindenberg im Jahre 1913. IX. Bd. Braunschweig 1914. XLVIII, 544 S. 4°. (Behörde.)
- Årsbok** 1911. (Sveriges Geologiska Undersökning.) Stockholm 1912/1913. 8°. (Behörde.)
- Järnmalmstillgångarna** i Mellersta och Södra Sverige. (Sveriges Geol. Undersökn.) Stockholm 1912. 222 S., 4 Tf., 1 Krt. 4°. (Behörde.)
- Jahrbuch** des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1912. Kristiania 1913. XII, 138 S. 4°. (Behörde.)

Asien.

- Wissenschaftliche Ergebnisse** der Expedition Filchner nach China u. Tibet 1903—1905. XI. Bd. Berlin 1914. VII, 49 S. 8°. (Expeditionsleiter.)

Afrika.

- Geyer, Franz Xaver:** Durch Sand, Sumpf und Wald. Missionsreisen in Zentral-Afrika. Freiburg i. B. 1914. XII, 555 S., 10 Tf. 8°. (Herdersche Verlagshdlg.)
- Kampffmeyer, Georg:** Im neuen Marokko. Frankfurt a. M. 1914. VI, 73 S., 1 Tf. 8°. (H. Keller.)
- Autor faßt in dieser Schrift eine Reihe von Aufsätzen zusammen, welche er im „Berliner Tageblatt“ veröffentlicht hat, und will damit eine wirtschaftliche Orientierung über Marokko geben. Der Anhang enthält Abmachungen und Rechtsordnungen, welche für die deutsche wirtschaftliche Tätigkeit von Wichtigkeit sind: Handelsverträge, Madrider Konvention, Auszug aus der Algeciras Akte.*
- Oberhummer, E.:** The Sinai Problem. (S.-A.: The Smithsonian Report.) Washington 1913. 9 S., 3 Tf. 8°. (Verf.)

Amerika.

- Appleby, William R., and Edmund Newton:** Preliminary Concentration Tests on Mesabi Ores. Minneapolis 1913. 126 S., 3 Tf. 8°. (University of Minnesota.)
- Arctowski, Henryk:** On some Climatic Changes recorded in New York City. (S.-A.: Bull. of the American Geogr. Soc.) 1913. 15 S. 8°. (Verf.)
- Gregory, Herbert E.:** The Rodadero (Cuzco, Peru), — a Fault Plane of Unusual Aspect. (S.-A.: The American Journ. of Science.) 1914. 10 S. 8°. (Verf.)
- Pfannenschmidt, E.:** Die Landwirtschaft in Paraguay. Berlin 1914. 52 S. 8°. (Dtsch. Landwirtschafts-Ges.)

Nach einer Schilderung des Klimas und der Boden-, der Bevölkerungs-, Arbeiter- und Einwanderungsverhältnisse, schildert der Verfasser die einzelnen Kolonien. Interessant ist die Aufführung, daß eine mit 30 000 Papierpesos begründete Jerba-Kultur sich im fünften Jahre bereits mit 12,5 % verzinsen soll. Die Verzinsung steigt dann schnell weiter und soll im 12. Jahre eine Höhe von 87,4 % erreichen. Diese Angaben stützen sich sowohl auf die Statistik, als auch die Angaben „alleingesessener Jerbabauern“. Aus solchen Erfolgen ist natürlich eine günstige Entwicklung für die Kolonie zu erwarten, so daß der bisherige Zuzug arbeitsamer Elemente sich bald heben dürfte.

- Posnansky, Arthur:** Eine prähistorische Metropole in Südamerika. Bd. I. Berlin 1914. XI, 184 S., 88 Tf. 4°. (Verf.)
- Salas, Carlos P.:** Elementos para el Estudio de la Demografía de la Provincia de Buenos Aires. La Plata 1913. 49, II S. 8°. (Behörde.)
- Sievers, Wilhelm:** Süd- und Mittelamerika. 3. Auflg. Leipzig u. Wien 1914. XI, 567 S., 26 Tf., 9 Krt. 8°. (Bibliogr. Institut.)
- Excursions in Canada.** Guide Book No. 1 (2 Teile), 2, 3, 4, 5, 8 (3 Teile), 9, 10. (Dep. of Mines. Geol. Surrey.) 11 Bd. Ottawa 1913. 8°. (Behörde.)
- Minnesota Plant Studies.** V. Guide to the Autumn Flowers of Minnesota. F. E. Clements, C. O. Rosendahl and F. K. Butters. Minneapolis 1913. XIII, 77 S. (Behörde.)
- Mission du Service Géographique de l'Armée pour la Mesure d'un Arc de Méridien Equatorial en Amérique du Sud.** Tome 9 et 10. Paris 1910—1912, 1913. 28 S., 1 Tf. — 119 S., 12 Tf. 4°. (Behörde.)

Australien und die Südsee.

- Finsch, O.:** Südseearbeiten. (Abh. d. Hamb. Kolonialinstituts. Bd. XIV.) Hamburg 1914. XII, 605 S., 30 Tf. 8°. (L. Friederichsen.)

Polargebiete.

- Conwentz, H.:** Über den Schutz der Natur Spitzbergens. (Beitr. z. Naturdenkmalpflege.) Berlin 1914. 73 S., 1 Tf. 8°. (Verf.)
- Staxrud, A., und K. Wegener:** Die Expeditionen zur Rettung von Schröder-Stranz und seinen Begleitern. Berlin 1914. XIV, 101 S., 21 Tf. 8°. (D. Reimer.)
- Deuxième Expédition Antarctique Française (1908—1910), commandée par le Dr. Jean Charcot.** 8 Bd. Paris 1913. (Behörde.)

Kolonien.

- Neuhauf, R.:** Unsere Kolonie Deutsch-Neu-Guinea. Weimar (1914). VIII, 144 S., 32 Tf. 8°. (Verf.)
- Die Arbeit des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees 1896—1914. 20 S. 8°. (Komitee.)
- Vereeniging „Kolonial Instituut“,** Amsterdam. Derde Jaarverslag 1913. 129 S. 8°. (Institut.)

Die Meere.

- Nautisches Jahrbuch für das Jahr 1916.** Berlin 1914. XX, 330 S. 8°. (Behörde.)

Allgemeine Erdkunde.

- Arctowski, Henryk:** Studies on Climate and Crops. (S.-A.: Bull. of the American Geogr. Soc.) 1912. 16 S. 8°. (Verf.)
- Banse, Ewald:** Illustrierte Länderkunde. Braunschweig 1914. 335 S., 17 Tf., 1 Krt. 8°. (G. Westermann.)
- Destaing, E.:** Dictionnaire Français-Berbère. (Publ. de la Fac. des Lettres d'Alger. Tome XLIX.) Paris 1914. 374 S. 8°. (Behörde.)
- Gravelius, H.:** Flußkunde. (Grundriß d. gesamten Gewässerkd. 1. Bd.) Leipzig 1914. VIII, 179 S. 8°. (G. J. Göschen.)
- Haack, Hermann:** Neue Schulwandkarten. Gotha. 44 S., 1 Tf. 8°. (J. Perthes.)

- Hagen, Hermann Bessel:** Geographische Studien über die floristischen Beziehungen des mediterranen und orientalischen Gebietes zu Afrika, Asien und Amerika. Teil I. (S.-A.: Mitt. d. Geogr. Ges. in München.) München 1914. 112 S. 8°. (Verf.)
- Hellmann, G.:** Beiträge zur Geschichte der Meteorologie. (Ver. d. Kgl. Pr. Met. Inst., Nr. 273.) Berlin 1914. 147 S. 4°. (Inst.)
- Hellmann, G.:** Über die Bewegung der Luft in den untersten Schichten der Atmosphäre. 1. Mitteilung. (Sitz.ber. d. Kgl. Pr. Ak. d. Wiss.) 1914. 23 S. 8°. (Verf.)
- Hellmann, G.:** Über Wetteraberglauben. (S.-A.: Himmel u. Erde.) Leipzig 1914. 10 S. 8°. (Verf.)
- Helmert, F. R.:** Die isostatische Reduktion der Lotrichtungen. (Sitz.ber. d. Kgl. Pr. Ak. d. Wiss.) 1914. 14 S. 8°. (Verf.)
- Hesselberg, Th., u. H. U. Sverdrup:** Über den Einfluß der Gebirge auf die Luftbewegung längs der Erdoberfläche und auf die Druckverteilung. (Veröff. d. Geophys. Inst. d. Univ. Leipzig.) 1914. 16 S., 3 Tf. 8°. (Verf.)
- Philippson, Alfred:** Die Erosion des fließenden Wassers und ihr Einfluß auf die Landschaftstypen. (Geogr. Bausteine. H. 7.) Gotha 1914. 36 S. 8°. (J. Perthes.)
- Eine reizvolle kleine Arbeit, entstanden aus drei Vorträgen während eines naturwissenschaftlichen Ferienkursus, durch die Nichtmorphologen eine vorzügliche Einführung bekommen können, bei der Morphologen aber Freude und Genuß an der Art der Darstellung haben werden.*
- Schweydar, W.:** Beobachtung der Änderung der Intensität der Schwerkraft durch den Mond. (Sitz.ber. d. Kgl. Pr. Ak. d. Wiss.) 1914. 12 S. 8°. (Verf.)
- Vedova, Giuseppe dalla:** Scritti Geografici (1863—1913). Novara-Roma 1914. XIV, 539 S., 1 Tf. 8°. (Verf.)
- Baessler-Archiv.** Bd. IV. Leipzig 1914. 46 S. 4°. (Institut.)
- Bericht** über d. Tätigkeit des Zentralbureaus der Internationalen Erdmessung im Jahre 1913. Berlin 1914. 17 S. 4°. (Behörde.)
- Ergebnisse** aerologischer Beobachtungen. 1. 1909—1912. (Kon. Ned. Met. Inst.) Utrecht 1913. VI, 146 S., 3 Tf. 8°. (Behörde.)

VERHANDLUNGEN DER GESELLSCHAFT.

Allgemeine Sitzung vom 13. Juni 1914.

Vorsitzender: Herr Hellmann.

Seit der letzten Sitzung hat die Gesellschaft das ordentliche Mitglied (seit 1900) Herrn Prof. Dr. Ernst Bardey durch den Tod verloren.

Auf Vorschlag des Vorstandes wird an Stelle des auf seinen Wunsch aus dem Verwaltungsausschuß der Karl Ritter-Stiftung ausgeschiedenen Mitglieds Herrn Staatsminister Dr. Freiherr von Thielmann, Exzellenz, Herr Professor Dr. G. Schweinfurth gewählt.

Im Anschluß hieran macht der Vorsitzende die Mitteilung, daß die lebenslänglichen Mitglieder der Gesellschaft, Herr Direktor des Berliner

Pfandbrief-Amts Dr. Georg Minden und seine Gattin Frau Franka Minden, eine in ihrem Auftrage von Herrn Professor F. Schaper angefertigte Marmorbüste Georg Schweinfurths der Gesellschaft als Schenkung überwiesen haben. Für diese hochherzige und der Gesellschaft überaus wertvolle Gabe spricht der Vorsitzende Herr und Frau Minden den wärmsten Dank der Gesellschaft aus; die Büste des großen Reisenden und Gelehrten, den wir seit über fünfzig Jahren zu unseren Mitgliedern zählen, wird einen Ehrenplatz in den Räumen unserer Gesellschaft finden.

Sodann gelangt der soeben fertiggestellte XVIII. Band der „Bibliotheca Geographica“ zur Vorlage. Er ist, wie seinerzeit mitgeteilt worden ist, an Stelle des bisherigen langjährigen Bearbeiters desselben Herrn Prof. O. Baschin, von Herrn cand. geogr. Joseph Müller abgefaßt worden. Unter Weglassung der rein populären Literatur und minder wichtiger Arbeiten aus den sogenannten geographischen Hilfswissenschaften, hat sich sein Umfang so einschränken lassen, daß der neue Band die Jahrgänge 1909 und 1910 enthält.

Auch dieser Band kann entsprechend einem früheren Beschluß der Gesellschaft (s. Verhandlungen 1894, S. 366) von denjenigen Mitgliedern, die sich innerhalb der nächsten sechs Monate melden, soweit der Vorrat reicht, an der Geschäftsstelle der Gesellschaft in Empfang genommen werden. Mitglieder, welche die Zusendung wünschen, wollen den Betrag des Portos hierfür (30 Pf.) vorher einsenden.

Vortrag des Herrn Hauptmann a. D. Hans von Ramsay: „Die neue deutsch-französische Kamerun-Grenze“. (Mit Lichtbildern.)

In die Gesellschaft wurden aufgenommen:

als ansässiges ordentliches Mitglied

Herr Dr. Max Günther, Amtsrichter, Wilmersdorf;

als auswärtige ordentliche Mitglieder

Herr Herbert A. Engledue, Captain, Survey Department, Egyptian Government, Cairo,

„ W. J. Harding King, F. R. G. S., London.

Berichtigungen: In diesem Jahrgange, S. 204, Unterschrift zu Abbild. 24 (Aufsatz G. Braun: Zur deutschen Landeskunde) soll es heißen 1:500 000 statt 1:5 000 000; — S. 299, in Abbild. 34 (Aufsatz von N. Yamasaki: Ausbruch des Vulkans Sakurashima) soll die Höhenzahl nördl. Kagoshima heißen 1454 und nicht 1454, die Halbinsel südlich „Satsuma“ und nicht „Sakuma“. Der Maßstab ist 1:100 000 und nicht 1:200 000.

Schluß der Redaktion am 25. Juni 1914.

ANZEIGEN

Clemens Riefler

Fabrik mathematischer Instrumente
Nesselwang u. München.

Präzisions- Reisszeuge,
Präzisions- Uhren,
Sekundenpendel-
Nickelstahl- Pendel.
Kompensations-

Paris, St. Louis, Lüttich Grand Prix.
Brüssel 1910 zwei Grand Prix.

Illustrierte Preislisten gratis.

Reiseuniversale

sowie kompl. Ausrüstungen für
wissenschaftliche Expeditionen
liefert als Spezialität

Max Hildebrand
früher August Lingke & Co.

Freiberg-Sachsen

Gegr. 1791. Paris 1900 Grand Prix

Man verlange Liste J 220.

Soeben erschien:

BIBLIOTHECA GEOGRAPHICA

JAHRESBIBLIOGRAPHIE DER
GEOGRAPHISCHEN LITERATUR

HERAUSGEGEBEN VON DER

**GESELLSCHAFT FÜR
ERDKUNDE ZU BERLIN**

BEARBEITET VON JOSEPH MÜLLER

Band XVIII. Jahrgang 1909
u. 1910. XVII u. 483 S. 8°.

Seit dem Jahrgang 1896
mit Autoren-Register.

== Preis 8 Mark. ==

Kommissionsverlag von W. H. KÜHL,
BERLIN SW. 11, Königgrätzer Straße 82.

Mittelmeer- Fahrten

zu mäßigen Preisen

mit Salondampfern
nach

Portugal, Spanien,
der französischen und
italienischen Riviera

nach

Italien, Sizilien,
Algerien und Agypten

Reiseschecks

Weltkreditbriefe

Nähere Auskunft,
Drucksachen und Fahrkarten
durch

**Norddeutscher
Lloyd Bremen**

und
seine Vertretungen

Wichtige Neuheit!

Methodischer Atlas zur Länderkunde von Europa.

Von Univ.-Prof. Dr. Max Friederichsen. Gez. von Dr. Seick.

Lfg. 1: Ost-Europa u. d. Ostseeeländer. 6 Tafeln zu je 8 Kärtchen. 3 M.

Dieser in seiner Art einzig dastehende Atlas wird durch den der heutigen Auflage beigelegten Prospekt näher erläutert und verweisen wir unsere Leser nochmals an dieser Stelle auf das interessante Werk.

Verlag der Hahnschen Buchhandlung in Hannover.

EXPORT

Hollieferanten
Adolf Friedrich



Sr. Hoheit des Herzogs
zu Mecklenburg

IMPORT

DINGELDEY & WERRES

BERLIN W. 35. F. 13.

Haupt-Geschäft: Schöneberger Ufer 13.

Filiale: Jägerstraße 1.

Ältestes und größtes Spezial-Geschäft Deutschlands

**für komplette Tropen-Ausrüstungen
und zeitgemäße Reise-Ausrüstungen.**

Eigene Fabrik mit elektrischem Betrieb.

Prämiert auf allen beschickten Ausstellungen.

Reichillustrierte Kataloge und ausführliche Kostenanschläge kostenlos und portofrei.

Den der heutigen Auflage beiliegenden Prospekt der Verlags-
buchhandlung B. G. Teubner, Leipzig über

„Ostasienfahrt“

empfehlen wir der ganz besonderen Beachtung unseres werten Leser-
kreises.

Agfa-Photomaterial

auf zahlreichen Forschungsreisen
hervorragend bewährt!

Leistungsfähig, zuverlässig, haltbar.

Glänzende Gutachten von bedeutenden Forschern!
(s. „Agfa“-Photohandbuch, à 30 Pfg., 136 Textseiten)

„Agfa“ -Platten, -Belichtungstabellen,
-Entwickler, -Hilfsmittel.

Gratis reich illustrierte
hochinteressante **„Agfa“-Literatur**

durch Photohändler oder durch die

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin SO. 36